



الجمهورية العربية السورية

جامعة دمشق

كلية الطب البشري

قسم الأمراض الباطنة

**تقييم دور معايير الجمعيتين الأمريكيتين للأمراض الإنتانية والصدريّة
(IDSA/ATS) في تحديد شدة ذات الرئة المكتسبة في المجتمع**

**Evaluation of the role of Infectious Disease Society of
America and American Thoracic Society (IDSA/ATS) criteria
for severity of community-acquired pneumonia**

بحث علمي أعد لنيل إجازة الماجستير في أمراض الجهاز التنفسي

رئاسة القسم :

إشراف :

الأستاذ الدكتور محمد شحادة آغا

الأستاذ الدكتور عمار الزين

إعداد طالبة الدراسات العليا

ديما محمد الحلاق

قرار لجنة الحكم

تصريح

" لا يوجد أي جزء من هذه الأطروحة تم اقتباسه بالكامل من عمل علمي آخر أو أنجز للحصول على شهادة أخرى في جامعة دمشق أو أي جامعة أخرى أو أي معهد تعليمي "

الفهرس

6	قائمة الجداول
7	قائمة الصور
7	قائمة المخططات والأشكال
8	القسم النظري
9	تعريف ذات الرئة
9	الوبائيات
10	الآلية السببية (العوامل الممرضة)
14	التظاهرات السريرية
14	الفحص السريري
14	التظاهرات الشعاعية
18	الموجودات المخبرية
20	تقييم شدة المرض وقرار القبول
26	التدبير
30	ذات الرئة المعننة
32	الوقاية
33	القسم العملي

34	أهمية البحث وخلفيته
35	هدف الدراسة
35	الفرضية البحثية
35	السؤال البحثي
36	المواد وطريقة الدراسة
37	القضايا الأخلاقية
38	التحليل الإحصائي
39	نتائج الدراسة
48	مناقشة النتائج
49	مقارنة مع الدراسات العالمية
55	الخلاصة
55	محددات الدراسة
55	التوصيات
56	المراجع
61	الملاحق

قائمة الجداول :

- الجدول رقم 1: العضيات المرتبطة بحدوث ذات الرئة المكتسبة في المجتمع 11
- الجدول رقم 2: الأسباب الجرثومية النموذجية لذات الرئة المكتسبة في المجتمع 11
- الجدول رقم 3: العضيات غير النموذجية المسببة لذات الرئة المكتسبة في المجتمع 12
- الجدول رقم 4: مكونات حرز PSI 22
- الجدول رقم 5: معايير 2007IDSA / ATS لتقييم شدة ذات الرئة المكتسبة في المجتمع 24
- الجدول رقم 6: معايير SMART-COP 25
- الجدول رقم 7: استراتيجيات المعالجة البدئية لمرضى ذات الرئة المكتسبة في المجتمع المعالجين خارج المشفى 26
- الجدول رقم 8: استراتيجيات المعالجة البدئية لمرضى ذات الرئة المكتسبة في المجتمع المقبولين في المشفى اعتماداً على مستوى الشدة وخطر المقاومة الدوائية 27
- الجدول رقم 9: مكونات الأحراز المدروسة 38
- الجدول رقم 10: الخصائص الأساسية للعينة المدروسة 39
- الجدول رقم 11: توزع العينة حسب حصيلة المرض 40
- الجدول رقم 12: العلاقة بين نسب الوفيات وعدد المعايير المحققة في كل من الأحراز المدروسة 42
- الجدول رقم 13: العلاقة بين نسب الوفيات ومتغيرات الدراسة 43
- الجدول رقم 14: خصائص الأحراز المدروسة للتنبؤ بالوفيات 44

الجدول رقم 15: قيم المساحة تحت المنحنى للأحراز المدروسة 47

الجدول رقم 16: مقارنة قيم المساحة تحت المنحنى بين لأحراز المدروسة 47

قائمة الصور:

الصورة رقم 1: صورة بسيطة للصدر لمريض ذات رئة تصيب الفص المتوسط الأيمن 15

الصورة رقم 2: صورة بسيطة للصدر لمريض ذات رئة بالانفلونزا توضح تكتفات متوزعة بشكل
لطخي وخاصةً في الفص العلوي الأيمن..... 16

الصورة رقم 3: طبقي محوري للصدر تظهر فيه ذات رئة اليمنى مع علامة الارتسام القضيبي... 17

قائمة المخططات والأشكال :

مخطط يوضح النسبة المئوية لتوزع عينة البحث حسب حصيلة المرض 40

شكل يبين منحنيات خاصية المشغل المتلقي ROC للتنبؤ بالوفيات لكل من الأحراز المدروسة.. 46

القسم النظري

The Theoretical Section

تعريف ذات الرئة :

ذات الرئة هي حالة تحدث نتيجة إنتان مكروبي داخل البرانشيم الرئوي، يؤدي هذا الإنتان بالإضافة للاستجابة الالتهابية للمضيف إلى اضطراب الوظيفة السنخية الطبيعية (التبادل الغازي)، ويؤدي هذا الاضطراب بالإضافة للتأثيرات الجهازية للإنتان إلى حدوث التظاهرات السريرية لذات الرئة .(1)

المعيار الذهبي للتعرف على ذات الرئة هو وجود ارتشاحات رئوية جديدة على صورة الصدر الشعاعية مع وجود أعراض سريرية ملائمة .(1)

ذات الرئة المكتسبة في المجتمع هي ذات الرئة التي تحدث خارج المشفى أو خلال 48 ساعة من القبول في المشفى .

تعدّ ذات الرئة المكتسبة في المجتمع شديدة عندما تتطلب قبول في وحدة العناية المركزة .(2)

(يتم قبول 5 -16 % من المرضى المقبولين في المشفى بقصة ذات رئة مكتسبة في المجتمع في وحدة العناية المركزة) (2)

الوبائيات :

- تصيب ذات الرئة المكتسبة في المجتمع ما يقارب 5.6 مليون مريض سنوياً في الولايات المتحدة.(2)

- يقدر وقوع ذات الرئة المكتسبة في المجتمع ب 1 - 10 لكل 1000 شخص في السنة :

فنلندا : 10.8 إصابة لكل 1000 شخص

المملكة المتحدة : 4.1 إصابة لكل 1000 شخص

ألمانيا : 3.7 إصابة لكل 1000 شخص (2)

- يزداد الوقوع اعتباراً من العقد الرابع من العمر مع ذروة عند المسنين .(2)

- تكون أشيع عند وجود أمراض مستبطنة مثل الداء الرئوي الساد المزمن، التوسع القصبي، الأمراض الكلوية أو القلبية المزمنة .(1)

- تحدث على مدار العام مع ذروة في أشهر الشتاء . (1)

- الوفيات :

✓ لم تسجل الوفيات انخفاضاً هاماً في السنوات الأخيرة على الرغم من التقدم في العلاج بالصادات

✓ تقدر نسبة حدوث الوفيات عند المرضى الخارجيين ب 1- 2 %

✓ تصبح النسبة أعلى عند المرضى المقبولين في المشفى 10- 20 %

✓ تكون النسبة الأعلى عند المرضى المقبولين في وحدة العناية المركزة حيث تصل إلى 50% (2)

الآلية السببية (العوامل الممرضة) :

لا يمكن تحديد العضوية المسببة لحدوث ذات الرئة المكتسبة في المجتمع في 50 % من الحالات ، وفي الحالات المتبقية يتم تحديد عضويات مسببة متنوعة .(3)

العامل الممرض المسبب لذات الرئة المكتسبة في المجتمع الأكثر شيوعاً هو العقديات الرئوية

Streptococcus pneumonia وتعدّ أيضاً السبب الأهم للمرض الشديد و الوفاة .(1)

تعدّ المفطورات الرئوية *Mycoplasma pneumonia* أيضاً سبباً شائعاً للمرض خفيف الشدة

خاصة عند اليافعين .(1)

يرتبط المرض الشديد غالباً ب :

- العقديات الرئوية *S.pneumonia*

- الفيقييات *Legionella*

- العنقوديات المذهبة *Staphylococcus aureus*

- العصيات سلبية الغرام (1)

الجدول رقم 1: العضويات المرتبطة بحدوث ذات الرئة المكتسبة في المجتمع (3)

المرضى المعالجين خارج المشفى	المرضى المقبولين في المشفى	المرضى المقبولين في وحدة العناية المركزة
العقديات الرئوية	العضويات السابقة بالإضافة إلى: الفيلقيات الاستنشاق	العقديات الرئوية
المفطورات الرئوية		العنقوديات المذهبة
المستدميات النزلية		الفيلقيات
المتدثرات الرئوية		العصيات سلبية الغرام
الفيروسات التنفسية		المستدميات النزلية

الجدول رقم 2: الأسباب الجرثومية النموذجية لذات الرئة المكتسبة في المجتمع (3)

العضوية	التفاصيل
العقديات الرئوية	- السبب الأشيع (30-60%)، آلية الحدوث الأشيع: ذات رئة بعد انفلونزا. - تشاهد الإنتانات الشديدة في حالات اللا طحالية . - يقلل اللقاح من خطر داء العقديات الرئوية الغازي .
المستدميات النزلية	- تحدث عند المرضى المصابين بداء رئوي مستتبطن (COPD، تليف كيسي). - يقلل اللقاح من حدوث المرض .
العنقوديات المذهبة	- تشكل 2-5% من الحالات، أكثر حدوثاً بعد الانفلونزا . - شائعة عند مدمني المخدرات الوريدية . - ترتبط العنقوديات المذهبة المقاومة للميتيسلين المكتسبة في المجتمع - CA-MRSA بحدوث ذات رئة منخرة شديدة بمعدل وفيات 29-60%. - الارتشاحات المتخثرة، المتكهفة أو تقيح الجنب تزيد الشكّ بالعنقوديات المذهبة .

العصيات سلبية الغرام(باستثناء المستدميات النزلية)	- غير شائعة عموماً، لكن قد تتطلب قبولاً في وحدة العناية المركزة . - العضويات الأشيع : كليبسيلا، الزوائف، الإشريكية القولونية، المتقلبات، العصيات الزرق . - عوامل الخطر للإصابة : الاستنشاق، الإصابة بداء رئوي مستوطن .
--	--

الجدول رقم 3: العضويات غير النموذجية المسببة لذات الرئة المكتسبة في المجتمع (مسؤولة
عن 10-20% من الحالات) (3)

العضوية	التفاصيل
المفطورات الرئوية	- الأشيع من بين العضويات غير النموذجية . - تصيب عادةً الأشخاص الأصحاء بأعمار 20-30 سنة . - يحدث الانتقال من شخص لآخر عبر القطرات التنفسية . - تحدث أعراض بادرية لإنتان تنفسي علوي يتبعها سعال جاف و أعراض خارج رئوية مثل حمى منخفضة الدرجة، إسهال، ألم عضلي، ألم مفصلي، طفح . - تلوين غرام عادةً سلبي . - يظهر في صورة الصدر ارتشاحات قطعية وحيدة الجانب، ولكن يمكن أن تكون بؤرية غيمية أو ارتشاحات خلالية ثنائية الجانب .
الفيلقيات	- يمكن أن تحدث ضمن فاشيات ترتبط بالتعرض لرذاذ المياه الملوثة (أبراج التدفئة، الحمامات، ينابيع المياه المعدنية، أنظمة توزيع المياه). - يمكن أن تسبب حمى مرتفعة، اضطرابات معدية معوية، اضطرابات عصبية، قصور كلوي، ارتفاع ناقلات الأمين، ترقى سريع بالموجودات الشعاعية .
المتدثرات الرئوية	- الأعراض قليلة، ولكن الشفاء قد يكون بطيء (يمكن أن يستمر السعال والدعث لأسابيع أو أشهر) .

الأسباب الفيروسية : (3)

- الانفلونزا، الفيروسات المخلوية التنفسية :العامل الفيروسي الأشيع المسبب لذات الرئة عند الأطفال، يصعب تمييزها عن ذات الرئة الجرثومية، تحدث الانفلونزا عادةً بشكل فاشيات خلال فصل الشتاء أو أوبئة متفرقة .
- نظيرة الانفلونزا، الفيروسات الغدية : يمكن أن تسبب ذات رئة شديدة، قاتلة عند مثبطي المناعة (مرضى زرع الأعضاء)
- الفيروسات التاجية : مسؤولة عن SARS و MERS و COVID -19
- Hantavirus : قصة سفر إلى أمريكا الجنوبية الغربية، يمكن أن تسبب مرض تنفسي شديد (صورة مشابهة لل ARDS)
- الحماقية : الاختلاط الأشيع للإنتان بالحماق عند البالغين الأصحاء، نسبة الوفيات 10-30%

ملاحظة :

- يرتبط عوز المناعة الخلطية بإنتانات جرثومية ، بينما ترتبط أذيات المناعة الخلوية بإنتانات فيروسية وفطرية مثل المتكيس الكاريني Pneumocystis jirovecii (1).
- تعدّ العقنوديات المذهبة واحدةً من أشيع الإنتانات الجرثومية المرتبطة بذات الرئة بالانفلونزا ، يليها العقديات الرئوية ، المستدميات النزلية والعقديات A. (4)

عوامل الخطر لحدوث ذات رئة مكتسبة في المجتمع : (5)

- الاستنشاق : يتسبب عادةً باللاهوائيات وسلبيات الغرام
- الكحولية والداء السكري : ترتبط عادةً بذات الرئة بالعقديات الرئوية المقيحة
- الستيروئيدات القموية / مثبطات المناعة
- التدخين : يعد عامل الخطر الأقوى لإنتان العقديات الرئوية الغازي عند أسوياء المناعة
- الداء الرئوي الساد المزمن : يعد الإنتان بالمستدميات النزلية و الموراكسيلا هو الأشيع

- العناية التمريضية المنزلية : يشيع الإنتان باللاهوائيات و سلبيات الغرام كما يعد الإنتان بالمستدميات النزلية الأكثر شيوعاً.

التظاهرات السريرية :

يكون ظهور الأعراض حاد :

- ✓ أعراض تنفسية : سعال مع أو بدون قشع، زلة تنفسية، ألم صدري جنبي الصفات .
- ✓ أعراض عامة : حمى، قشعريرة، دعث، ألم عضلي، ألم مفصلي، صداع، خفقان، إسهال .
- ✓ أعراض عصبية : خاصةً تخليط ذهني . (1)


تتظاهر الأعراض عند المسنين عادةً بتخليط ذهني، ضعف، هذيان، إسهال، ولا يكون وجود الحمى، السعال أو القشع شائعاً عند هذه الفئة العمرية . (3)

الفحص السريري :


- زيادة عدد مرات التنفس، تسرع نبض، قد نجد انخفاضاً في ضغط الدم الشرياني
- فحص الصدر : أصمية بقرع الصدر، علامات موضعية (خراخر، تنفس قصبي، زيادة اهتزازات صوتية) (1)

التظاهرات الشعاعية :


- تعتبر صورة الصدر البسيطة أساسية لإثبات ارتشاحات رئوية جديدة . (1)
- تأخذ الارتشاحات - بشكل تقليدي - مظهر تكثف فصي مع علامة ارتسام قصبي، تشغل الارتشاحات غالباً أقل من كامل الفص . (1)
- يمكن أن تكون الارتشاحات ذات توزيع بؤري غيمي ثنائي الجانب متعدد الفصوص (1)
- التظاهرات الأخرى: يمكن مشاهدة انصباب جنب، وبشكل أقل شيوعاً تكهف وريح صدرية (1)
- يمكن ألا تُظهر الصور الشعاعية المجراة للمتابعة بعد العلاج زوال الموجودات الشعاعية لمدة تصل حتى 12 أسبوع عند بعض المرضى . (3)



الصورة رقم 1: صورة بسيطة للمصدر لمريض ذات رئة تصيب الفص المتوسط الأيمن



الصورة رقم 2: صورة بسيطة للصدر لمريض ذات رئة بالانفلونزا توضح كثافات متوزعة بشكل
بؤري غيمي وخاصةً في الفص العلوي الأيمن (السهم)



الصورة رقم 3: طبقي محوري للصدر تظهر فيه ذات رئة اليمنى مع علامة الارتسام القصبي

الموجودات المخبرية :

يجب أن يجرى لجميع مرضى ذات الرئة المكتسبة في المجتمع ما يلي: تعداد كريات بيض وصيغة، CRP، بولة، كرياتينين، قياسات التبادل الغازي (قياس الإشباع الأكسجيني، غازات الدم الشرياني) (1)

- **تعداد الكريات البيض و الصيغة** : يرتفع تعداد البيض مع انحراف الصيغة إلى الأيسر خاصة في الإنتانات الجرثومية، كما يمكن أن ينخفض تعداد البيض في حالات الصدمة الشديدة وفي الإنتانات الفيروسية، يدلّ نقص البيض على إنذار سيء .
- **البروتين الارتكاسي C** : يرتفع في الإنتانات الجرثومية، كما يفيد في تقييم الاستجابة للعلاج بالصادات حيث يرتبط تأخر عودته للقيم الطبيعية بخطر أعلى لوجود علاج غير ملائم بالصادات .
- **البولة والكرياتينين** : تساعد في تقييم شدة المرض وتقييم الاضطراب الكلوي .
- **قياسات التبادل الغازي (قياس الإشباع الأكسجيني و/ أو غازات الدم الشرياني)** : تساعد أيضاً في تقييم شدة المرض و توجيه المعالجة .(1)

البروكالسيتونين : توصي الجمعية الأمريكية لأمراض الصدر ATS بالبدء بالمعالجة التخبرية بالصادات عند وجود شك سريري مع إثبات شعاعي بغضّ النظر عن مستوى البروكالسيتونين البدئي في المصل .(6)

على الرغم من أن المستويات المنخفضة للبروكالسيتونين ≥ 0.1 مكغ /ل تقلل احتمال أن المريض لديه إنتان جرثومي ولكنها لا تستبعد تماماً ذات الرئة الجرثومية بدقة كافية لتبرير منع المعالجة البدئية بالصادات خاصة في الحالات الشديدة .(7)

الاختبارات المجرة لتحديد العامل المسبب : تكون إيجابية في حوالي 15 % من الحالات فقط لذا نادراً ما تؤثر على التدبير، ولا تستطب غالباً ما لم تكن حالة المريض شديدة وعندها يستطب إجراء: تلوين غرام على القشع، زرع قشع، زرع دم، اختبارات بولية لمستضد الفيلقيات والمكورات الرئوية (1)

❖ **تلوين غرام و زرع القشع، زرع الدم : حسب توصيات ATS لعام 2019: (6)**

- لا تجرى بشكل روتيني عند مرضى ذات الرئة المكتسبة في المجتمع المعالجين بشكل خارجي .

- يوصى بإجراء تلوين غرام و زرع على المفرزات التنفسية، و زرع دم عند مرضى ذات الرئة المكتسبة في المجتمع المقبولين في المشفى في الحالات التالية :
 - الحالات الشديدة .

- المرضى الذين يتم علاجهم بشكل تخبري ل MRSA أو P.aeruginosa أو الذين لديهم إصابة سابقة ب MRSA أو P.aeruginosa، أو المرضى الذين كانوا مقبولين في المشفى وتلقوا صادات خلالية خلال 90 يوم الماضية .

❖ **فحص مستضد المكورات الرئوية في البول : يُقترح عدم إجرائه بشكل روتيني ماعدا الحالات الشديدة، وذلك حسب توصيات ATS لعام 2019. (6)**

- ❖ **فحص مستضد الفيلقيات في البول : يُقترح عدم إجرائه بشكل روتيني ماعدا الحالات الشديدة أو إذا كان مستطاب لأسباب وبائية (فاشية فيلقيات)، وذلك حسب توصيات ATS لعام 2019. (6)**

توصي ATS بإجراء اختبار للانفلونزا عندما تكون فيروسات الانفلونزا منتشرة في المجتمع، وذلك عن طريق:

rapid influenza molecular assay(i.e. influenza nucleic acid amplification test)

والذي يعدّ مفضلاً على (rapid influenza diagnostic test (i.e. antigen test) (6)

تقييم شدة المرض وقرار القبول :

يهدف تقييم شدة المرض إلى تحديد المرضى الذين لديهم خطر متزايد للوفاة وذلك لتقديم مراقبة ومعالجة مكثفة لهم؛ يجب أن يتم تقييم الشدة من خلال المحاكمة السريرية الموجهة بأحراز الشدة الموضوعية. (1)

شدة المرض ليست الاعتبار الوحيد لتقرير الحاجة للقبول في المشفى حيث أن لدى بعض المرضى مضادات استقلاب طبية و / أو نفسية للمعالجة كمريض خارجي (مثل عدم القدرة على تناول الدواء عبر الفم، اضطرابات معرفية، إِمراضيات مشاركة، حالة وظيفية سيئة). (8)

تم تطوير العديد من أحراز شدة المرض لتساعد في قرار قبول المريض في المشفى (مثل PSI، CURB-65)، كما تم تطوير العديد من الأحراز لتساعد في قرار قبول المريض مباشرةً في وحدة العناية المركزة (مثل CURB-80، SCAP score، SMART-COP، IDSA /ATS) (9)

معايير CURB - 65:

- تخليط ذهني حديث .
- بولة < 7 ممول/ل أو BUN < 19.1 مغ/دل
- عدد مرات التنفس ≤ 30 حركة تنفسية/د
- ضغط الدم الانقباضي > 90 مم ز أو الانبساطي ≥ 60 مم ز
- العمر ≤ 65 سنة

0 - 1 : يعامل كمريض خارجي

2 : يتطلب استشفاء

3 - 5 : يجب أن يُقيّم لقبوله في وحدة العناية المركزة (3)

معايير PSI: (الجدول رقم 4)

توضع النقاط على : العمر، وجود عناية تمريضية منزلية، الأمراض المشاركة (سرطان، قصور قلب احتقاني، أمراض وعائية دماغية، داء كبدي، داء كلوي)، موجودات الفحص السريري (تبدل الحالة الذهنية، تسرع النبض، هبوط الضغط، تسرع التنفس، انخفاض أو ارتفاع الحرارة)،
الموجودات الشعاعية (انصباب الجنب)، الموجودات المخبرية (PH، البولة، الصوديوم، الغلوكوز، الهيماتوكريت، PaO2 أو SaO2)

وبناءً عليها يتم فرز المرضى كما يلي :

- Class I-II : ($70 \geq$ نقطة) يعالج في المنزل
 - Class III : (71-90 نقطة) بقاء لفترة قصيرة في المنزل مع مراقبته
 - Class IV-V : ($91 \leq$ نقطة) يحتاج لقبول في المشفى (10)
- وتكون نسبة الوفيات : Class I-III : $> 1\%$ بينما Class IV-V : تتراوح بين 9-30% (10)

الجدول رقم 4: مكونات حرز PSI

المعلومات الديموغرافية	النقاط الممنوحة
ذكر	العمر بالسنوات
أنثى	العمر بالسنوات - 10
عناية تمريضية منزلية	العمر + 10
الإمراضيات المشاركة	
مرض سرطاني	30
مرض كبدي	20
قصور قلب احتقاني	10
مرض دماغي وعائي	10
مرض كلوي	10
موجودات الفحص السريري	
تبدل الحالة الذهنية	20
معدل التنفس ≤ 30 حركة تنفسية/د	20
ضغط الدم الانقباضي > 90 مم ز	20
درجة حرارة الجسم $> 35^\circ\text{س}$ أو $< 40^\circ\text{س}$	15
معدل النبض ≤ 125 /د	10
الموجودات المخبرية و الشعاعية	
PH الدم الشرياني > 7.35	30
البولة < 30 مغ/دل (11 ممول/ل)	20
الصوديوم > 130 ممول/ل	20
الغلوكوز < 250 مغ/دل (14 ممول/ل)	10
الهيماتوكريت $> 30\%$	10
$\text{PaO}_2 > 60$ مم ز	10
انصباب الجنب	10

تم تطوير كل من معايير CURB-65 و PSI كنموذج إنذاري عند المرضى أسوياء المناعة المصابين بذات رئة مكتسبة في المجتمع باستخدام معلومات عن المريض ومتغيرات سريرية منذ التشخيص للتنبؤ بالوفاة خلال 30 يوم. (11)

عند المقارنة بينهما: PSI يحدد نسبة أكبر من المرضى كمنخفضي خطورة، ويملك قدرة أكبر للتنبؤ بالوفيات لذا هو مفضل أكثر من CURB-65. (12)

توصي الجمعية الأمريكية للأمراض الصدرية ATS (عام 2019) باستخدام حرز PSI كمساعد في القرار السريري لتوجيه مكان المعالجة البدئي، وهذه التوصية تستند إلى دليل قوي على فعالية وأمان هذه المقاربة حيث تساعد على اتخاذ القرار لزيادة المرضى المعالجين بشكل خارجي مما يعطي إمكانية لتقليل التغيرات غير الضرورية بمعدلات القبول، وتقليل التكلفة المرتفعة لمعالجة المرضى المقبولين في المشفى وخطر الاختلاطات المكتسبة في المشفى؛ بينما تعطي توصية أضعف لاستخدام CURB-65 مع الأخذ بعين الاعتبار أنه أكثر بساطة للاستخدام مقارنةً مع PSI بالرغم من قلة الدليل على فعاليته أو أمانه. (6)

معايير ATS / IDSA 2007 لتقييم شدة ذات الرئة المكتسبة في المجتمع: (الجدول رقم 5)

توصي الجمعية الأمريكية للأمراض الصدرية ATS (عام 2019) بالقبول المباشر في وحدة العناية المركزة للمرضى الذين لديهم هبوط ضغط يتطلب مقبضات وعائية أو قصور تنفسي يتطلب تهوية آلية؛ أما المرضى الذين لا يتطلبون مقبضات وعائية أو تهوية آلية داعمة يُقترح استخدام معايير الشدة IDSA / ATS الصغرى لعام 2007 مع الحكم السريري لتوجيه الحاجة لمستوى أعلى من شدة المعالجة. (6)

- اعتمدت هذه المعايير على دليل تخبري من الدراسات المنشورة وإجماع الخبراء. (6)
- صادقت مجموعات متعددة من بلدان مختلفة على هذه المعايير مع تحليل تلوي أعطى تقارير بأن معيار كبير أو 3 معايير صغرى لها حساسية 84 % ونوعية 78 % للتنبؤ بقبولات العناية.

(14)

الجدول رقم 5: معايير 2007IDSA / ATS لتقييم شدة ذات الرئة المكتسبة في المجتمع (6)

معايير صغرى	معايير كبرى
عدد مرات التنفس ≤ 30 حركة تنفسية/ د	صدمة إنتانية مع الحاجة لمقبضات وعائية
$PaO_2 / FiO_2 \leq 250$	قصور تنفسي يتطلب تهوية آلية
ارتشاحات متعددة الفصوص	
تخليط ذهني أو عدم توجه	
$BUN \geq 20 \text{ mg/dl}$	
نقص كريات الدم البيضاء (>4000 خلية/مم ³)	
نقص الصفيحات ($>100,000$ خلية/مم ³)	
نقص الحرارة ($> 36^\circ \text{س}$)	
هبوط ضغط شرياني يتطلب تعويض سوائل شديد	

تعتبر ذات الرئة المكتسبة في المجتمع شديدة (تتطلب القبول في وحدة العناية المركزة) عند تحقق معيار كبير أو 3 معايير صغرى أو أكثر.

معايير SMART-COP: (الجدول رقم 6)

- يعدّ SMART-COP قاعدة تنبؤ بديلة مصادق عليها لتحديد مرضى ذات الرئة الذين يحتاجون دعم بالمقبضات الوعائية و / أو التهوية الآلية. (6)
- هناك خمسة عناصر مشتركة بين معايير SMART-COP ومعايير IDSA /ATS الصغرى هي : نقص الأكسجة، التخليط الذهني، عدد مرات التنفس، ارتشاحات متعددة الفصوص، هبوط ضغط الدم الانقباضي. (6)
- يملك SMART-COP حساسية 79% ونوعية 64 % في التنبؤ بقبولات العناية المركزة باستخدام عتبة 3 معايير أو أكثر. (15)
- هناك مقارنة واحدة أظهرت تكافؤ IDSA /ATS و SMART-COP في التنبؤ بقبولات العناية (16)، ومقارنة أخرى أظهرت أداء أهم ل IDSA /ATS. (17)

الجدول رقم 6: معايير SMART-COP (9)

S	ضغط الدم الانقباضي > 90 مم.ز	نقطتان
M	ارتشاحات متعددة الفصوص	نقطة واحدة
A	ألبومين > 3.5 غ / دل	نقطة واحدة
R	عدد مرات التنفس : معدلة حسب العمر 50 سنة : ≥ 25 مرة/د 50 سنة : ≤ 30 مرة/د	نقطة واحدة
T	تسرع نبض ≤ 125 / د	نقطة واحدة
C	تخليط ذهني حديث	نقطة واحدة
O	نقص الأكسجة : معدلة حسب العمر	نقطتان
	العمر	
	50 سنة $\geq$	50 سنة <
	PaO2	70 مم ز > 60 مم ز
	O2 Sat. أو	93% $\geq$ 90%
	PaO2 /FiO2 أو	333 > 250
P	PH في الدم الشرياني > 7.35	نقطتان

0 - 2 نقطة : خطر منخفض للحاجة لدعم تنفسي أو وعائي

3 - 4 نقاط : الخطر متوسط (1:8)

5 - 6 نقاط : الخطر مرتفع (1:3)

≤ 7 نقاط : الخطر مرتفع جداً (2:3)

التدبير :

- حجر الأساس في التدبير : تصحيح التبادل الغازي واضطرابات توازن السوائل، وتوفير المعالجة بالصادات الملائمة.(1)
- يجب أن تكون المعالجة البدئية بالصادات تخبرية وموجهة حسب شدة المرض وذلك وفق التوصيات المحلية أو العالمية.(1)

الجدول رقم 7: استراتيجيات المعالجة البدئية لمرضى ذات الرئة المكتسبة في المجتمع المعالجين خارج المشفى (6)

Amoxicillin أو doxycycline أو macrolide (إذا كانت مقاومة المكورات الرئوية المحلية > 25%)	لا يوجد إصابات مشاركة أو عوامل خطر للإصابة ب MRSA أو P. aeruginosa
مشاركة { Amoxicillin / clavulanate أو cephalosporin مع {doxycycline أو macrolide} أو معالجة وحيدة ب fluoroquinolone تنفسي	يوجد إصابات مشاركة (داء كلوي- رئوي- كبدي- قلبي مزمن، سكري، كحولية، خبائة، لا طحالية)

Amoxicillin 1 غ 3 مرات باليوم ، doxycycline 100 مغ مرتين باليوم ، azithromycin 500 مغ باليوم
الأول ثم 250 مغ يومياً ، clarithromycin 500 مغ مرتين باليوم ، Amoxicillin / clavulanate 500 مغ
125/ مغ 3 مرات باليوم أو 875 مغ / 125 مغ مرتين باليوم أو 2000 مغ / 125 مغ مرتين باليوم ،
cefprozime 200 مغ مرتين باليوم ، cefuroxime 500 مغ مرتين باليوم ، levofloxacin 750 مغ مرة
باليوم ، moxifloxacin 400 مغ مرة باليوم ، gemifloxacin 320 مغ مرة باليوم .

ملاحظة :

عوامل الخطر للإصابة ب MRSA أو P. aeruginosa: عزل تنفسي سابق ل MRSA أو
P. aeruginosa أو استشفاء حديث مع تلقي صادات خلالية (خلال 90 يوم الماضية)

الجدول رقم 8: استراتيجيات المعالجة البدئية لمرضى ذات الرئة المكتسبة في المجتمع المقبولين في المشفى اعتماداً على مستوى الشدة وخطر المقاومة الدوائية (6)

المعالجة المعيارية	عزل تنفسي سابق ل MRSA	عزل تنفسي سابق ل P. aeruginosa	استشفاء حديث مع تلقي صادات خلالية ووجود عوامل خطر مصادق عليها محلياً ل P. aeruginosa	استشفاء حديث مع تلقي صادات خلالية ووجود عوامل خطر مصادق عليها محلياً ل MRSA
ذات رئة غير شديدة	β-lactam +macrolid أو respiratory fluoroquinolone	إضافة تغطية MRSA وإجراء زروعات و PCR على المسحات الأنفية لتخفيف أو إثبات الحاجة لمتابعة العلاج	إضافة تغطية P. aeruginosa وإجراء زروعات لتخفيف أو إثبات الحاجة لمتابعة العلاج	إجراء زرع مع الامتناع عن تغطية MRSA حتى صدور نتائج الزرع الايجابية. في حال توفر rapid nasal PCR وكانت نتيجته سلبية نمتنع عن إضافة المعالجة التخبرية ل MRSA ، وفي حال إيجابيته نضيف التغطية و نجري زروعات

ذات رئة شديدة	β -lactam+macrolide أو β -lactam + fluoroquinolone	إضافة تغطية MRSA وإجراء زروعات و PCR على المسحات الأنفية لتخفيف أو إثبات الحاجة لمتابعة العلاج	إضافة تغطية P. aeruginosa وإجراء زروعات لتخفيف أو إثبات الحاجة لمتابعة العلاج	إضافة تغطية MRSA ونجري nasal PCR وتخفيف أو إثبات الحاجة لمتابعة العلاج	إضافة تغطية P. Aeruginosa ونجري زرع لتخفيف أو إثبات الحاجة لمتابعة العلاج
---------------	--	--	---	--	---

- β -lactam : Ampicillin + sulbactam 1.5 - 3 غ كل 6 ساعات ، cefotaxime 1 - 2 غ كل 8 ساعات ، ceftaroline 600 مغ كل 12 ساعة .
- macrolide : azithromycin 500 مغ باليوم ، clarithromycin 500 مغ مرتين باليوم .
- respiratory fluoroquinolone : levofloxacin 750 مغ مرة باليوم ، moxifloxacin 400 مغ مرة باليوم .

• **تغطية MRSA (حسب 2016 ATS/IDSA HAP/VAP guidelines) :**

- Vancomycin : 15 مغ/كغ كل 12 ساعة أو
- Linzolid : 600 مغ/كغ كل 12 ساعة

• **تغطية P. aeruginosa (حسب 2016 ATS/IDSA HAP/VAP guidelines) :**

- Piperacillin-tazobactam : 4.5 غ كل 6 ساعات
- Cefepime : 2 غ كل 8 ساعات
- Ceftazidime : 2 غ كل 8 ساعات
- Imipenem : 500 مغ كل 6 ساعات
- Meropenem : 1 غ كل 8 ساعات
- Aztreonam : 2 غ كل 8 ساعات

ملاحظات :

✓ توصي IDSA /ATS (2019) بإعطاء معالجة مضادة للانفلونزا (مثل oseltamivir)
للبالغين المصابين بذات الرئة المكتسبة في المجتمع الذين لديهم اختبار إيجابي للانفلونزا بغضّ
النظر عن مدة المرض قبل التشخيص .(6)

✓ في حال كان اختبار الانفلونزا إيجابى عند مريض ذات الرئة المكتسبة في المجتمع مع عدم
وجود دليل على عامل ممرض جرثومي(بما فيه مستويات البروكالسيتونين المنخفضة) مع
استقرار سريري؛ يمكن عندها إيقاف المعالجة بالصادات باكراً (خلال 48-72 ساعة) (6)

✓ تقترح IDSA /ATS (2019) عدم إضافة تغطية لا هوائيات بشكل روتيني ما لم يكن هناك
خارجة رئوية أو تقيح جنب. (6)

مدة المعالجة بالصادات :

يجب أن تستمر المعالجة حتى وصول المريض للاستقرار السريري ولمدة لا تقلّ عن خمسة أيام (6)

معايير الاستقرار السريري :

- النبض ≥ 100 / د
- عدد مرات التنفس ≥ 24 / د
- ضغط الدم الانقباضي ≤ 90 مم ز
- الحرارة ≥ 37.8 °س
- القدرة على تناول الطعام و الشراب
- حالة ذهنية طبيعية
- لا يوجد نقص أكسجة دم ($\text{PaO}_2 \geq 60 \text{ mmHg}$ & $\text{SaO}_2 \geq 90 \%$) (18)

توصي IDSA /ATS (2019) بعدم إجراء صورة صدر بشكل روتيني للمتابعة عند مرضى ذات الرئة المكتسبة في المجتمع الذين زالت أعراضهم خلال 5 - 7 أيام.(6)

ذات الرئة المعقدة :

- يُلاحظ عادةً التحسن السريري في غضون 48 - 72 ساعة من بدء العلاج بالصادات.(3)
- يُعتبر المريض غير مستجيب على العلاج إذا لم يحدث تحسن خلال 72 ساعة (6-15% من المرضى المقبولين في المشفى).(3)
- يستغرق زمن هبوط الحمى الوسطي ثلاثة أيام، بينما قد تحتاج الأعراض الأخرى لشهر حتى تزول خاصةً عند المرضى ذوي الأعمار < 50 سنة، وفي حالات ذات الرئة الشديدة، ووجود إمبراضيات مشاركة(3)

عوامل الخطر للتغنيذ الدوائي :

- العمر < 65 سنة
 - الكحولية
 - وجود إمراضيات مشاركة (COPD ، أمراض كبدية-كلوية ، خباثات ، داء سكري ، قصور قلب مزمن ، تثبيط مناعي)
 - استخدام حديث (3 - 6 أشهر) لمركبات β -لاكتام، ماكروليد أو فلوروكينولون .(3)
- يستطب تغيير الصادات قبل 72 ساعة فقط للمرضى الذين يتدهور وضعهم أو عند الحصول على نتائج زرع جديدة .(3)

أسباب فشل العلاج :

- ❖ تأخر استجابة المضيف.
- ❖ عدم فعالية التغطية بالصادات (تدرن، فطور، نوкарديا، عوامل ممرضة مقاومة) .
- ❖ وجود اختلاط للإنتان البدئي (يُطلب طبقي محوري للصدر ويزل جنب لتقييم الانصباب، الخراجة، انسداد الطرق الهوائية، تقيح الجنب) .
- ❖ أسباب غير إنتانية (تنشؤ، التهاب أوعية، BOOP ، COP ، ذات رئة بالحمضات) .(3)

الوقاية :

لقاح المكورات الرئوية : PCV13 & PPSV23

يُعطى في الحالات التالية :

- ✓ جميع المرضى أسوياء المناعة ذوو الأعمار < 65 سنة
- ✓ ذوو الأعمار > 65 سنة مع أي مما يلي: COPD، قصور قلب مزمن، داء سكري، كحولية، تشمع كبد، لا طحالية، قصور كلوي مزمن، إيدز، ابيضاض دم، لمفوما، ورم نقوي عديد، خباثة معمرة، استخدام مثبطات مناعة، استخدام مزمن للستيروئيدات.

يُعاد لقاح PPSV23 بعد خمس سنوات من اللقاح البدئي.(3)

لقاح الانفلونزا :

يمكن إعطاؤه سنوياً لجميع الأشخاص ذوي الأعمار < 6 أشهر وخاصةً للمجموعات عالية الخطورة: أعمار < 65 سنة، أمراض مزمنة (داء سكري، قصور كلية، تثبيط مناعي) ، الأشخاص الذين يمكن أن ينقلوا الانفلونزا لأشخاص عاليي الخطورة (العاملين في مجال الرعاية الصحية، العاملين في العناية التمريضية المنزلية).(3)

القسم العملي

The Practical Section

أهمية البحث وخلفيته

رغم التطور المهم في الخيارات العلاجية تبقى الوفيات المسببة بذات الرئة المكتسبة في المجتمع مرتفعة (19، 20)

يعد تقييم شدة ذات الرئة المكتسبة في المجتمع جوهرياً لتدبير المرضى .

وضعت الجمعية الأمريكية للأمراض الإنتانية IDSA والجمعية الأمريكية للأمراض الصدرية ATS تسعة معايير صغرى لتقييم شدة ذات الرئة المكتسبة في المجتمع تتضمن :

- معايير CURB-65 باستثناء العمر (تخليط ذهني، يوريا <7ممول/ل، عدد مرات التنفس ≤ 30 مرة /د، انخفاض ضغط الدم الشرياني)
- $250 \geq PaO_2/FiO_2$
- ارتشاحات متعددة الفصوص
- نقص تعداد كريات الدم البيضاء
- نقص تعداد الصفيحات
- انخفاض الحرارة. (19)

أظهرت دراسة سريرية حديثة بأن معايير IDSA\ATS الصغرى يمكن أن تحسن تدبير المرضى وهذا يعتمد أولاً على الدقة في التنبؤ بقبولات العناية المشددة. (21)

بالرغم من أن معايير IDSA\ATS صممت لتوجيه قبولات العناية المشددة ولكنها ترتبط أيضاً بالوفيات، وبالتالي يمكن اعتمادها كمشرع إنذاري للوفيات. (22)

كما أظهرت دراسة أخرى بأن معايير IDSA\ATS 2007م لتقييم شدة ذات الرئة المكتسبة في المجتمع كانت ذات قيمة تنبؤية غير جيدة للتنبؤ بوفيات المرضى المقبولين في المشفى، مما يقترح أن المعايير الصغرى يجب أن تبسط لتزيد الحساسية كما يجب أن تعدل لتلائم التنبؤ بالوفيات. (23)

حيث وجهت إلى إمكانية حذف أربعة متغيرات غير أساسية (نقص تعداد الكريات البيضاء، انخفاض الحرارة، انخفاض ضغط الدم الشرياني، نقص تعداد الصفيحات). (23)

أظهرت دراسة سابقة بأن العمر ≤ 65 سنة يرتبط بشكل مستقل بالوفيات، وبالتالي ضم العمر ≤ 65 سنة للمعايير الصغرى المبسطة يزيد الحساسية ويلائم تنبؤاً أفضل بالوفيات. (23)

هذه المعايير المعدلة تساعدنا أكثر لاتخاذ قرارات سريرية دقيقة بشأن مكان علاج المرضى (منزل، جناح، عناية مشددة). (23)

يحسن القرار السليم العلاج البدني بالصادات ويفيد في إنقاص الوفيات. (24)

هدف الدراسة :

تعديل معايير IDSA\ATS الصغرى المستخدمة لتقييم شدة ذات الرئة المكتسبة في المجتمع لتصبح أكثر ملاءمةً لتحديد مكان علاج المرضى وللتنبؤ بالوفيات .

الفرضية البحثية :

معايير IDSA\ATS الصغرى المعدلة لتقييم شدة ذات الرئة المكتسبة في المجتمع يمكن أن تصبح أكثر ملاءمةً لتحديد مكان علاج المرضى وللتنبؤ بالوفيات.

السؤال البحثي :

هل معايير IDSA\ATS الصغرى المعدلة لتقييم شدة ذات الرئة المكتسبة في المجتمع يمكن أن تصبح أكثر ملاءمةً لتحديد مكان علاج المرضى وللتنبؤ بالوفيات؟

المواد و طريقة الدراسة :

زمن الدراسة : 2018 -2019م.

مكان الدراسة : مشفى الموساة الجامعي- مشفى الأسد الجامعي.

تصميم الدراسة : دراسة حشدية مستقبلية.

معايير الاستبعاد :

1. المرضى ذوو الأعمار >18 سنة.
2. قبول في المشفى خلال 90 يوم السابقة للدراسة.
3. وجود تثبيط مناعي.
4. وجود سل فعال.
5. وجود أمراض مستبطنة انتهائية(قصور كلوي مزمن انتهائي، قصور قلب بمراحله الأخيرة) .

معايير الاشتمال:

إنتان حاد في البرانشيم الرئوي مرتبط بارتشاح حاد على صورة الصدر مع اثنين أو أكثر من الأعراض التالية (حرارة < 38، عرواءات، تعرق، سعال حديث أو تغير بلون القشع، عدم ارتياح صدري، زلة تنفسية)

العينة المستهدفة:

جميع المرضى المقبولين في المشفى المشخص لهم ذات رئة مكتسبة في المجتمع، تم حساب حجم العينة اعتمادا على موقع الدراسات الإحصائية WWW.OPENEPI.COM (باعتبار مجال الثقة 95%) وتم تقديرها ب 200 مريض.

طريقة الدراسة :

تمّ جمع عينة البحث (المرضى المقبولين في المشفى المشخص لهم ذات رئة مكتسبة في المجتمع) وتقييمهم باستخدام ATS Guidelines حيث تمّ جمع البيانات التشخيصية السريرية والمخبرية والشعاعية وتطبيق معايير IDSA\ATS والمعايير المبسطة (الناجمة عن حذف المتغيرات الأربعة غير المساهمة أو غير المتواترة) والمعايير المعدلة (الناجمة بعد حذف تلك المتغيرات ثمّ إضافة العمر ≤ 65 سنة) ومعايير CURB-65 (جدول 9) . تمّ وضع الصادات الأولية بناء على التوصيات العالمية بالإضافة لأخذ زروعات لاحقة وهكذا اعتبرنا أن كل المرضى تلقوا صادات ملائمة وتخرجوا عندما أصبحوا مستقرين سريرياً. تمّ متابعة المرضى حتى التخريج لرصد حدوث الوفيات.

النتائج المتوقعة :

معايير IDSA\ATS الصغرى 2007م يمكن أن تبسط لخمس متغيرات ثم تعدل لتلائم التنبؤ بالوفيات عند مرضى ذات الرئة المكتسبة في المجتمع؛ وهذه الرؤية المعدلة هي أفضل مشعر إنذاري للوفيات وأكثر ملاءمةً للعيادة والإسعاف .

القضايا الأخلاقية :

تم أخذ الموافقة المستنيرة من كل المرضى وشرح أن الموافقة تعني التزويد بالمعلومات المتعلقة بالمرض مع التأكيد على سرية المعلومات وعدم إجراء أي استقصاء غير ضروري وعدم إعطاء أي دواء تجريبي وعدم حصول المشارك على أية تعويضات مالية وأن رفض المشارك ليس له أي تبعات والمشاركة ليست إلزامية وأن المشارك له حق الانسحاب متى شاء.

التحليل الإحصائي :

شارك في الدراسة 200 مريض، لم يستكمل الدراسة 5 مرضى بسبب تخرجهم على مسؤوليتهم.

- بعد جمع البيانات تم إجراء التحاليل الإحصائية باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS16 و MedCalc14,8,1

- تم الإبلاغ عن المتغيرات المطلقة بشكل نسب مئوية والمتغيرات المستمرة بشكل متوسط حسابي $\pm$ الانحراف المعياري.

- تم استخدام اختبار تحليل الاختلاف Chi-square لإثبات وجود أو عدم وجود اختلافات هامة إحصائية. تم اعتبار قيمة $P > 0.05$ مهمة إحصائية.

- تم رسم تمثيل بياني لمنحنيات خاصية المشغل المتلقي (receiver operating characteristic curves) وحساب المساحة تحت المنحنيات (area under the receiver operating characteristic curves) لتمثيل ومقارنة دقة المناسب. كما تم حساب الحساسية والنوعية والقيم التنبؤية الايجابية والقيم التنبؤية السلبية ومشعر يودين.

الجدول رقم 9: مكونات الأحراز المدروسة

معايير CURB-65	المعايير الصغرى المعدلة	المعايير الصغرى المبسطة	معايير IDSA/ATS الصغرى
تخليط ذهني	تخليط ذهني	تخليط ذهني	تخليط ذهني
يوريما	يوريما	يوريما	يوريما
عدد مرات التنفس ≤ 3 مرة/د	عدد مرات التنفس ≤ 30 مرة/د	عدد مرات التنفس ≤ 30 مرة/د	عدد مرات التنفس ≤ 30 مرة/د
انخفاض ضغط الدم الشرياني	$PaO_2/FiO_2 \leq 250$	$PaO_2/FiO_2 \leq 250$	انخفاض ضغط الدم الشرياني
العمر ≤ 65 سنة	ارتشاحات متعددة الفصوص	ارتشاحات متعددة الفصوص	$PaO_2/FiO_2 \leq 250$
	العمر ≤ 65 سنة		ارتشاحات متعددة الفصوص
			نقص كريات الدم البيضاء
			نقص الصفائح
			انخفاض الحرارة

نتائج الدراسة :

الدراسة الإحصائية الوصفية للعينة المدروسة :

تم توضيح الخصائص الأساسية للعينة المدروسة في الجدول رقم 10.

الجدول رقم 10: الخصائص الأساسية للعينة المدروسة (المتوسط الحسابي $\pm$ الانحراف المعياري)

الخصائص	العينة (n=195)
العمر (سنوات)	49.4 $\pm$ 23
الجنس (ذكور %)	51%
مدة البقاء في المشفى (أيام)	10.5 $\pm$ 7
العمر $\leq$ 65 سنة (%) (عدداً)	31.2% (61)
عدد مرات التنفس $\leq$ 30 مرة/د (%) (عدداً)	10.7% (21)
PaO ₂ /FiO ₂ $\leq$ 250 (%) (عدداً)	14.3% (28)
ارتشاحات متعددة الفصوص (%) (عدداً)	39.5% (77)
تخليط ذهني (%) (عدداً)	6.6% (13)
يوريميا (%) (عدداً)	17.4% (34)
نقص بيض (%) (عدداً)	7.7% (15)
نقص صفيحات (%) (عدداً)	5.1% (10)
انخفاض الحرارة (%) (عدداً)	6.1% (12)
انخفاض ضغط الدم الشرياني (%) (عدداً)	20% (39)

المتغير الأقل تواتراً هو نقص الصفيحات حيث تواجد عند 5.1 % فقط من المرضى، بينما كانت الارتشاحات متعددة الفصوص هي الأكثر تواتراً حيث تواجدت عند 39.5 % من المرضى يليها العمر $\leq$ 65 سنة حيث تواجد عند 31.2 % من المرضى.

دراسة العلاقة مع الوفيات:


تمّ تسجيل 8 حالات وفاة و 187 حالة تحسن، وبالتالي نسبة الوفيات كانت 4.1 % (كما هو

موضح في الجدول رقم 11)

الجدول رقم 11: توزيع العينة حسب حصيلة المرض

الحصيلة	العدد	النسبة المئوية
تحسن	187	95.9%
وفاة	8	4.1%
المجموع	195	100%

مخطط يوضح النسبة المئوية لتوزيع عينة البحث حسب حصيلة المرض



ازدادت نسب الوفيات مع ازدياد عدد معايير IDSA/ATS والمعايير المبسطة والمعايير المعدلة المحققة (كما هو موضح في الجدول رقم 12).

تم دراسة العلاقة بين المتغيرات ونسب الوفيات في التحليل أحادي المتغير (جدول رقم 13)؛ حيث وجدنا أن المتغيرات المرتبطة بالوفيات بشكل غير هام إحصائياً (قيمة $P < 0.05$) هي نقص البيض، نقص الحرارة، انخفاض ضغط الدم الشرياني (كما أن نسب الأرجحية Odds Ratio لها كانت الأقل 0 ، 0 ، 1.3 على التوالي)؛ بينما ارتبطت المتغيرات المتبقية بالوفيات بشكل هام إحصائياً (قيمة $P > 0.05$).

الجدول رقم 12: العلاقة بين نسب الوفيات وعدد المعايير المحققة في كل من الأحرار المدروسة

الوفيات (%) (n = 8)	مجموع المرضى (n = 195)	عدد المعايير	الحرز
0 (0)	96	0	معايير IDSA/ATS الصغرى
1 (2.5)	39	1	
1 (4.5)	22	2	
3 (12)	25	3	
3 (23)	13	4	
0 (0)	109	0	المعايير الصغرى المبسطة
1 (2.5)	39	1	
2 (6.5)	31	2	
4 (28.6)	14	3	
1 (50)	2	4	
0 (0)	94	0	المعايير الصغرى المعدلة
0 (0)	36	1	
1 (3.2)	31	2	
2 (8.7)	23	3	
4 (40)	10	4	
1 (100)	1	5	
0 (0)	98	0	معايير CURB-65
1 (2.6)	38	1	
1 (3.1)	32	2	
2 (14.2)	14	3	
3 (27.2)	11	4	
1 (50)	2	5	

نلاحظ ازدياد نسب الوفيات مع ازدياد عدد معايير IDSA/ATS الصغرى والمعايير المبسطة والمعايير المعدلة ومعايير CURP-65 المحققة.

الجدول رقم 13: العلاقة بين نسب الوفيات ومتغيرات الدراسة

المتغيرات	عدد المرضى	عدد الوفيات (%)	نسب الأرجحية Odds Ratio	P value
عدد مرات التنفس ≤ 30 مرة/د	21	2 (9.5)	2.9	0.005
$PaO_2/FiO_2 \leq 250$	28	4 (14.2)	6.8	< 0.001
ارتشاحات متعددة الفصوص	77	4 (5.1)	1.6	0.003
تخليط ذهني	13	3 (23)	10.6	< 0.001
يوريميا	34	4 (11.7)	5.2	< 0.001
نقص الصفائح	10	1 (10)	2.8	0.004
نقص كريات الدم البيضاء	15	0 (0)	0	0.996
نقص الحرارة	12	0 (0)	0	0.997
انخفاض ضغط الدم الشرياني	39	2 (5.1)	1.3	0.162
العمر ≤ 65 سنة	61	5 (8.1)	3.9	< 0.001

نلاحظ أن المتغيرات المرتبطة بالوفيات بشكل غير هام إحصائياً (قيمة $P < 0.05$) هي نقص البيض، نقص الحرارة، انخفاض ضغط الدم الشرياني (قيمة P لها كانت 0.996 ، 0.997 ، 0.162 على التوالي) ، كما أن نسب الأرجحية لها كانت الأقل (0 ، 0 ، 1.3 على التوالي)؛ بينما ارتبطت المتغيرات المتبقية بالوفيات بشكل هام إحصائياً (قيمة $P > 0.05$).

المقارنة بين الأحراز :

تم حساب الحساسية والنوعية والقيم التنبؤية للتنبؤ بالوفيات لكل من الأحراز (الجدول رقم 14).

كانت الحساسية والنوعية والقيمة التنبؤية الإيجابية ومشعر يودين للتنبؤ بالوفيات للمعايير الصغرى المعدلة هي النموذج الأفضل .

أظهرت منحنيات خاصية المشغل المتلقي ROC للأحراز الثلاثة بالإضافة ل CURB-65 الاختلافات في الدقة بالتنبؤ بالوفيات (الشكل، جدول رقم 15، جدول رقم 16) .

تمثلت الدقة الأعلى للمعايير الصغرى المعدلة بالمساحة تحت المنحنى AUC الأعلى (0.937) ؛ الترتيب التنازلي للمساحات تحت المنحنى: المعايير الصغرى المعدلة، المعايير الصغرى المبسطة، معايير IDSA/ATS الصغرى. كانت المساحة تحت المنحنى لمعايير CURB-65 قريبة من المعايير المبسطة لكنها أقل من المعايير المعدلة .

الجدول رقم 14: خصائص الأحراز المدروسة للتنبؤ بالوفيات


الحرز	عدد المعايير المحققة	الحساسية (%)	النوعية (%)	القيمة التنبؤية الإيجابية (%)	القيمة التنبؤية السلبية (%)	مشعر Youden
معايير IDSA/ATS الصغرى	$0 \leq$	100	0	4.1	0	0
	$1 \leq$	100	51	8	100	0.51
	$2 \leq$	87.5	71.6	11.6	99.2	0.59
	$3 \leq$	75	82.8	15.8	98.7	0.58
	$4 \leq$	37.5	94.6	23	97.2	0.32
المعايير الصغرى المبسطة	$0 \leq$	100	0	4.1	0	0
	$1 \leq$	100	58.2	9.3	100	0.58
	$2 \leq$	87.5	78.6	14.9	99.3	0.66
	$3 \leq$	62.5	94.1	31.2	98.3	0.56
	$4 \leq$	12.5	99.5	50	96.4	0.12

0	0	4.1	0	100	$0 \leq$	المعايير الصغرى المعدلة
0.50	100	7.9	50.2	100	$1 \leq$	
0.69	100	12.3	69.5	100	$2 \leq$	
0.73	99.4	20.5	85.5	87.5	$3 \leq$	
0.59	98.3	45.5	96.8	62.5	$4 \leq$	
0.125	96.4	100	100	12.5	$5 \leq$	
0	0	4.1	0	100	$0 \leq$	معايير CURB-65
0.52	100	8.2	52.4	100	$1 \leq$	
0.59	99.2	11.8	72.1	87.5	$2 \leq$	
0.63	98.8	22.2	88	75	$3 \leq$	
0.45	97.8	30	95	50	$4 \leq$	
0.119	96.4	50	99.4	12.5	5	

نلاحظ أن الحساسية والنوعية والقيمة التنبؤية الإيجابية ومشعر يودين للتنبؤ بالوفيات للمعايير

الصغرى المعدلة هي النموذج الأفضل يليها المبسطة ثم CURB-65

شكل يبين منحنيات ROC للتنبؤ بالوفيات لكل من الأحرار المدروسة



أظهرت منحنيات خاصية المشغل المتلقي ROC للأحرار الثلاثة بالإضافة ل CURB-65 الاختلافات في الدقة بالتنبؤ بالوفيات، تمّ حساب بالمساحة تحت المنحنى AUC للأحرار والمقارنة بينها في الجدولين التاليين

الجدول رقم 15: قيم المساحة تحت المنحنى AUC للأحراز المدروسة :

الحرز	قيمة AUC
معايير IDSA/ATS الصغرى	0.835
المعايير الصغرى المبسطة	0.897
المعايير الصغرى المعدلة	0.937
معايير CURB-65	0.895

تمثلت الدقة الأعلى للمعايير الصغرى المعدلة بالمساحة تحت المنحنى AUC الأعلى (0.937) ؛
الترتيب التنازلي للمساحات تحت المنحنى: المعايير الصغرى المعدلة، المعايير الصغرى المبسطة،
معايير IDSA/ATS الصغرى. كانت المساحة تحت المنحنى لمعايير CURB-65 قريبة من
المعايير المبسطة لكنها أقل من المعايير المعدلة .

الجدول رقم 16: مقارنة قيم المساحة تحت المنحنى AUC بين الأحراز المدروسة :

الأحراز	الاختلاف	قيمة P
المبسطة ~ IDSA/ATS	0.062	< 0.0001
المعدلة ~ IDSA/ATS	0.102	< 0.0001
IDSA/ATS ~ CURB-65	0.060	< 0.0001
المعدلة ~ المبسطة	0.040	< 0.0001
CURB-65 ~ المبسطة	0.002	0.8317
CURB-65 ~ المعدلة	0.042	0.0006

مناقشة النتائج :

- تُظهر الموجودات التي حصلنا عليها ازدياد عدد المعايير المحققة في الأحرار المدروسة يرتبط بشكل إيجابي مع الوفيات، كما أنّ الحساسية والنوعية و القيمة التنبؤية الإيجابية ومشعر يودين للمعايير الصغرى المعدلة للتنبؤ بالوفيات كانت النموذج الأفضل، وكذلك تمثلت الدقة العالية للمعايير المعدلة بالتنبؤ بالوفيات بالمساحة تحت المنحنى الأعلى (الترتيب التنازلي لقيم المساحة تحت المنحنى للأحرار: المعايير المعدلة، المعايير المبسطة، معايير IDSA/ATS الصغرى).
- وجدنا في دراستنا أنّ المتغيرات الأربعة غير المتواترة أو غير المساهمة (نقص تعداد الكريات البيضاء، انخفاض الحرارة، انخفاض ضغط الدم الشرياني، نقص تعداد الصفائح) يمكن أن تُحدَف وهذا الحذف يزيد القيمة التنبؤية الإيجابية والمساحة تحت منحنى ROC للتنبؤ بالوفيات
- إنّ ضمّ معيار العمر ≤ 65 سنة للمعايير المبسطة زاد من قيمة الحساسية ومشعر يودين و AUC وبالتالي تنبؤ أفضل بالوفيات.
- إنّ أداء الأحرار يختلف بشكل ملحوظ بين الدراسات المختلفة وفي أنظمة الرعاية الصحية المختلفة، وبالتالي إذا كانت جمهرة المرضى التي طُبّق عليها الحرز مختلفة بشكل هام عن المنشأ الأصلي فمن الضروري عندها أن يُجرى إعادة تقييم محلّي للحرز. لذلك نوصي بإجراء دراسات متعددة المراكز لتقييم إمكانية تعميم الموجودات الحالية.
- تكمن الصعوبة الكبيرة في تدبير مرضى ذات الرئة المكتسبة في المجتمع بكشف المرضى الذين يمكن أن يطوروا بسرعة نتائج طبية سيئة من بين المرضى الذين لم يحققوا معايير IDSA/ATS الكبرى. يمكن أن تتم الاستفادة من الموجودات التي حصلنا عليها في تدبير المرضى خاصةً في قسم الإسعاف وبالتالي تحسين البقاء؛ حيث يمكن أن يتم فرز مرضى ذات الرئة المكتسبة في المجتمع بشكل مناسب أكثر وفقاً للمعايير المبسطة، وبالشكل الأدق وفقاً للمعايير المعدلة؛ إذ تساعد هذه المعايير (المبسطة والمعدلة) بصنع قرار سليم أكثر دقة حول مكان علاج المرضى (عناية مركزة ، جناح).

مقارنة مع الدراسات العالمية :

تم نشر العديد من الدراسات العالمية حول تقييم معايير IDSA/ATS الصغرى وكانت النتائج متضاربة بهذا الخصوص .

إنّ من أهم هذه الدراسات التي أجريت حول هذا الموضوع هي دراسة حشدية قهقرية أجريت في الصين شملت 1245 مريض ذات رئة مكتسبة في المجتمع من عام 2005 حتى عام 2009 لتقييم أهمية كل معيار من معايير IDSA/ATS الصغرى التسعة، ونشرت عام 2011، (22) اقترحت الدراسة أن هذه المعايير كانت بأهمية غير متكافئة للتنبؤ بالوفيات وحرز SOFA والبقيا في المشفى والتكلفة، حيث وجدت أنّ:

- المتغيرات الأكثر ارتباطاً بالوفيات هي $PaO_2 / FiO_2 \leq 250$ والتخليط الذهني و اليوريميا.
- نقص البيض، نقص الحرارة وانخفاض ضغط الدم الشرياني كانت غير مرتبطة بالوفيات.
- اليوريميا و $PaO_2 / FiO_2 \leq 250$ مرتبطة بشدة مع حرز SOFA.
- $PaO_2 / FiO_2 \leq 250$ والتخليط الذهني كانت لها العلاقة الأوثق مع مدة البقيا في المشفى.
- $PaO_2 / FiO_2 \leq 250$ والارتشاحات متعددة الفصوص كانت الأكثر ارتباطاً بالتكلفة(22)

وهذه النتائج تتوافق مع دراستنا فيما يتعلق بالتنبؤ بالوفيات.

دراسة الصين (2005-2009)	دراستنا (2018-2019)
حشدية قهقرية شملت 1245 مريض	حشدية مستقبلية شملت 195 مريض
هدف الدراسة: تقييم أهمية كل معيار من معايير IDSA/ATS الصغرى في التنبؤ بالوفيات وحرز SOFA والبقيا في المشفى والتكلفة	هدف الدراسة: تعديل معايير IDSA/ATS الصغرى لتصبح أكثر ملائمة لتحديد مكان علاج المرضى و للتنبؤ بالوفيات
وجدت أن المتغيرات الأكثر ارتباطاً	وجدنا أن المتغيرات المرتبطة بالوفيات بشكل

غير هام إحصائياً هي نقص البيض، نقص الحرارة، انخفاض ضغط الدم الشرياني؛ بينما ارتبطت المتغيرات المتبقية بالوفيات بشكل هام إحصائياً.	بالوفيات هي $PaO_2 / FiO_2 \leq 250$ والتخليط الدهني واليوريميا؛ بينما نقص البيض، نقص الحرارة وانخفاض ضغط الدم الشرياني كانت غير مرتبطة بالوفيات.
---	---

أما دراسة Sibila وزملاءه لتقييم دور معايير IDSA/ATS الصغرى في التنبؤ بالوفيات والحاجة لتهوية آلية غازية و/أو الحاجة لدعم بمقبضات الأوعية وهي حشدية قهقرية شملت 787 مريض من عام 1999 لعام 2002 ونشرت عام 2012، فقد وجدت أن نقص الأكسجة والارتشاحات متعددة الفصوص ونقص البيض كانت الأكثر ارتباطاً بالوفيات بينما نقص الأكسجة والتخليط الدهني كانت الأكثر ارتباطاً بالحاجة لتهوية آلية غازية و/أو دعم بمقبضات الأوعية. (25)

وهذا يختلف مع الدراسة سابقة الذكر ودراستنا فيما يتعلق بنقص البيض حيث وجدنا أنه غير مرتبط بالوفيات.

دراسة Sibila وزملائه (1999-2002)	دراستنا (2018-2019)
حشدية قهقرية شملت 787 مريض	حشدية مستقبلية شملت 195 مريض
هدف الدراسة: تقييم دور معايير IDSA/ATS الصغرى في التنبؤ بالوفيات والحاجة لتهوية آلية غازية و/أو الحاجة لدعم بمقبضات الأوعية	هدف الدراسة: تعديل معايير IDSA/ATS الصغرى لتصبح أكثر ملاءمةً لتحديد مكان علاج المرضى وللتنبؤ بالوفيات
وجدت أن نقص الأكسجة والارتشاحات متعددة الفصوص ونقص البيض كانت الأكثر ارتباطاً بالوفيات	وجدنا أن المتغيرات المرتبطة بالوفيات بشكل غير هام إحصائياً هي نقص البيض، نقص الحرارة، انخفاض ضغط الدم الشرياني؛ بينما ارتبطت المتغيرات المتبقية بالوفيات بشكل هام إحصائياً.

كما أن من أقدم الدراسات في هذا المجال دراسة Phua وزملاؤه التي أجريت في سنغافورة للمصادقة على معايير IDSA/ATS الصغرى وكانت حشدية قهقرية شملت 1242 مريض ذات رئة مكتسبة في المجتمع من عام 2004 حتى عام 2007، ونشرت عام 2009، تم فيها مقارنة الخصائص التنبؤية للمعايير الصغرى مع حرز PSI و CURB-65 للتنبؤ بالوفيات وقبولات العناية المركزة وخلصت إلى أن المعايير الصغرى أكثر نوعية من PSI وأكثر حساسية من CURB-65 في التنبؤ بالوفيات وقبولات العناية المركزة.(26)

دراسة Phua وزملاؤه(2004-2007)	دراسة(2018-2019)
حشدية قهقرية شملت 1242 مريض	حشدية مستقبلية شملت 195 مريض
هدف الدراسة: مقارنة الخصائص التنبؤية للمعايير الصغرى مع حرز PSI و CURB-65 للتنبؤ بالوفيات وقبولات العناية المركزة وذلك للمصادقة على معايير IDSA/ATS الصغرى	هدف الدراسة: تعديل معايير IDSA/ATS الصغرى لتصبح أكثر ملاءمة لتحديد مكان علاج المرضى وللتنبؤ بالوفيات
وجدت أن المعايير الصغرى أكثر نوعية من PSI وأكثر حساسية من CURB-65 في التنبؤ بالوفيات وقبولات العناية المركزة.	وجدنا أن المعايير المعدلة أكثر حساسية ونوعية من المعايير المبسطة والصغرى و CURB-65 في التنبؤ بالوفيات

بينت دراسات أخرى أن حرز CURB-65 يتنبأ بالوفيات بشكل أفضل من معايير IDSA/ATS الصغرى في الحالات التي تكون فيها نسب الوفيات منخفضة (27)، ضم المتغيرات غير التنبؤية يمكن أن يفسر ذلك .

وجدنا في دراستنا أن المعايير الصغرى المعدلة كان أداؤها أفضل من حرز CURB-65 في التنبؤ بالوفيات؛ يمكن تفسير ذلك بأن $PaO_2/FiO_2 \leq 250$ (ذات القيمة التنبؤية العالية) والارتشاحات متعددة الفصوص يتم استبدالها بانخفاض الضغط الانقباضي (وهو متغير غير تنبؤي) وهذا هو الاختلاف بين المعايير المعدلة و حرز CURB-65.

وهناك دراسة Salih وزملائه التي أجريت في المملكة المتحدة ونشرت عام 2013 والتي تعد أيضاً من أهم الدراسات حيث قامت بإجراء مراجعة منهجية و تحليل تلوي على سبع دراسات رقابية تراوح حجم العينات فيها من 158 إلى 2413 مريض لتقييم القيمة الإنذارية لكل مكون من معايير IDSA/ATS الصغرى وكانت نتیجتها أن نقص البيض ونقص الصفیحات ونقص الحرارة حدثت في أقل من 5% من الحالات، ثم تم استخدام الحرز المبسط -عن طریق حذف هذه المتغيرات - في التنبؤ بالوفیات وبقبولات العناية المركزة ولم تجد تحسناً بالتنبؤات هام إحصائياً، وبناءً على ذلك اقترحت تبسيط المعايير الصغرى عن طریق حذف هذه المتغيرات الثلاثة غير المتواترة وبالتالي الحصول على حرز من ستة متغيرات بنفس الدقة الإنذارية.(28)

- في دراستنا: ساعد الحذف الإضافي لمعيار انخفاض ضغط الدم الشرياني في تحسين التنبؤ بالوفیات. إن ضم المتغيرات غير التنبؤية يتسبب بنسب إيجابية كاذبة أعلى (نوعية أقل)، ونسب سلبية كاذبة أعلى (حساسية أقل) وقيمة تنبؤية إيجابية و سلبية أقل و AUC أقل. الآلية التي يمكن تصورها لتفسير فعالية الحذف الإضافي هي أن وجود معيار ضغط الدم الشرياني ضمن حرز الشدة يمكن أن يؤدي إلى سلبية كاذبة عند الأشخاص المسنين الذين لديهم انتشار عال لارتفاع الضغط الانقباضي بسبب التقدم بالعمر.
- بيّنت دراسة سابقة أن العمر ≤ 65 سنة له علاقة مستقلة بالوفیات، كما وجدت دراسة سابقة (دراسة Kelly وزملائه) أن المرضى ذوي الأعمار ≤ 65 سنة لديهم وقوع أعلى لتبدل الحالة الذهنية وبالتالي حرز CURB-65 و PSI كانت أعلى عندهم (29). وهذا يتوافق مع دراستنا حيث أدى ضم معيار العمر ≤ 65 سنة إلى تنبؤ أفضل بالوفیات.

دراسة Salih وزملائه (2013)	دراستنا (2018-2019)
مراجعة منهجية وتحليل تلوي على سبع دراسات رقابية تراوح حجم العينات فيها من 158 إلى 2413 مريض	حشدية مستقبلية شملت 195 مريض
هدف الدراسة: تقييم القيمة الإنذارية لكل مكون من معايير IDSA/ATS الصغرى	هدف الدراسة: تعديل معايير IDSA/ATS الصغرى لتصبح أكثر ملاءمة لتحديد مكان علاج المرضى و للتنبؤ بالوفيات
وجدت أن نقص البيض ونقص الصفائح ونقص الحرارة حدثت في أقل من 5% من الحالات.	وجدنا أن المتغير الأقل تواتراً هو نقص الصفائح حيث يتواجد عند 5.1 % فقط من المرضى.
تم تبسيط المعايير الصغرى عن طريق حذف المتغيرات الثلاثة غير المتواترة (نقص البيض ونقص الصفائح ونقص الحرارة) وبالتالي الحصول على حرز من ستة متغيرات وكان بنفس الدقة الإنذارية في التنبؤ بالوفيات وبقبولات العناية المركزة.	تم تبسيط المعايير الصغرى عن طريق حذف المتغيرات الأربعة غير المتواترة أو غير المساهمة (نقص تعداد الكريات البيضاء، انخفاض الحرارة، انخفاض ضغط الدم الشرياني، نقص تعداد الصفائح) وكان أداؤه أفضل في التنبؤ بالوفيات. تم تعديل المعايير المبسطة عن طريق ضم معيار العمر ≤ 65 سنة وأدى ذلك إلى تنبؤ أفضل بالوفيات.

نذكر أخيراً دراسة حشدية مستقبلية أجريت في الصين على 1749 مريض من عام 2010 حتى عام 2014 وضعت نقاط لكل متغير من معايير IDSA/ATS الصغرى حيث أعطت نقطتين لكل من $PaO_2/FiO_2 \leq 250$ ، التخليط الذهني واليوريميا، ونقطة واحدة لكل متغير آخر. وكانت النتيجة أنّ نسبة الوفيات وحرز SOFA و PSI ازدادت بشكل هام مع عدد المعايير المحققة ومع ازدياد محصلة النقاط، و أنّ علاقة محصلة النقاط مع الوفيات وحرز SOFA و PSI كانت أقوى من عدد المعايير المحققة ودقتها أعلى في التنبؤ بالوفيات والشدة، وخلصت إلى أنّ الحرز $\leq$ نقطتين أو تحقق معيارين أو أكثر يمكن أن يكون ذا قيمة أكبر لتحديد ذات الرئة الشديدة ودقة أكبر في قرار فرز المرضى.(30)

تختلف هذه الدراسة عن دراستنا في أنها لم تعمل على حذف المتغيرات الأقل ارتباطاً بالوفيات وإنما أعطت أهمية أكبر للمتغيرات الأكثر ارتباطاً بالوفيات دون أن تجري تبسيطاً للمعايير.

دراسة الصين (2010-2014)	دراستنا (2018-2019)
حشدية مستقبلية شملت 1749 مريض	حشدية مستقبلية شملت 195 مريض
تم إعطاء أهمية أكبر للمتغيرات الأكثر ارتباطاً بالوفيات دون أن تجري تبسيطاً للمعايير حيث أعطت نقطتين لكل من $PaO_2/FiO_2 \leq 250$ ، التخليط الذهني واليوريميا، ونقطة واحدة لكل متغير آخر.	تم تبسيط المعايير الصغرى عن طريق حذف المتغيرات الأقل ارتباطاً بالوفيات (نقص تعداد الكريات البيضاء، انخفاض الحرارة، انخفاض ضغط الدم الشرياني، نقص تعداد الصفائح) ثم تعديلها عن طريق ضم معيار العمر ≤ 65 سنة
وجدت أنّ نسبة الوفيات وحرز SOFA و PSI ازدادت بشكل هام مع عدد المعايير المحققة ومع ازدياد محصلة النقاط، و أنّ علاقة محصلة النقاط مع الوفيات وحرز SOFA و PSI كانت أقوى من عدد المعايير المحققة ودقتها أعلى في التنبؤ بالوفيات والشدة.	أدى ذلك التبسيط و التعديل إلى تنبؤ أفضل بالوفيات.

الخلاصة :

يمكن تبسيط معايير IDSA/ATS الصغرى إلى خمسة متغيرات ثم تعديلها لتصبح ملائمة أكثر للتنبؤ بالوفيات ، وهذه المعايير المعدلة هي أفضل مشعر إنذاري للوفيات وأكثر ملاءمة للعيادة والإسعاف.

محددات الدراسة :

- العينة مأخوذة فقط من مشفيين جامعيين في دمشق فهي لا تمثل بالضرورة كل المرضى في سوريا.
- صغر حجم العينة بالمقارنة مع الدراسات العالمية.

التوصيات :

- إجراء دراسات موسعة أكثر تشمل عدة مراكز في عدة محافظات سورية تتضمن عدداً أكبر من المرضى.
- معايير IDSA/ATS الصغرى المعدلة يمكن أن تشكل قاعدة عملية أكثر وملائمة أكثر للعيادة وقسم الإسعاف في التنبؤ بالوفيات عند مرضى ذات الرئة المكتسبة في المجتمع .

المراجع

References

1. Paolo Palango, Gernot Rohde, et al. ERS handbook. Respiratory Medicine. 3rd Edition. **2019**,8:377–382.
2. Tobias Welte. Respiratory Infections. ERS Virtual School. Medizinische Hochschule Hannover. **2020**:54–73.
3. Tao Le, Sunny Khosa, Susan Pasnick , et al. ATS Review for the pulmonary boards. First Edition. **2015**,11:499–508.
4. Metersky ML, Masterton RG, Lode H, et al. Epidemiology, microbiology, and treatment consideration for bacterial pneumonia complicating influenza. Int J Infect Dis **2012**;16:e321–e331.
5. Stephen Chapman, Grace Robinson, John Stradling, et al. Oxford Handbook of Respiratory Medicine. 3rd Edition. **2014**,40:418.
6. Joshua P. Metaly, Grant W. Waterer, Ann C. Long, et al. American Thoracic Society Documents. **2019**,e45–e67.
7. Self WH, Balk RA, Grijalva CG, et al. Procalcitonin as a marker of etiology in adults hospitalized with community–acquired pneumonia. Clin Infect Dis **2017**;65:183–190.
8. Marrie TJ, Huang JQ. Low–risk patients admitted with community–acquired pneumonia. Am J Med **2005**;118:1357–1363.
9. David Ashkin, Michael H. Baumann, Sidney S. Braman, et al. ACCP pulmonary Medicine Board Review. 26th Edition. **2012**,21:311–326.
10. Zoe Xiaozhu Zhang, Weidong Zhang, Ping Liu, et al. Prognostic value of Pneumonia Severity Index, CURB–65, CRB–65, and procalcitonin in community–acquired pneumonia in Singapore. Proceedings of Singapore Healthcare **2015**:1–4.
11. Lim WS, van der Eerden MM, Laing R, et al. Defining community–acquired pneumonia severity on presentation to hospital: an international derivation and validation study. Thorax **2003**;58:377–382.

12. Aujesky D, Auble TE, Yealy DM, et al. prospective comparison of three validated prediction rules for prognosis in community-acquired pneumonia. *Am J Med* **2005**;118:384–392.
13. Colice GL, Morley MA, Asche C, Birnbaum HG. Treatment costs of community-acquired pneumonia in an employed population. *Chest* **2004**;125:2140–2145.
14. Marti C, Garin N, Groscurin O, et al. Prediction of severe community-acquired pneumonia: a systematic review and meta-analysis. *Crit Care* **2012**;16:R141.
15. Charles PG, Wolfe R, Whitby M, et al. Australian Community-Acquired Pneumonia Study collaboration. SMART-COP: a tool for predicting the need for intensive respiratory or vasopressor support in community-acquired pneumonia. *Clin Infect Dis* **2008**;47:375–384.
16. Chalmers JD, Mandal P, Singanayagam A, et al. Severity assessment tools to guide ICU admission in community-acquired pneumonia: systematic review and meta-analysis. *Intensive Care Med* **2011**;37:1409–1420.
17. Brown SM, Jones BE, Jephson AR, Dean NC; Infectious Disease Society of America/American Thoracic Society 2007. Validation of the Infectious Disease Society of America/American Thoracic Society 2007 guidelines for severe community-acquired pneumonia. *Crit Care Med* **2009**;37:3010–3016.
18. Halm EA et al. *JAMA* **1998** ;279(18) :1452–7
19. Mandell LA, Wunderink RG, Anzueto A, et al. Infectious Diseases Society of America/American Thoracic Society consensus guidelines on the management of community-acquired pneumonia in adults. *Clin Infect Dis*. **2007**;44(Suppl 2):27–72.

20. Guo Q, Li YM, Nong LB, et al. Evaluation of compliance with bundle treatment in the management of severe infection. *Zhongguo Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue*. **2009**;21:8–12.
21. Lim HF, Phua J, Mukhopadhyay A, et al. IDSA/ATS minor criteria aid pre-intensive care unit resuscitation in severe community-acquired pneumonia. *Eur Respir J*. **2014**;43:852–862.
22. Guo Q, Li HY, Zhou YP, et al. Weight of the IDSA/ATS minor criteria for severe community-acquired pneumonia. *Respir Med*. **2011**;105:1543–1549.
23. Li HY, Guo Q, Song WD, et al. Modified IDSA/ATS Minor Criteria for severe Community-Acquired Pneumonia Best Predicted Mortality. *Medicine*. **2015**;94 :e1474.
24. Roso'n B, Carratala` J, Ferna'ndez-Sabe´ N, et al. Causes and factors associated with early failure in hospitalized patients with community-acquired pneumonia. *Arch Intern Med*. **2004**;164:502–508.
25. Sibila O, Mortensen EM, Redrow G, et al. Evaluation of the IDSA/ATS minor criteria for severe community-acquired pneumonia. *Hosp Pract (1995)*.**2012**;40:158–164.
26. Phua J, See KC, Chan YH, et al. Validation and clinical implication of the IDSA/ATS minor criteria for severe community-acquired pneumonia. *Thorax*.**2009**;64:598–603.

27. Loke YK, Kwok CS, Niruban A, et al. Value of severity scales in predicting mortality from community-acquired pneumonia systematic review and meta-analysis. *Thorax*.**2010**;65:884–890.
28. Salih W, Schembri S, Chalmers JD. Simplification of the IDSA/ATS minor criteria for severe community-acquired pneumonia using meta-analysis and observational data. *Eur Respir J*. **2014**;43:842–851.
29. Kelly E, MacRedmond RE, Cullen G, et al. Community-acquired pneumonia in older patients does age influence systemic cytokine levels in community-acquired pneumonia? *Respirology*. **2009**;14:210–216.
30. Guo Q, Song WD, Li HY, et al. Scored minor criteria for severe community-acquired pneumonia predicted better. *Respiratory Research*. **2019**;20:147.

الملاحق

Annexes

ملحق (1)

استبيان لتقييم دور معايير الجمعيتين الأمريكيتين للأمراض الإنتانية والصدريّة (IDSA/ATS) في تحديد شدة ذات الرئة المكتسبة في المجتمع

- اسم المريض :
- تاريخ القبول :
- العمر :
- الجنس :
- الحالة الذهنية (الوعي) عند القبول :
- الحرارة عند القبول:.....
- ضغط الدم الشرياني عند القبول
- عدد مرات التنفس عند القبول
- مخبريا عند القبول : تعداد كريات الدم البيضاء
- تعداد الصفيحات
- البولة
- PaO₂/FiO₂
- صورة الصدر البسيطة عند القبول
- مدة البقاء في المشفى
- الحالة عند التخريج (تحسن وفاة.....)

ملحق (2)

فيما يلي نموذج الموافقة الأخلاقية التي تم أخذها من المشاركين في الدراسة بعد قراءتها من قبلهم وشرحها جيداً لهم ومن ثم التوقيع عليها خطياً أو أخذ الموافقة الشفهية بحضور أحد الأهل وذلك للذين لا يجيدون القراءة والكتابة.

**استمارة الموافقة المستنيرة على المشاركة في بحث تقييم دور معايير الجمعيتين الأمريكيتين
للأمراض الإنتانية والصدرية (IDSA/ATS) في تحديد شدة ذات الرئة المكتسبة في المجتمع :**
أنا الطيبة ديماء الحلاق ، طالبة الدراسات العليا في أمراض الجهاز التنفسي في كلية الطب البشري
جامعة دمشق

أنفذ هذا البحث الذي يهدف إلى: تقييم دور معايير الجمعيتين الأمريكيتين للأمراض الإنتانية
والصدرية (IDSA/ATS) في تحديد شدة ذات الرئة المكتسبة في المجتمع عند المرضى المقبولين
في مشفى المواساة ومشفى الأسد الجامعي .

أدعوكم للمشاركة في هذا البحث ولكم مطلق الحرية بالقبول أو رفض ذلك .

قبل الموافقة والتوقيع نرجو منكم قراءة مايلي :

سوف يتم الاطلاع على بعض المعلومات من ملفكم الطبي من قبل الأطباء والباحثين المشاركين في
هذه الدراسة وذلك بعلم إدارة المشفى .

لن يتم نشر أي معلومات ذات طابع شخصي .

في حال الموافقة على الدخول في هذه الدراسة سيتم متابعة حالتكم وإجراء بعض التحاليل
والاستقصاءات .

إن عدم الموافقة من قبلكم على الدخول في هذه الدراسة لن يؤثر على تدبير المرض خلال فترة إقامتكم في المشفى وسيتم اعتماد الخطة المتبعة تقليدياً .

لا توجد أي تكاليف مادية إضافية مطلوبة من المشاركين بالبحث حيث أن الاستقصاءات متوفرة في المشفى ، كما لا توجد مكافآت مادية للمشاركين أو ذويهم .

الموافقة على المشاركة:

لقد قرأت هذه المعلومات الوارد أعلاه ، وكانت لدي الفرصة لأطرح الأسئلة وحصلت على إجابات مقنعة لذلك أعلن على الدخول في هذه الدراسة .

اسم المشارك

توقيع المشارك

التاريخ