



علم الدمويات





السنة: الرابعة

القسم: علم الحياة الحيوانية

الاختصاص: الأحياء الدقيقة

علم الدمويات

لطلاب السنة الرابعة - أحياء دقيقة

الدكتور

جرجس ديب

استاذ في كلية العلوم

جامعة دمشق

1429-1430هـ

2008 - 2009م

المدقق اللغوي

الدكتور خليل غريري

حقوق التأليف والطبع والترجمة والنشر لمديرية الكتب والمطبوعات

فهرس المحتويات

الصفحة

الموضوع

19	المقدمة
	الباب الأول
23	مكونات الدم ، المصورة مكوناتها ووظائفها العامة، تكون لدم
23	أولا:مكونات الدم
24	ثانيا: مفهوم الهيماتوكريت
24	ثالثا:لزوجة الدم وكثافته النوعية ومفهوم سرعة التسفيل
25	رابعا:المصورة الدموية
25	1. التركيب الأيوني للمصورة الدموية
26	2. بروتينات المصورة الدموية
26	3. وظائف بروتينات المصورة
29	خامسا:تكون الدم
29	1. أماكن تكون الدم
33	2. دراسة نقي العظم
34	3. تكون خلايا الدم
36	4. العوامل المؤثرة لنمو السلالات الدموية
39	الباب الثاني
39	الكريات الحمراء تكوينها وبنيتها وفيزيولوجيتها العامة
39	الفصل الأول
39	تكون الكريات الحمراء
39	أولا:تكون الكريات الحمراء
43	ثانيا:ضبط تكون الحمراء
44	ثالثا:المتطلبات الغذائية الضرورية لإنتاج الكريات الحمراء
49	الفصل الثاني
49	الخصائص البنيوية والوظيفية للكريات الحمراء
49	أولا:تعداد الكريات الحمراء

49	ثانيا: الخواص الشكلية للكريات الحمراء.
51	ثالثا: الهيموغلوبين
51	1. بنية الهيموغلوبين
53	2. نمط الهيموغلوبين السوي
54	3. وظائف الهيموغلوبين
64	4. هيموغلوبينات (الخضابات) غير الفعالة فيزيولوجيا
65	5. تركيز الهيموغلوبين وطرائق تمييزه
67	6. اصطناع الهيموغلوبين
68	7. تفكيك الهيموغلوبين خارج الأوعية
71	8. تحطم الهيموغلوبين داخل الأوعية
73	رابعا: استقلاب الكريات الحمراء
75	خامسا: الخواص الحلولية للكريات الحمراء.
76	سادسا: عمر الكريات الحمراء
79	الفصل الثالث
79	الأشكال غير السوية للكريات الحمراء
79	أولا: تغيرات قد الكرية
80	ثانيا: تغيرات اللون.
82	ثالثا: تغيرات الشكل
88	رابعا: المتضمنات والأجسام الغريبة
91	خامسا: المناسب الدموية
93	الباب الثالث
93	فقر الدم
93	الفصل الأول
93	أسباب وتصنيف وأعراض فقر الدم
93	أولا: أسباب فقر الدم
95	ثانيا: تصنيف فقر الدم
97	ثالثا: أعراض وعلامات فقر الدم
99	الفصل الثاني
99	فقر الدم بعوز الحديد Iron deficiency anemia و فقر الدم الأرومي الحديدي Siderblastic Anemia

99	أولاً: فقر الدم بعوز الحديد
99	1. أسباب فقر الدم بعوز الحديد
100	2. أعراض فقر الدم بعوز الحديد
100	3. الموجودات المخبرية
102	4. تحري أسباب فقر الدم بعوز الحديد
102	5. العلاج
103	ثانياً: فقر الدم الأرومي الحديدي Siderblastic Anemia
103	1. الأسباب
104	2. الموجودات المخبرية
107	الفصل الثالث فقر الدم كبير (ضخم) الكريات (Macrocytic(Megalocytic) Anemia
107	أولاً: فقر الدم ضخم الأرومات
107	1. تطور الكريات الضخمة
108	2. فقر الدم ضخم الأرومات المسبب بعوز الفيتامين B12
108	3. استقلاب الفيتامين B12
109	4. أسباب عوز الفيتامين B12
111	5. أعراض وعلامات فقر الدم بعوز الفيتامين B12 (فقر الدم الويل)
112	6. الموجودات المخبرية
114	7. التشخيص التفريقي
115	8. العلاج
116	9. فقر الدم بعوز حمض الفوليك
116	10. أسباب عوز حمض الفوليك
117	11. أعراض وعلامات فقر الدم بعوز حمض الفوليك
118	12. تشخيص عوز (نقص) حمض الفوليك
119	13. العلاج
119	ثانياً: فقر الدم كبير الخلايا سوي الأرومات (ذو الأرومات غير العرطلة)
121	الفصل الرابع فقر الدم الانحلالي Hemolytic Anemia

121	أولاً: مؤشرات فقر الدم الانحلالي ودلائله
122	ثانياً: تقصي أسباب فقر الدم الانحلالي (التشخيص التفريقي)
122	1 - التقصي السريري
123	2-الاعتبارات التشخيصية
127	الفصل الخامس
127	فقر الدم الانحلالي المرتبط بشذوذ تشكّل غشاء الكرية الحمراء
127	أولاً: فقر الدم الكروي الخلايا Spherocytic Anemea (تكرور الكريات الوراثي Spherocytosis)
127	1-الأعراض والعلامات
128	2-الفحوصات والموجودات المخبرية
129	3-العلاج
129	ثانياً: مرض الكريات البيضوية Ovalocytosis (Elliptocytosis)
130	ثالثاً: اعتلال الكريات القموية Stomatocytosis
131	الفصل السادس
131	فقر الدم الانحلالي المرتبط بشذوذ أنزيمات الكرية الحمراء
131	أولاً: فقر الدم الانحلالي المرتبط بعوز أنزيمات مسار املدن-مير هوف
131	ثانياً: فقر الدم الانحلالي المرتبط بعوز النيم الغلوكوز-6-فسفات ديهيدروجيناز
131	1. عوز الهكسوكيناز Hexokinase:
131	2. عوز فسفوهكسوزايزوميراز Phosphohexose Isomerase
131	3. عوز الفسفو فركتوكيناز Phosphofructokinase
132	4. عوز الألدولاز Aldolase
132	5. عوز التريبوز فسفات ايزوميراز Triosephosphate
132	6. عوز البيروفات كيناز Pyruvate Kinase:
132	ثانياً: فقر الدم الانحلالي المرتبط بعوز النيم الغلوكوز-6-فسفات ديهيدروجيناز.
132	1. الفيزيولوجيا المرضية
133	2. الأعراض والعلامات السريرية
133	3. التشخيص المخبري
137	الفصل السابع
137	فقر الدم الانحلالي المرتبط باعتلالات الهيموغلوبين
138	أولاً- الاضطرابات الكيفية

138	1- فقر الدم المنجلي Sickle cell anemia
138	أ- الفيزيولوجيا المرضية
139	ب - أعراض فقر الدم المنجلي (متماثل المواقع) وعلاماته
140	ث - الموجودات المخبرية
140	ج- العلاج
140	د- الصفة المنجلية Sickle cell trait (HbSA)
141	2- الهيموغلوبين C
141	3- الداء المنجلي بالهيموغلوبين C (HbSC)
142	4- الهيموغلوبين E (HbE)
142	5- هيموغلوبين كونستانت سبرينغ HbConstant spring
142	6- هيموغلوبين ليبور HbLepore
142	7- الهيموغلوبينات غير المستقرة
143	8- الهيموغلوبينات ذات الألفة العالية للأوكسجين
144	9- الهيموغلوبينات M
144	ثانيا- الاضطرابات الكمية
144	1- التلاسيميا بيتا Beta Thlassemia
144	أ- الفيزيولوجيا المرضية
145	ب- التلاسيميا بيتا الكبرى
145	ب- الأعراض والتظاهرات السريرية.
145	ث- الموجودات المخبرية
146	ج- العلاج
146	ج- التلاسيميا بيتا الصغرى
147	2- التلاسيميا ألفا a- Thalassemia
147	أ- الفيزيولوجيا المرضية
147	ب- تظاهرات المرض
149	ثالثا- الاضطرابات المشتركة
151	الفصل الثامن
151	فقر الدم الانحلالي غير المرتبط بخلل تركيب الكريات الحمر
151	أولا: فقر الدم الانحلالي المناعي
151	1- فقر الدم الانحلالي المناعي الذاتي Autoimmune hemolytic

	anemia
151	أ- فقر الدم الانحلالي المناعي الذاتي بالأضداد الساحنة
152	■ مسببات المرض وتظاهراته
153	■ الموجودات المخبرية
153	■ العلاج
153	ب- الانحلال المناعي الذاتي المسبب بالأضداد الباردة
154	2- فقر الدم الانحلالي المناعي بعدم توافق الزمر الدموية
154	أ- انحلال الدم المناعي أثناء نقل الدم:
155	ب- انحلال الدم عند الوليد
155	■ انحلال الدم عند الوليد بسبب عدم توافق الجملة Rh.
159	■ انحلال الدم عند الوليد بسبب عدم توافق الجملة ABO.
160	ثانياً: فقر الدم الانحلالي الميكانيكي
160	1. الانحشاشات الخارجية
160	2. الانحلال المرتبط بمسببات قلبية
161	3. الاعتلالات الوعائية الدقيقة
161	■ شذوذ جدران الأوعية المرافق لعدد من الاضطرابات
161	■ فرطية نقص الصفائح الخثرية والمتلازمة الانحلالية اليرومية
162	■ التخثر المنتشر داخل الأوعية
163	الفصل التاسع
163	فقر الدم العرضي (الثانوي)
163	1- فقر الدم المرافق للقصور الكلوي
164	2- فقر الدم المرافق للأكلعاج
164	3- فقر الدم المرافق لأمراض الغراء
165	4- فقر الدم المرافق للخبثاء
165	5- فقر الدم المرافق لقصور الغدد الصم
166	6- فقر الدم المرافق لأمراض الكبد
166	7- فقر الدم المرافق للترووف الحادة
167	الفصل العاشر

	فقر الدم اللاتنسجي (اللاتكويني) A plastic Anemia
167	أولاً- فقر الدم اللاتنسجي الشامل
168	1. فقر الدم اللاتنسجي الغامض
168	2. فقر الدم اللاتنسجي البنيوي:
168	3. فقر الدم اللاتنسجي المكتسب
169	ثانياً- عدم تنسج الحمر الصف
169	1. عدم تنسج الحمر الصف الولادي (نوع بلاكفان - Daimond-Blakfan type) دلموند
170	2. عدم تكون الحمر المكتسب (النوع المزمن الغامض)
171	3. عدم تكون الحمر المكتسب (النوع الحاد والعاير)
173	الفصل الحادي عشر تليف النقي وتصلبه و كثرة الحمر (احمرار الدم) Mylofibrosis. Mylosclerosis and Polycytemia
173	أولاً: تليف النقي وتصلبه Mylofibrosis and Mylosclerosis
173	1. الفيزيولوجيا المرضية
174	2. الأعراض السريرية
174	3. الموجودات المخبرية
175	4. العلاج
175	ثانياً: كثرة الحمر (احمرار الدم) Polycytemia
176	1. كثرة الحمر الحقيقية Polycytemia Vera
176	أ- الأعراض والتظاهرات السريرية
176	ب- الموجودات المخبرية
177	ث- العلاج
177	2. كثرة الحمر الثانوية
178	3. كثرة الحمر النسبية
179	الباب الرابع الكريات البيض
179	الفصل الأول الخصائص العامة للكريات البيض
179	أولاً: خصائص الكريات البيض
182	ثانياً: أنماط الكريات البيض
182	ثالثاً: تعداد الكريات البيض

183	الفصل الثاني
183	تطور الكريات البيض وخصائصها البنيوية والوظيفية
183	أولاً: تكون الكريات البيض
183	1. تطور المحييات
186	2. العدلات الناضجة Neutrophils
192	أ- الموصفات الشكلية والكيميائية الحيوية:
187	ب- حركية ووظائف العدلات
188	ت- الدلالات المرضية لتغير نسبة العدلات
188	3. الحمضات Eosinophils
188	أ- الموصفات الشكلية والكيميائية الحيوية:
189	ب- حركية الحمضات ووظائفها
190	ت- الدلالات المرضية لتغير نسبة الحمضات
191	4. الأسبست Basophils
191	أ- الموصفات الشكلية والكيميائية الحيوية:
192	ب- حركية الحمضات ووظائفها
192	ت- الدلالات المرضية لتغير نسبة الحمضات
193	ثانياً-تطور الوحيدات
193	1. أرومة الوحيدة
193	2. سليفة الوحيدة Promonocyte
194	3. الوحيدة Monocyte:
194	أ- الصفات الشكلية والكيميائية الحيوية
195	ب- حركية الوحيدات ووظائفها
195	ت- الدلالات المرضية لتغير نسبة الوحيدات
196	ثالثاً-تطور اللمفاويات
196	1. الأرومة اللمفاوية Lymphoblast:
197	2. سليفة اللمفاوية Prolymphocyte
197	3. اللمفاوية الناضجة Mature Lymphocyte
198	أ- اللمفاوية الكبيرة Large Lymphocyte
198	ب- اللمفاوية الصغيرة Small Lymphocyte:
198	ت- حركية اللمفاويات ووظائفها

200	ث- الدلالات المرضية لتغير نسبة اللمفاويات
	الفصل الثالث
201	الأشكال غير السوية للكريات البيض الناضجة
201	1. الحبيبات السامةToxic granules
201	2. أجسام دولDöhle bodies:
202	3. فرط التفصيصHyper segmentation :
202	4. اضطرابPelger Huët:
203	5. متلازمةChédiak-Higashi:
204	6. مشتملاتAlder-reilly
205	7. اللمفاويات ذات النواتينBinucleated lymphocytes
205	8. اللمفاويات ذات الفجواتVacuolated lymphocytes
205	9. Smudge celles
206	10. أجسام أورAuer rods
207	الباب الخامس
207	اعتلالات الكريات البيض
207	الفصل الأول
207	الاعتلالات الكيفية في الكريات البيض
207	أولاً: اضطرابات الحركة والانجذاب الكيميائي
207	ثانياً: اضطرابات القتل
207	1. الورم الحبيبي المزمن
208	2. عوز انزيم الميلوبروكسيداز
208	3. الاعتلالات الوظيفية الأخرى في العدلات
208	4. اعتلال الوحيدات- البلاعم
209	أ- اعتلالGauche
210	ب- اعتلالNiemann-Pick
211	الفصل الثاني
211	الاعتلالات الكمية في الكريات البيض (أمراض الكريات البيض غير الحبيبية)

211	أولاً: التغيرات الكمية في تعداد الكريات البيض
212	ثانياً: أمراض الكريات البيض غير الحبيبية
212	1- نادرة الميغابلازمت Agranulocytosis وقلة العدلات Neutropenia.
213	2- كثرة الوحيدات اللمعية Infactios Mononucleonis
	الفصل الثالث
217	الاعتلالات الكمية في الكريات البيض أمراض الكريات البيض الحبيبية) ابيضاضات الدم (Leukemias)
217	أولاً: أسباب ابيضاض الدم
219	ثانياً: الابيضاضات الحادة
219	ثالثاً: الأعراض السريرية
220	رابعاً: اختبارات التشخيص التفريقي لابييضاضات الدم الحادة
220	1. الدراسات الشكلية للخلايا
220	2. الدراسات الكيميائية الخلوية
222	3. الدراسة المناعية
223	4. الاختبارات الكيميائية الحيوية
223	5. دراسة النمط الصبغي
225	خامساً: التصنيف الفرنسي الأمريكي البريطاني (FAB) للابيضاضات الحادة
225	1. تصنيف الابيضاضات اللمفاوية الحادة
227	2. تصنيف الابيضاضات النقوية (غير اللمفاوية) الحادة
233	سادساً: ابيضاض الدم المزمن Chronic leukemia
234	1. الابيضاض اللمفاوي المزمن Chronic lymphocytic leukemia
237	2. ابيضاض الدم بالخلايا الشعرية
239	3. ابيضاض المزمن بالوحيدات Chronic monocytic leukemia
239	4. الابيضاض النقوي المزمن Chronic Myelogenous Leukemia
	الفصل الرابع
245	أمراض الخلايا المصورة
245	أولاً: التقيوم المتعدد Multiple myeloma

245	1-الأعراض والتظاهرات السريرية
247	2-الموجودات المخبرية
250	ثانيا: فرط الغلوبولينات الكبري البدئي Primary Macroglobulinemia
253	الباب السادس الجهاز اللمفي والأورام اللمفاوية
253	الفصل الأول الجهاز اللمفاوي
253	أولا: معطيات تشريحية
254	ثانيا: اللمف
256	ثالثا: النسيج اللمفاوية
256	1-العقيدات البلغمية
257	2-العقد اللمفاوية
259	رابعا: تشكّل اللمف
261	الفصل الثاني الأورام اللمفاوية
261	أولا: لمفوما هودجكين Hodgkin Lymphoma
261	1. الأعراض السريرية
262	2. الموجودات المخبرية
264	ثانيا: لمفومات لا هودجكين non Hodgkin lymphomas
264	1. الأعراض السريرية
265	2. الموجودات المخبرية
267	الباب السابع الصفائح الدموية وتخثر الدم
267	الفصل الأول تطور وبنية ووظائف الصفائح
267	أولا: تطور الصفائح
270	ثانيا: بنية الصفائح
272	ثالثا: استقلاب الصفائح

275	الفصل الثاني الإرقاء وتخثر الدم
275	أولا: التخثر الأولي
276	ثانيا: عوامل التخثر والتخثر الثانوي
276	1-عوامل التخثر
279	2-آلية التخثر
285	ثالثا: مضادات التخثر
289	الباب الثامن أمراض الأرقاء Disorders of Hemostasis
	الفصل الأول
291	الأمراض اليرقية المسببة باعتلال الأوعية الدموية
291	أولا: الفرورية المرتبطة باعتلالات النسيج الضامة الوراثية
291	1. توسع الشعريات الوراثي Hereditary telangiectasia:
291	2. متلازمة اهلر - دانلوس Ehler-Danlos Syndrome:
291	ثانيا: الفرورية المرتبطة بإصابة الخلايا البطانية
292	ثالثا: الفرورية المرتبطة بانخفاض القوة الميكانيكية للأوعية الشعرية
292	رابعا: الفرورية الكهلية (الشيخية) Senile Purpura
293	خامسا: الفرورية المرتبطة بتمزق الوريدات الصغيرة
	الفصل الثاني
295	الأمراض اليرقية الناجمة عن اعتلالات الصفائح
295	أولا: الشذوذات الشكلية
295	ثانيا: شذوذات الصفائح الكمية
295	1 - قلة الصفائح thrombocytopenia
299	2- كثرة الصفائح thrombocytosis
300	ثالثا: شذوذات الصفائح الكيفية
300	1 - خلل وظائف الصفائح المكتسب
301	2- خلل وظائف الصفائح المرض بالدواء
301	3- خلل وظائف الصفائح الوراثي
305	الفصل الثالث

	الأمراض الوراثية المرتبطة باعتلال عوامل تخثر الدم
305	أولاً- الأمراض الوراثية المرتبطة بخلل اصطناع عوامل التخثر
305	1-الأمراض المكتسبة
305	أ- عوز الفيتامين K
306	ب - أمراض الكبد الوخيمة
306	2- الأمراض الوراثية
306	أ -الناعور Hemophilia
309	ب- داء فون ويلبراند (vWD) von Willebrand,s disease
312	ج-اضطرابات وراثية أخرى
313	ثانياً : الاضطرابات الوراثية ذات العلاقة بتخثر و/أو استهلاك عوامل التخثر
314	1- انحلال الليفين الأولي
314	2- انحلال الليفين الثانوي
317	الباب التاسع نقل الدم
319	الفصل لأول الزمر الدموية ونقل الدم ومشتقاته
319	أولاً: الزمر الدموية
319	1. مجموعة A.B.O
321	2. المجموعة Rh
321	ثانياً:تحديد الزمر الدموية
323	ثالثاً: نقل الدم والمشتقات الدموية
323	1. التبرع بالدم
324	2. حفظ الدم
324	3. نقل كامل الدم
325	4. نقل الكريات الحمر المحفوظة
325	5. نقل الصفائح
326	6. نقل ركائز اخييات
326	7. نقل المصورة الطازجة والمصورة الطازجة المجمدة
327	8. نقل بروتينات المصورة والألبومين الحفف

327	9. نقل الرسابة القلبية
327	10. نقل ركائز عوامل التخثر
329	الفصل الثاني مضاعفات نقل الدم
329	1- التفاعلات الانحلالية Hemolytic Reaction
330	2- التفاعلات التحسسية (الأرجية) Allergic Reaction
331	3- نقص الصفائح النالي لنقل الدم
331	4- التفاعلات الحرورية Febrile Reaction
331	5- التفاعلات الدورانية Circulatory Reaction
332	6- الصمة الموائية
332	7- التهاب الوريد الخثاري
332	8- مضاعفات نقل لدم الجسم
333	9- تراكم الحديد في الجسم
333	10- نقل الأمراض
335	المصطلحات العلمية
359	المراجع العربية
361	المراجع الأجنبية

المقدمة

يعد علم الدمويات أحد فروع المعرفة الطبية (وبشكل أكثر تحديدا الأمراض الباطنية) والذي يهتم بدراسة أمراض الدم من حيث السببية والأمراض والأعراض السريرية، إلى جانب طرائق التشخيص والوقاية والعلاج .

ولقد آثرت بعد عدة سنوات من الجمع والإعداد كما ،ومن خلال ممارستي التدريس منهجاً، أن أضع بين يدي طلابي الأعزاء هذا المؤلف الذي يهدف إلى تزويدهم بمعلومات شاملة في مختلف موضوعات علم الدمويات وبأسلوب يجمع بين التبسيط وعمق المحتوى ، والتأكيد على المبادئ العامة .

ولقد عمدت إلى تضمين الكتاب المعلومات الضرورية فيما يتعلق بالخصائص البنيوية والوظيفية السوية لمختلف مكونات الدم، وبالقدر الذي يمكن الطالب من استيعاب مختلف النواحي المرضية، و اكتساب المعرفة الضرورية في المجال المهني والتعليمي.

يتضمن الكتاب مختلف مفردات مقرر علم الدمويات، الموزعة في تسعة أبواب. خصص الباب الأول للتعريف بالدم ومكوناته وتكوينه ، إضافة للتعرف بالمصورة الدموية من الناحيتين البنيوية والوظيفية .

أما الباب الثاني فقد حرصت أن أبدأه بعرض الصفات العامة للكريات الحمر من الناحيتين البنيوية والوظيفية ، ضمن تبويب فصلي، أفرد أولها للتعريف بتطور الكريات الحمر ومتطلبات تكوينها ، ثم خصص الفصل التالي لدراسة بنية الكريات ووظيفتها، ابتداء من بنية الهيموغلوبين وتكوينه ووظائفه، وانتهاء بالعمليات الاستقلابية ضمن الكريات . ومن ثم أهتم بموضوعات هذا الباب باستعراض مختلف الأشكال الشاذة للكريات الحمر ومدلولاتها التشخيصية.

وكرس الباب الثالث لعرض مختلف أنماط فقر الدم، ضمن إحدى عشر فصلاً، خصص أولها لدراسة أسباب فقر الدم وتصنيفه، ثم خصص فصلاً لتوصيف فقر الدم

بعوز الحديد وفقر الدم ضخيم الكريات تباعا. أما فقر الدم الانحلالي فقد عرض ضمن خمسة فصول، كرس أولها لدراسة دلائل فقر الدم الانحلالي ومؤشراته ، فيما خصصت الفصول الأربعة لدراسة مختلف أنماط فقر الدم الانحلالي، ابتداء من تلك المرتبطة بخلل بنية الغشاء، مروراً بفقر الدم المسبب بعوز الأنزيمات وانحلال الدم في مختلف اعتلالات الهيموغلوبين، وانتهاءً بانحلال الدم غير المرتبط بخلل تركيب الكرية. ويهدف اكتمال الصورة خصصت الفصول الثلاثة الأخيرة لدراسة فقر الدم الثانوي، وفقر الدم اللاتنسجي، وتليف النقي وتصلبه تباعا.

أما الباب الرابع فقد كرس لدراسة الخصائص البنيوية والوظيفية للكريات البيض ضمن ثلاثة فصول ، أفرد أوله لدراسة الخصائص العامة للكريات البيض ، فيما خصص الفصل الثاني لدراسة تطور مختلف أنماط الكريات البيض ووظائفها ، أما الفصل الثالث فقد توقفنا فيه عند مختلف الأشكال الشاذة للكريات البيض.

وأفرد الباب الخامس لدراسة اعتلالات الكريات البيض في أربعة فصول خصص الأول لدراسة الأمراض الكيفية التي لا تتوافق بتغير تعداد الكريات البيض ، وخصص الثاني لدراسة الاعتلالات الكمية غير الخبيثة ، فيما عرضت الأمراض الكمية الخبيثة (الايضاضات) في الفصل الثالث ، وخصص الفصل الرابع لأمراض الخلايا المصورية (النقيوم المتعدد).

أما الباب السادس، فقد كرسه لدراسة الجهاز اللمفاوي والأمراض اللمفاوية ضمن فصلين يعرف أولهما ببنية الجهاز اللمفاوي ووظيفته، ويعرض الثاني أهم أمراض هذا الجهاز.

ولقد خصص الباب السابع لدراسة الصفيحات وتخرثر الدم في فصلين ، تناول الأول تطور الصفيحات وبنيتها ووظائفها ، فيما أفرد الثاني لدراسة مختلف جوانب عملية تخرثر الدم.

أما الباب الثامن، فقد كرس لدراسة مختلف أمراض واعتلالات عملية الأرقاء والتي عرضت في ثلاثة فصول متتالية، تناولت الأمراض الترفية المسببة باعتلال الأوعية الدموية، وتلك المرتبطة باعتلال الصفيح الدموية إضافة إلى الاضطرابات الترفية المرتبطة باعتلال عوامل تخثر الدم على التوالي .

و توقفت في الباب التاسع عند موضوع نقل الدم ضمن فصلين، يعرف الأول بالزمر الدموية ومشتقات الدم ومستطبات استخدامها، فيما يعرض الفصل الثاني مضاعفات نقل الدم .

ولكي يسهل على الطالب استيعاب مختلف مفردات المقرر وفهمها ، فقد حرصت على تضمين مختلف فصوله بالمخططات والرسوم التوضيحية المناسبة، مع الحرص على عدم الإفراط في حملتها .

وبتقديم هذا المؤلف ، آمل أن أكون قد وفقت في اختيار موضوعاته وطريقة عرضها بما يلي طموح طلابنا الأعزاء في تحصيل المعرفة والارتقاء بها.

المؤلف

الباب الأول

مكونات الدم ، المصورة مكوناتها ووظائفها العامة، تكون الدم

أولاً: مكونات الدم

الدم عبارة عن سائل أحمر غير شفاف، يتألف من بلازما (مصورة) صفراء شاحبة ومن عناصر شكلية معلقة بها، هي الكريات الحمر والكريات البيض والصفائح الدموية (الشكل 1-1).

يشكل الدم عند الإنسان البالغ ما نسبته 7 ٪ وسطياً من كتلة الجسم، أي ما يقارب 5 أطنان لدى شخص يزن 70 كغ. ويؤدي الدم عدداً من الوظائف المهمة (تنفسية، وناقلة، ودفاعية، ومغذية، وموقية... الخ)، تسهم بشكل مباشر في المحافظة على استقرار الوسط الداخلي الذي يعد شرطاً أساسياً من شروط الحياة واستمرارها.

Plasma 55%		Cellular elements 45%		
Constituent	Major functions	Cell type	Number per μL (mm^3) of blood	Functions
Water	Solvent for carrying other substances	Erythrocytes (red blood cells)	5-6 million	Transport oxygen and help transport carbon dioxide
Ions (blood electrolytes) Sodium Potassium Calcium Magnesium Chloride Bicarbonate	Osmotic balance, pH buffering, and regulation of membrane permeability	Leukocytes (white blood cells)	5,000-10,000	Defense and immunity
Plasma proteins Albumin Fibrinogen Immunoglobulins (antibodies)	Osmotic balance, pH buffering Clotting Defense	Basophil Lymphocyte Eosinophil Neutrophil Monocyte		
Substances transported by blood Nutrients (such as glucose, fatty acids, vitamins) Waste products of metabolism Respiratory gases (O_2 and CO_2) Hormones		Platelets	250,000-400,000	Blood clotting

الشكل 1-1: مكونات الدم

ثانيا: مفهوم الهيماتوكريت

يدعى الحجم الكلي للكريات الحمر في حجم معين من الدم بالكسر الحجمي للكريات أو الهيماتوكريت Hematocrit، ويعرف أيضا بحجم الكريات المكثسة ، وهو في الواقع قياس نسبة الكريات الحمر إلى المصورة بعد إهمال الحجم القليل الذي تشغله الكريات البيض والصفائح الدموية. وتتراوح القيمة السوية للهيماتوكريت بين 40% إلى 50% لدى الرجال وبين 37% و 43% لدى الإناث. ويحسب الهيماتوكريت عن طريق تنبيذ عينة الدم في أنبوب شعري يحتوي على مضاد تخثر وقراءة عمود الدم المترسب في أسفل الأنبوب. وتحدد الإشارة إلى أن القيمة المقاسة تشكل 96% من القيمة الفعلية للهيماتوكريت، الأمر المرتبط باحتجاز نحو 3-8% من المصورة فيما بين الكريات المتكدسة. أضيف إلى ذلك تختلف قيمة الهيماتوكريت في الدم المحيطي عنها في الدم المركزي، وكذلك في الدم الشرياني والدم الوريدي . ولحساب هيماتوكريت الجسم يجري ضرب قيمته المقاسة في عينة دم مأخوذة من الشريان الكعبري بثابت مقداره 0.91. وتنخفض قيمة الهيماتوكريت في مختلف فاقات فقر الدم، فيما تزداد هذه القيمة في مختلف حالات فقدان السوائل من الجسم (مثل الحروق الشديدة، والتجفاف، والإسهال)، وبعض الحالات النادرة مثل كثرة الحمر (احمرار الدم)، إضافة إلى السكن في المناطق المرتفعة، والأطفال حديثي الولادة.

ثالثا: لزوجة الدم وكثافته النوعية ومفهوم سرعة التسفيل

ترتبط لزوجة الدم بوجود البروتينات والكريات الدموية، وبفرض أن لزوجة الماء تساوي الواحد، فإن لزوجة الدم تتراوح بين 3.5 و 5.4، فيما تتراوح الكثافة النوعية للدم بين 1.050 و 1.060. ونظرا لكون الكثافة النوعية للكريات الحمر (1.096) أعلى من الكثافة النوعية للمصورة (1.030)، فإن الكريات الحمر لدم موجود في أنبوب يحوي مضاد تخثر سوف تترسب في قعر الأنبوب تاركة فوقها طبقة من المصورة. وتعرف هذه الخاصية بسرعة التسفيل (الترسب)، ويعبر عنها بعدد المليمترات التي تقطعها

الكريات في الساعة. وتتراوح قيم السواء بين 3 و10 ملم/سا في الساعة الأولى لدى الرجال، ولدى النساء بين 8 و14 ملم/سا. وتزداد سرعة التسفل لدى انخفاض التركيز العددي للكريات الحمر فيما تنخفض في الحال المعاكسة وعموما تكون القيمة التشخيصية لسرعة التسفل قليلة الأهمية لدى الأشخاص الذين تنخفض عندهم قيمة الهيماتوكريت عن 30 ٪، وكذلك الأمر لدى الأشخاص المصابين بالتحفاف. وتزداد سرعة التسفل في جميع الأمراض التي تسبب تبديلا في بروتينات المصورة، وبخاصة ارتفاع الغلوبولينات المناعية ومولد الليفين، كما هو في الأحمال المزمنة والسلس، وداء المثقبيات، والأمراض الخبيثة.

رابعا: المصورة الدموية

تشكل المصورة الدموية وسطيا ما نسبته 55 ٪ من حجم الدم، وتتألف من نحو 90-92 ٪ من الماء ونحو 8-10 ٪ من المواد العضوية وغير العضوية التي تعود بشكل أساسي إلى البروتينات والأيونات كأهم المكونات المحددة لخواص المصورة ووظائفها المختلفة.

1- التركيب الأيوني للمصورة الدموية

يمثل التركيب الأيوني للمصورة الدموية التركيب الأيوني لبقية السوائل خارج الخلوية من حيث تواجد أيونات الصوديوم والكلور والبيكربونات بتركيز مرتفعة. وتعد هذه الأيونات وبخاصة أيونات الصوديوم مسؤولة عن الضغط الحلوي للمصورة كأحد أهم مؤشرات استقرار الوسط الداخلي للجسم (الشكل 1-1). فانزياح هذا المؤشر عن القيمة السوية التي تبلغ نحو 5400 ملم زئبق سوف يؤدي إلى إعادة توزيع الماء بين المصورة وسوائل البدن الأخرى. وتعرف المحاليل التي يكون ضغطها الحلوي مساويا للضغط الحلوي للمصورة بالمحاليل أسوية التوتر، وهي لا تسبب عادة إي خلل في التوازن الحلوي بين السوائل الخلوية والسوائل خارج الخلوية. وينتمي إلى هذه المحاليل محلول كلور الصوديوم بتركيز 0.9 ٪ وكذلك محلول الغلوكوز بتركيز 5 ٪ والتي تستخدم للحفاظ على التوازن الحلوي في النسج والخلايا المعزولة دون أن تصاب بظاهرة

الانكماش أو الانتباج. أما المحاليل التي يفوق ضغطها الحلوي الضغط الحلوي للمصورة فتعرف بالمحاليل مفرطة التوتر، وتسبب عادة انكماش الخلايا ، فيما تعرف المحاليل التي يقل ضغطها الحلوي عن الضغط الحلوي للمصورة بالمحاليل ناقصة التوتر وتسبب عادة انتباج الخلايا.

2-بروتينات المصورة الدموية

تشكل البروتينات ما نسبته 6.5-8% من حجم المصورة ، والتي تعود إليها لزوجتها المرتفعة (1.7-2.2) . وباستخدام طريقة الرحلان الكهربائي تم عزل البروتينات المصورة التالية:

أ- الألبومينات: تشكل هذه البروتينات نحو 60% من مجمل بروتينات المصورة التي يبلغ تركيزها نحو 4.5 غ / 100 مل . ونظرا لتركيزها الكبير ووزنها الجزيئي القليل (69000 دالتون) فإنها تعد مسؤولة عما نسبته 75% من الضغط الجرمي للمصورة . وتتصف هذه البروتينات بكبر مساحة سطحها، الأمر الذي يؤهلها لنقل عدد كبير من المواد في المصورة مثل البيليروبين والحموض الدسمة وأملاح الحموض الصفراوية وأيونات الكالسيوم، وبعض المواد خارجية المنشأ مثل البنسلين. ويؤدي انخفاض تركيزها في المصورة إلى ظهور الوزمات نتيجة تسرب الماء إلى السوائل الخلالية.

ب- الغلوبولينات: يتم اصطناع هذه البروتينات التي يبلغ تركيزها نحو 2.5 غ / 100 مل ، في الكبد وخلايا الحمل الشبكية البطانية والكريات البيض اللمفاوية. وتتضمن الغلوبولينات عدة زمر من البروتينات تم فصلها بطريقة الرحلان الكهربائي وهي

- الغلوبولينات α_1 : وتعرف بالبروتينات السكرية (الجليكوبروتينات) نظرا لارتباط معظمها بالسكريات، وخاصة الهكسوز والهكسوز أمين، حيث ينقل نحو ثلثي غلوكوز المصورة مرتبطا بهذه البروتينات. وينتمي إلى هذه المجموعة البروتينات المخاطية، وكذلك مضاد الترسين- α_1 ، الذي يسبب غيبابه الولادي النفاخ الرئوي.

- الغلوبولينات α_2 : وينتمي إليها الهبتوغلوبين الذي يربط الهيموغلوبين ويمنع طرحه في البول وكذلك البروتينات الرابطة للنحاس والبروتينات الرابطة للتيروكسين ، إضافة للبروتينات الرابطة للفيامين B12.

- الغلوبولينات β : وينتمي إليها النواقل البروتينية للمواد الدسمة، والتي تعرف بصمائم البروتين الشحمي. ولقد تم تمييز عدة أنواع منها أشير إليها بالرموز A,B,C,D,E والتي تمتلك وظائف عدة يأتي على رأسها التعرف على مختلف خلايا الجسم، وعلى البروتينات الشحمية والتقاطها والاستفادة من مكوناتها من خلال هذه البروتينات . وينتمي إلى هذه البروتينات بعض الغلوبولينات الحاوية على المعادن مثل الترانسفيرين الذي ينقل الحديد في المصورة.


- الغلوبولينات γ : وينتمي إليها معظم الأجسام الدفاعية في الجسم (الأضداد) وتعرف بالغلوبولينات المناعية. وتشكل هذه الغلوبولينات ما نسبته 20٪ تقريبا من مجمل بروتينات المصورة . ولقد أمكن تمييز عدة صفوف من الغلوبولينات المناعية أشير إليها بالرموز IgA,IgG,IgM,IgE والتي تمتلك وظائف مناعية مختلفة وتوجد في الجسم بنسب متباينة. ويرتفع تركيز هذه الغلوبولينات بشكل عام في مختلف الحالات الالتهابية والحمجية.

ث- مولد الليفين: يصطنع هذا البروتين في الكبد، ويشترك في عملية التخثر الثانوي بتحويله إلى ليفين غير منحل كما أسلفنا في بحث نخثر الدم.

3-وظائف بروتينات المصورة

تؤدي بروتينات المصورة العديد من الوظائف المهمة، يمكن إيجازها بما يلي:
الوظيفة المغذية: يعد محتوى المصورة من البروتينات، والذي يقارب 200 غ، بمثابة احتياطي غذائي يمكن لخلايا الجسم الاستفادة منه عند الضرورة. وبخاصة في حالة عوز البروتينات الغذائية الشديد. ويتم ذلك بعد التقاط هذه البروتينات


ويصبح نقي العظم بدءاً من الشهر السابع للحياة الرحمية حتى الولادة وبعدها العضو الوحيد المسؤول عن تكون الدم. ويملاً نقي العظم الأحمر جميع تجاويف العظام في مرحلة الطفولة ، إلا أنه يبدأ بالتراجع تدريجياً وبخاصة في العظام الطويلة، باتجاه المشاشتين حيث يستبدل بنقي أصفر دهني (الشكل 3-1). أما تجاويف العظام المسطحة مثل القحف والعظام الحرقفية والقص والأضلاع والكتفين إضافة للفقرات فتبقى مشغولة بالنقي الأحمر خلال مراحل الحياة.




الشكل 1-3: نقي العظم الأحمر لدى الأطفال (A) ولدى البالغين (B)

يحتل نقي العظم القناة المركزية للعظام الطويلة والفراغات بين الحجب العظمية في العظام الأسفنجية. ويتكون النقي من خلايا شبكية أولية وألياف شبكية وطلائع الخلايا الدموية بأطوارها المختلفة ، إضافة إلى الخلايا الدهنية والأوعية الدموية والألياف العصبية. وتشكل طلائع الكريات الحمر نحو 25٪ من خلايا النقي الأحمر ، فيما تشكل طلائع الكريات البيض نحو 75٪ منه (الشكل 4-1). وقد يستعيد الكبد والطحال خواصهما الجنينية ويستأنفان وظيفتهما المكونة للدم في بعض الحالات المرضية

مثل التزوف الشديدة أو انحلال الدم ، الأمر الذي يعرف بتكون الحؤول النقوي.



الشكل 4-1: منظر لنقي سوي $100\times$



الشكل 4-1: منظر لنقي سوي $1000\times$

2-دراسة نقي العظم


تعد دراسة النقي المتمثلة بفحص المحتويات الخلوية ليزالة النقي أو لحزعة النقي من الناحيتين الكمية والكيفية، من أهم الاختبارات التشخيصية لعدد من أمراض الدم (مثل فقر الدم العرطل ، وفقر الدم اللاتنسجي ، وفاقات الدم الانحلالية، وبيضاضات الدم وورم النقي المتعدد، وداء هودجكن، والانتقالات الورمية)، وتقدير الاستجابة للعلاج. وتؤخذ بيزالة النقي من عظم القص (لدى الكهول) أو القزعة الحرقفية (لدى الأطفال)، أو التواءات الشوكية أو حلبة الطنوب (لدى الرضع) بوساطة إبرة خاصة واسعة القطر تحتوي ثقب متعددة (إبرة صلاح Salah ، أو إبرة كليما Klima، أو إبرة جامشيدي Jamshidi). وتجرى عملية البزل بعد تعقيم المنطقة المحادة وتخديرها موضعيا بدفع الإبرة إلى داخل النقي، وأخذ عينة منه بوساطة محقنة زجاجية أو بلاستيكية. توضع مكان القضيبي المعدني من إبرة البزل. وتوزع كمية من البيزالة على عدة صفائح زجاجية نظيفة، وتفرش بسرعة بالطريقة نفسها المستخدمة في تحضير اللطاخات الدموية. ثم تترك حتى تجف وتثبت بالميتانول أو الكحول المطلق ومن ثم تلون بالملون المناسب ثمهيدا لدراستها. ويقدم فحص اللطاخة معلومات عن خلوية النقي (طبيعية ناقصة أم زائدة) وفعالية تصنيع كل من السلالة الحمراء والسلالة البيضاء، إضافة إلى نسبة خلايا السلالة البيضاء إلى خلايا السلالة الحمراء M/E. كما يجري التأكد من عدد النواءات وأشكالها، إضافة لوجود خلايا غريبة مثل خلايا Reed Sternberg التي تشاهد في داء هودجكن أو خلايا سرطانية. و تستخدم اللطاخة لدى تلويئها بمعلومات خاصة (ملون Perls) من أجل تقدير الحديد داخل أرومات السلالة الحمراء.

أما خزعة النقي فيلجأ إليها عندما تفشل بيزالة النقي في تقديم معلومات كافية عن الحالة المرضية، كما هو الحال في تليف النقي وتصلبه وفقر الدم اللاتنسجي، إضافة للبزل

الجافة التي غالبا ماتصادف عند وجود انتقالات سرطانية. وتؤخذ خزعة العظم بإبرة تشبه إبرة البزل ولكنها ذات رأس مسنن وملعة أكبر .

3-تكون خلايا الدم

تتكون خلايا الدم عند الإنسان البالغ في نقي العظم انطلاقا من خلية غير متميزة تعرف بالخلية الجذعية متعددة القدرات Pluripotent Stem cell والتي تشتق منها جميع الخلايا الدموية الجائلة في الدوران. فيؤدي نمو هذه الخلايا وتوالدها إلى تشكيل سلالتين من الخلايا الجذعية متعددة القدرات: الخلايا الجذعية النقوية Myloid stem cells والخلايا الجذعية اللمفاوية Lymphoid Stem cells (الشكل 5-1). ويؤدي نمو الخلايا الجذعية إلى إنتاج مستعمرات من أنماط خلوية معينة تعرف بالخلايا الجذعية الملتزمة Committed stem cells . وهكذا يشتق من الخلايا الجذعية النقوية التجمع الخلوي (الوحدة) المولد للمحبيات والحمير والوحدات وأم الصفائح Colony forming unit-granulocyte-erythrocyte-monocytemegakaryocyte(CFu-GEMM) والتي تعطي بدورها التجمع الخلوي المولد للكريات الحمر Colony Forming unit-Erythrocytes(CFu-E)، و التجمع الخلوي المولد للمحبيات والوحدات(CFu-GM)، والتجمع الخلوي المولد للحامضيات(CFu-Eo)، والتجمع الخلوي المولد للأساسيات(CFu-Bs)، إضافة للتجمع الخلوي المولد لأم الصفائح(CFu-Meg).



الشكل 5-1: مخطط إجمالي لتكوين العناصر الدموية

أما الخلايا الجذعية للمفاوية فيغادر قسم منها إلى التيموس حيث تتمايز إلى خلايا لمفاوية تائية T-cell، فيما يتمايز القسم الآخر في نقي العظم إلى خلايا بائية B-cell. وتتوزع اللمفاويات المتميزة في الأعضاء المكونة للمف (العقد اللمفاوية

والطحال والتوتة واللوزتين ومختلف التشكلات اللمفاوية في المعى والجهاز التنفسي ونقي العظم وأماكن أخرى) ويعبر قسم منها نحو الدم المحيطي.


4-العوامل المحرضة لنمو السلالات الدموية.

يتم التحكم بتوالد السلالات وتمايزها الدموية وكذلك وظائف الكريات الناضجة بواسطة بروتينات تعرف بالعوامل المحرضة للسلالات Colony –stimulating factors(CSFs) . ويعد كل من الأريثروبويتين Erythropoietin ، والعامل المحرض لنمو المحببات والوحيدات (GM-CSF)، والعامل المحرض لنمو الوحيدات(M-CSF) ،والعامل المحرض لنمو المحببات(G-CSF)، والأنترلوكين-3(IL3)، من أكثر هذه العوامل أهمية .

تتوضع المورثة المسؤولة عن إنتاج الأريثروبويتين على الصبغي السابع، ويتم إنتاجه من قبل الخلايا حول النخاع في الكلى وخلايا كوبر في الكبد . ويؤثر هذا العامل في السلالة المولدة للكريات الحمر (CFu-E)، والسلالة المولدة لأم الصفائح (CFu-Meg)، دون أن يكون له تأثير في الكريات الناضجة. أما مورثة الأنترلوكين-3 فتتوضع على الذراع الطويلة من الصبغي الخامس، ويتم إنتاجه من قبل اللمفاويات T المفعلة ويؤثر في التجمعات الخلوية المولدة لعدة سلالات دموية (CFu-B, CFu-

GEMM, CFu-GM, CFu-G, CFu-M, CFu-Eo, CFu-Meg, CFu-Bas)، إضافة لتأثيره في كل من الوحيدات والخامضات الناضجة. وتوجد أيضا مورثة العامل المحرض للوحيدات على الذراع الطويلة للصبغي الخامس، فيما تحمل مورثة العامل المحرض للمحببات على الصبغي السابع عشر. ويتم إنتاج هذين العاملين في كل من الوحيدات والخلايا المصورة للليف fibroblasts والخلايا البطانية. وفيما يحرض العامل المحرض للمحببات تطور السلالة المولدة للمحببات ويؤثر في وظيفة المحببات الناضجة، يعمل العامل المحرض للوحيدات على تطور السلالة المولدة للوحيدات ويؤثر في وظيفة الوحيدات الناضجة. وتوجد مورثة العامل المحرض للمحببات

والوحدات في الذراع الطويلة للصبغي الخامس. ويصطنع هذا العامل في الخلايا المصورة للليف والوحدات والخلايا البطانية، إضافة إلى اللمفاويات T . وهو يحرض نمو السلالات نفسها التي يحرضها الأنترلوكين-3، ويؤثر في وظيفة الحامضيات والوحدات إضافة للمحبيات الناضجة (الشكل 6-1). وإلى جانب العوامل المحرصة تسهم الـ أنترلوكينات الأخرى (IL1-IL7) في حث توالد وتمايز أنماط خلوية معينة إما مباشرة أو من خلال تأثيرها في نمو الخلايا الناضجة وتطورها، وخاصة للمفاويات الناتية (الشكل 6-1) .



الشكل 6-1: ضبط تكون الدم بواسطة العوامل المحرصة للسلالات.

ويتحقق الفعل البيولوجي للعوامل المحرصة من خلال ارتباطها بمستقبلات نوعية على سطح الخلايا الهدفية . ولقد أمكن اصطناع العديد منها بطرائق الهندسة الوراثية حيث يتم استخدامها في تطبيقات علاجية متعددة مثل تحريض إنتاج الكريات الحمر في حالة القصور الكلوي المزمن، وكذلك تحريض إنتاج اللعفاويات والمحبيات عند الأشخاص الذين يتناولون أدوية سامة للخلايا، و في فقر الدم اللاتنسجي .



الباب الثاني


الكريات الحمر تكونها بنيتها وفيزيولوجيتها العامة

الفصل الأول

تكون الكريات الحمر

أولاً: تكون الكريات الحمر

يتم تكون الكريات الحمر في نقي العظم انطلاقاً من السلالة المولدة للحمر (CFu-E) التي تتطور إلى كريات ناضجة على عدة مراحل (الشكل 1-2).



Rubriblast
(pronormoblast)



Pronubricyte
(basophilic normoblast)



Rubricyte
(polychromatic normoblast)



Metarubricyte
(orthochromic normoblast)



Reticulocyte




Mature erythrocyte

الشكل 1-2: مراحل تطور الكريات الحمر

فتتحول الخلية المولدة للحمر إلى سليفة الأرومة الحمراء ومن ثم إلى أرومة سوية وكرية ناضجة، يترافق بتوالد هذه الخلية في المراحل المبكرة يتبعه نضج تتطور فيه الخواص الوظيفية والبنوية للخلية. وتتضمن حدثيات تطور الكريات الحمر ونضجها اختزالاً لقد الخلية وانكماشها ثم اختفاء نواتها واكتسابها صبغ أحمر كبير الأهمية ، هو الهيموغلوبين (خضاب الدم).


1 سليفة الأرومة السوية Rubriblast

(Pronormoblast, Proerythroblast). وتعد الخلية الأولى المتميزة من السلالة المولدة للحمر. يتراوح قطر الخلية بين 14 و 18 ميكرون، وتمتلك نواة دائرية كبيرة الحجم ذات كروماتين ناعم بلون أحمر أرجواني وتحتوي نوية واحدة أونويتين. وتشكل الهيولى حلقة حول النواة بلون أزرق غامق وتبدي أحيانا بعض الفجوات. (الشكل 2-2)



الشكل 2-2: سليفة الأرومة الحمراء السوية


2-الأرومة السوية الباكورة (Early Normoblast) Prorubricyte، وتعرف أيضا الأرومة الحمراء الأساسية Erythroblast basophile. يبلغ قطر الخلية 10-15 ميكرون وتمتلك نواة دائرية ومركزية عديمة النويات عادة وذات كروماتين أكثر خشونة مما هو عليه في الخلية السابقة. أما الهيولى فتتلون بالأزرق الغامق وتكون أغزر من هيولى سلفتها السابقة (الشكل 3-2).



الشكل 3-2: الأرومة السوية الباكورة

3-الأرومة السوية المتوسطة (Intermediate Normoblast) Rubricyte


، وتعرف أيضا بالأرومة السوية متعددة الألوان Polychromatophile Erythrocyte . يبلغ قطر الخلية 8-14 ميكرون، وهي تمتلك نواة بلون أزرق أرجواني غامق وأصغر حجما من نواة الخلية السابقة مع كروماتين خشن ومتكثف. أما الهيمولي فتكون بلون أزرق رمادي أو رمادي قرنفلي ، وتكون كميتها أغزر من هيمولي الخلية السابقة (الشكل 4-2).



الشكل 4-2: الأرومة السوية المتوسطة


4-الأرومة السوية المتأخرة (Late Normoblast, Metarubricyte) Erythroblast acidophile

، ويبلغ قطرها 7-10 ميكرون وهي ذات نواة صغيرة الحجم دائرية ومركزية وتتلون بالأزرق البنفسجي الغامق، أما الهيمولي فتشبه هيمولي الكرية الناضجة، وتكون بلون زهري أو وردي (الشكل 5-2).



الشكل 5-2: الأرومة السوية المتأخرة


5- الشبكية Reticulocyte. يعادل حجم الشبكية حجم الخلية السابقة ،وهي لا تمتلك نواة. وتكون الهبول بلون وردي ،و تحتوي شبكة رقيقة من الخيوط تمثل بقايا RNA التي تتلون بزرقة الكريزل اللماعة أو زرقة الميتيلين الجديدة (الشكل 6-2).



الشكل 6-2: الشبكية

تبقى الشبكيات لمدة يومين في النقي، ومن ثم تمر إلى الشعيرات الدموية بخاصية الانسلاخ ، وفي الدم المحيطي تختفي البقايا التي تتلون بزرقة الكريزل خلال يوم أو يومين. وتشكل هذه الكريات مانسبته 2،0-2٪ لدى الكهول و2-6٪ لدى الرضع من يحمل عدد الكريات الحمر في الحالة السوية. ويقدم عدد الشبكيات في الدم المحيطي معلومات قيمة عن درجة توالد الكريات الحمر، حيث تنخفض نسبتها لدى تباطؤ إنتاج الكريات ،فيما يلاحظ ارتفاع هذه النسبة لدى ازدياد نشاط نقي العظم لتصل في بعض الحالات إلى 50٪ من يحمل عدد الكريات الحمر كما هو الحال في بعض أنماط فقر الدم.

6-الكريات الحمراء الناضجة Erythrocyte. يبلغ قطر الكرية في الحالة السوية 7.2 ميكرون ، وحجمها 83 ميكرومتر مكعب . و تبدو الكرية الحمراء دائرية الشكل مع شيء من عدم الانتظام ، يتلون محيطها بالقرنفلي العاتم ومركزها بالوردي الشاحب (الشكل 7-2) .



الشكل 7-2 : الكريات الحمر السوية

ثانيا: ضبط تكون الحمر

يعد الأريتروپويتين Erythropoitin (مكون الحمر) من أكثر العوامل الناضجة تأثيرا في إنتاج الكريات الحمر . ومكون الحمر بروتين سكري بوزن جزيئي يقارب 35000 دالتون تشكل الكربوهيدرات 24٪ من كتلته فيما يشكل البروتين الذي يتكون من سلسلة مفردة تضم 340 حمضا أمينيا 76٪ من كتلته. ويفرز مكون الحمر بشكل رئيس من قبل الخلايا حول النخية في القشر الكلوي إضافة لأنتاج كمية منه (15٪) في الكبد. ويزداد إنتاج مكون الحمر في جميع حالات الحرمان من الأكسجين و العوز الأكسجيني (إنخفاض توتر الأكسجين في الدم الشرياني، الزيف الدموي ، ازدياد تخرب الكريات المرضي وغيرها) ، فيما ينخفض إنتاجه لدى ارتفاع توتر الأكسجين في الدم الشرياني. ويعمل مكون الحمر على حث توالد الخلايا المولدة للحمر (CFu-E) وتمايزها إلى أرومة حمراء ، كما يسرع نضج الأرومات ويحفز حدثيات اصطناع الهيموغلوبين فيها ، إلى جانب تحفيز تمايز خلايا جذعية أكثر بدائية. وتظهر الدراسات الكيميائية الحيوية أن تأثير مكون الحمر يترافق بازدياد اصطناع عدة أنماط من RNA وارتفاع فعالية DNA وإنتاج البروتين بما يضمن تأمين عدد كاف من الكريات الحمر لتزويد النسيج بحاجتها من الأكسجين. ويسهم مكون الحمر إلى

جانب العامل المحرض لسلالة الوحيدات (GM-CSF) والانتروكين -3 والانتروكين -1 والعامل المحرض لإنتاج الصفائح في زيادة إنتاج أم الصفائح. ويترافق فقر الدم (باستثناء فقر الدم الناتج عن القصور الكلوي) بظهور مستويات عالية من مكون الحمر في المصورة والبول. وكذلك أيضا العوز الأكسجيني الناجم عن السكن في الأماكن الجبلية المرتفعة أو نتيجة للأمراض القلبية والرئوية، الأمر الذي يسبب ما يعرف بكثرة الحمر Polycythemia.

وإلى جانب مكون الحمر يتطلب تكون الكريات الحمر السوي توفر الهرمونات الدرقية والأندروجينات والكورتيزول إضافة لهرمون النمو. فقد يؤدي فقدان أي من الهرمونات المشار إليها إلى فقر دم ، غالبا ما يكون سوي الصباغ، ويمكن أن يصحح بإعطاء الهرمون المفقود.

ثالثا: المتطلبات الغذائية الضرورية لإنتاج الكريات الحمر.

يتطلب التكون السوي للكريات الحمر توفر مجموعة من المواد في الغذاء اليومي للإنسان بحيث يؤدي نقص أي منها إلى اضطرابات في إنتاج الكريات الحمر . وتتضمن هذه المتطلبات المواد التالية:

1- الحموض الأمينية: تعد البروتينات الغذائية المصدر الرئيس للحموض الأمينية

اللازمة لاصطناع الهيموغلوبين. وبعد فقر الدم اللاتنسجي الذي يتجلى بنقص حلوية النقي والمرافق للعوز البروتيني (كما هو في داء كواشركور Kwashiorkor) الذي يخفف بالتغذية البروتينية الجيدة ، مثالا مشهودا عن أهمية البروتينات الغذائية في تكون الدم. وتصدر الإشارة إلى أن العوز البروتيني لدى البشر يؤدي إلى اضطرابات شديدة في اصطناع البروتينات المتاحة قبل أن ينال تأثيره المؤذي عملية اصطناع الهيموغلوبين الذي يتمتع بأولوية عن غيره من البروتينات الأخرى.

2-الحديد: تعود أهمية الحديد إلى كونه يدخل في تركيب الهيموغلوبين ويشكل أحد أهم مكوناته الوظيفية. ويؤدي عوز الحديد إلى عدم كفاية الهيموغلوبين وانخفاض تركيزه في الكرية، الأمر الذي يتجلى بفقر دم ناقص الصباغ صغير الكريات.

توزيع الحديد وأشكال نقله وخزنه في الجسم

تقدر كمية الحديد الموجودة في جسم الكهل السوي بنحو 3-5 غرامات ، يوجد مايقارب 73٪ منها في هيموغلوبين خلايا الدم الحمراء(يحتوي الغرام الواحد من الهيموغلوبين على 3.4ملغ من الحديد)، بينما يتوزع الحديد المتبقي على شكل مخزون متاح وغير متاح وحيد بلاسمي. يشكل الحديد متاح مانسبته 12-17٪ ويوجد على شكل مخزون في بروتين الفيريتين Ferritin والهيموسيديرين Haemosiderin في الخلايا الشبكية البطانية لكل من الكبد والطحال ونقي العظم . ويتكون الفيريتين من 24 وحدة متماثلة ومرتبطة على شكل صدفه يتضمن جوفها المركزي كمية متبدلة من الحديد ثلاثي التكافؤ(يمكن أن يربط جزئي الفيريتين 4500 ذرة حديد). أما الهيموسيديرين فيعتقد أنه كداسة من جزيئات الفيريتين تبلغ نسبة جزيئاته في الأعضاء التي تحتزن الحديد نحو 35٪ مقابل 65٪ للجزيئات الفيريتين. ويشكل الحديد غير متاح 10٪، ويوجد في خلايا الجسم حيث يدخل في تركيب الميوغلوبين و في الجمل الأنزيمية المؤكسدة مثل السيتوكرومات والكتلاز والبيروكسداز وغيرها . أما الحديد البلاسمي فلا يشكل سوى 0.2٪ من مجمل كمية الحديد في الجسم ،ويوجد مرتبطا ببروتين كروي وزنه الجزيئي 86000 دالتون يعرف بالترانسفيرين Transferrin. ويقدر تركيز الحديد البلاسمي بنحو 100-130 ميكروغرام/100 مل ، الأمر الذي يوافق إشباع الترانسفيرين بالحديد بنسبة 30-40٪ أما الإشباع التام للترانسفيرين

بالحديد فيرفع مستوى حديد البلاسما إلى نحو 300 ميكروغرام/100 مل، وهو ما يعرف بسعة الربط الكلي للحديد في البلاسما.

الاحتياجات اليومية من الحديد وطرق الامتصاص والإطراح

تقدر الحاجة اليومية من الحديد بنحو 1-2 ملغ، الأمر الذي يتطلب مدخولا يوميا يبلغ نحو 10-20 ملغ وذلك على افتراض أنه يتم امتصاص ما متوسطه 10% من المدخول اليومي. ويوجد الحديد في الطعام بشكلين : بروفيرين عضوي (هيمي) يتوفر في البروتينات الحيوانية ، كاللحوم والأسماك ومع البيض ، وحديد لاعضوي يتوفر في الأغذية نباتية المصدر. ويكون امتصاص الحديد الحيواني المصدر أفضل من امتصاص الحديد النباتي . فالسبانخ يتم امتصاص 4،1% من حديد ما بينما يمتص نحو 20% من حديد اللحم الأحمر. ويتحسن امتصاص الحديد غير العضوي عندما يكون بشكله المرجع (الثاني) ، الأمر الذي يحصل بفضل حموضة المعدة والعوامل المرجعة الأخرى الموجودة في الغذاء مثل الفيتامين C والبروتينات الحاملة لزرر سلفهيدريلية. ويحصل الامتصاص الأعظمي للحديد في المعى الاثنى عشري حيث ينقل إلى داخل الخلايا المخاطية بشكله المرجع بواسطة النقل الفعال . وفي داخل الخلايا ينقل الحديد بواسطة بروتين غير فيريتين ويعبر الغشاء القاعدي حيث يلتقط من قبل الترانسفيرين الذي ينقله إلى مواقع شتى في الجسم بشكله المؤكسد. ويمكن لقسم من الحديد الارتباط مع بروتين الأوفيريتين ويتحول إلى فيريتين يختزن داخل الخلايا المخاطية. أما امتصاص الحديد العضوي فيتم عن طريق عبور البورفيرين إلى داخل الخلايا الظهارية، وتفككه أنزيميا بواسطة الهيمواكسيداز، وتحرر الحديد داخلها.

ويعتمد امتصاص الحديد على عاملين مهمين، وهما: كمية الحديد المختزنة ومعدل تكون الكريات الحمر. ويزداد معدل الامتصاص لدى انخفاض مخزون الحديد وازدياد معدل تكون الحمر. ويمكن للعديد من العوامل أن تخفض معدل امتصاص

الحديد مثل وجود الفسفات أو الأوكسالات في الطعام التي تعمل على ترسيب الحديد في المعى، وكذلك نقص إفراز حمض كلور الماء في المعدة متعدد الأسباب وانخفاض إرجاع الحديد، إضافة إلى اضطرابات سوء الامتصاص المختلفة.

ويتم اطراح نحو 0.5-1 ملغ من الحديد مع البراز يوميا، في حين لا تتجاوز الكمية المطروحة عن طريق البول 0.1 ملغ، وكمية الحديد المفقودة مع الجلد المتوسف والأشعار والأظافر 0.2 ملغ. وتحدث لدى النساء خسارة شهرية حيضية إضافية تقدر بنحو 15-28 ملغ بالمقارنة مع الرجال، إضافة إلى خسارة نحو 400 - 900 ملغ أثناء فترة الحمل والولادة. ولذلك فإن احتياجات النساء من الحديد تكون عادة أكبر من احتياجات الرجال. وتزداد الحاجة للحديد خلال سن الرضاعة والطفولة والمراهقة بما يتوافق وازدياد حجم الدم اللازم لتروية النسيج الجديدة.

3- الفيتامينات: يتطلب الإنتاج السوي للكريات الحمر توفر الفيتامينات التالية في القوت اليومي:

أ- الفيتامين B12 وحمض الفوليك: يعد كل من الفيتامين B12 (السيانو كوبال أمين) وحمض الفوليك من الفيتامينات الضرورية لاصطناع البروتينات النووية. ويؤدي عوز أي من هذين الفيتامينين إلى حدوث اضطرابات في استقلاب DNA طلائع الكريات الحمر المنواة والمتنامية وينتج عن ذلك فقر دم ضخم الأرومات ، أو ما يعرف بفقر الدم الوبيل.

ب- الفيتامين C: يسهل الفيتامين C امتصاص الحديد في المعى من خلال المحافظة على الحديد بحالته المرجعة إضافة لإسهامه في الاستقلاب السوي لكل من السيانو كوبالامين وحمض الفوليك. وبعد عوز الفيتامين C وحمض الفوليك معا أمرا شائعا، فالأغذية الفقيرة بالفيتامين C تكون فقيرة أيضا بـ حمض

الفوليك. وينتج عن عوز هذين الفيتامينين فقر دم ضخم أو صغير الخلايا مع كريات حمراء سوية الصباغ.

ت- البيريدوكسين (الفيتامين B6) : يعد البيريدوكسين مادة ضرورية لإنتاج الهيم والبروتينات النووية، ويؤدي عوزها عند الأطفال إلى فقر دم صغير الخلايا ناقص الصباغ لا يستجيب للعلاج بالحديد، ولكنه يستجيب للبيريدوكسين.

ث- الريبوفلافين (الفيتامين B2) والنياسين (الفيتامين B3) وحمض النيكوتينيك (الفيتامين PP) والبيوتين: تشكل هذه الفيتامينات ثنائى أنزيمية في العديد من التفاعلات الأستقلابية. وغالبا ما يلاحظ عوز متعدد لهذه الفيتامينات بدلا من حدوث عوز لإحداها فقط، ويتجلى بفقر دم سوي الكريات سوي الصباغ يستجيب للعلاج بتعويض الفيتامين المفقود.

ج- الفيتامين E: يدخل الفيتامين E في تركيب الأغشية الخلوية ويعمل كمضاد أكسدة، ويمنع تشكل الجذور الحرة. ويبدو أن هذا الفيتامين ضروري من أجل الاصطناع السوي لغشاء الكريات الحمر لدى الأطفال، إذ أن عوزها يمكن أن يتسبب بفقر دم انحلاى شديد.

4- عناصر النادرة: وهي العناصر التي يحتاجها الجسم بمقادير ضئيلة مثل النحاس والكوبالت والزنك والنيكل، وهي توجد في الكريات الحمر إلى جانب عناصر أخرى. وبالرغم من عدم وجود أدلة كافية على أن عوز بعض هذه العناصر يفضي إلى فقر دم، تشير إلى أن الكوبالت يدخل في تركيب السيانونوكوبالامين ويحفز تشكل مكون الحمر (إعطاءه بكميات زائدة تفوق الاحتياجات السوية يسبب كثرة الحمر). ويعد النحاس ضروريا لاصطناع الترانسفيرين، ويؤدي عوزها إلى فقر دم صغير الكريات ناقص الصباغ.

الفصل الثاني


الخصائص البنيوية والوظيفية للكريات الحمر

أولاً: تعداد الكريات الحمر

يدعى عدد الكريات الحمر في ليتر واحد من الدم بالتركيز العددي للكريات الحمر، ويعبر عنه أيضا بعدد الكريات الحمر في المليمتر المكعب الواحد من الدم. ويعد هذا التعداد الذي يتم حاليا باستخدام تقانات متطورة (بدلا من الطريقة المجهرية التي تعتمد صفيحة التعداد)، تعتمد قياس شدة تبدد الضوء المسلط على محلول هذه الكريات أو تغير الناقلية الكهربائية لدى مرور الكريات في أنبوب شعري، من أهم الاختبارات التشخيصية لفقر الدم. وتتراوح القيم السوية لدى الرجال بين 4.5 و 5 مليون كرية/ملم³ وبين 4 و 5 مليون كرية/ملم³ لدى الإناث. ويلاحظ انخفاض عدد الكريات لدى الأشخاص المصابين بفقر الدم الناجم عن فقدان الكريات أو انحلالها. وباستثناء كثرة الحمر الفيزيولوجية لدى سكان المناطق المرتفعة، وكذلك لدى الأطفال حديثي الولادة، فلا يسجل ارتفاع الحمر إلا في حالات نادرة مثل القصور القلبي وكثرة الحمر والتجفاف.


ثانياً: الخواص الشكلية للكريات الحمر.

الكرية الحمراء لدى الإنسان عديمة النواة ذات شكل عدسي مقعر الوجهين (الشكل 8-2)، متناسب والوظيفة التي تقوم بها الكريات الحمر في نقل الغازات التنفسية. حيث يؤمن هذا الشكل زيادة مهمة في سطح الكرية بالمقارنة مع سطحها فيما لو كانت كروية الشكل، بحيث يصل مجموع مساحة سطوح الكريات الحمر عند الإنسان (25 ترليون كرية) إلى 3800 م². أضف إلى ذلك فإن الشكل العدسي مقعر الوجهين يقلل من المسافة الانتشارية للغازات بسبب كون سماكة الكرية في المركز لا تزيد عن 1 ميكرون.



الشكل 8-2: الكريات الحمر كما تبدو بالمجهر الماسح

وتتكون الكرية من هيكل بروتيني (ستروماتين) يحتوي على محلول مركز من الهيموغلوبين ومحاط بغشاء نصف نفوذ تبلغ سماكته 75 أنغستروم، يدخل في تركيبه البروتينات والدهون الفوسفورية والكوليسترول. ويسمح غشاء الكرية الذي يتميز بالمرونة وقابلية الانفعال والانشاء، بعبورها من خلال الأوعية الشعرية الضيقة التي يقل قطرها عن قطر الكرية.




الشكل 8-2: منحنى برايس-جونز لتوزيع الكريات الحمر بحسب قطرها لدى الشخص السوي (I) وشخص مصاب بفقر دم خبيث (II)

ويلاحظ تغير شكلها وحجمها في الكثير من فاقات فقر الدم . ويظهر منحني برايس-جونس (الشكل 8-2) توزع الكريات الحمر حسب قطرها لدى الإنسان السوي ولدى شخص مصاب بفقر دم خبيث، كريات حمر كبيرة (قطرها أكبر من 8 ميكرون) وكريات حمر صغيرة (قطرها أقل من 6 ميكرون). وتلاحظ الكريات الصغيرة عموماً في فقر الدم بعوز الحديد ، فيما تتوافر الكريات الكبيرة في فقر الدم بعوز الفيتامين KB12 وفقر الدم بعوز حمض الفوليك.

ثالثاً: الهيموغلوبين

1- بنية الهيموغلوبين

يعد الهيموغلوبين الذي يشكل مانسبته 34٪ من كتلة الكرية الحمراء الناضجة أهم المكونات الموجودة ضمن هيكلها البروتيني . وهو عبارة عن بروتين كروي صباغي يبلغ وزنه الجزيئي 64500 دالتون، ويتألف من جزئي غلوبولين وأربع جزيئات من الهيم (الشكل 9-2) . ويتكون الغلوبولين من أربع سلاسل بروتينية: سلسلتا α تتألف كل منهما من 141 حمض أميني، وسلسلتا β تتألف كل منهما من 146 حمض أميني .




الشكل 9-2: نموذج لجزيء الهيموغلوبين

وتقع المورثات التي تشرف على اصطناع السلاسل α في الصبغي 16 فيما توجد المورثات المسؤولة عن اصطناع السلال β على الصبغي 11. ويكون تسلسل الحموض الأمينية في السلاسل وفق نظام محدد ، بحيث يمكن للطفرات التي تصيب هذه

المورثات أن تنتج سلاسل غير نظامية من الناحيتين الكمية والنوعية ومن ثم خضابات شاذة.


ترتبط كل سلسلة من سلاسل الغلوبين بجزء واحد من صباغ الهيم، الذي يتألف من أربع حلقات بيرولية ترتبط مع بعضها بروابط ميثينية ويحتل الحديد ثنائي التكافؤ مركزها. وتحمل الحلقات البرولية جذورا ميثيلية وجذورا فينيلية إضافة إلى جذور البرويل. ويمتلك الحديد ستة روابط، تتشكل أربع منها بين الحديد وذرات الأزوت في الحلقة البرولية، فيما تتشكل رابطتان مع جذور الهستيدين في موقعين مختلفين من سلسلة الغلوبين، إضافة لإمكانية تشكل روابط إضافية بين جذور البرويل والزرر الأمينية الحرة في سلسلة الغلوبين (الشكل 10-2).



الشكل 10-2: البنية الكيميائية للهيموغلوبين

ويرتبط جزء الهيموغلوبين بأربعة جزيئات من الأكسجين نظرا لارتباط الحديد في كل زمرة من زمر الهيم بجزء واحد من الأكسجين. ويكون هذا الارتباط ضعيفا

وعكوسا ،ولا يؤدي إلى تغيير القيمة الاتحادية للحديد ،ويعرف الهيموغلوبين في هذه الحالة بالأوكسي هيموغلوبين Oxyhemoglobin . وتأخذ سلاسل الغلوبين في جزيء الهيموغلوبين شكلا كرويا تتضمن فجوة محيطية يقع داخلها جزيء الهيم المسطح (الشكل 11-2)



الشكل 11-2: مخطط ترسمي لجزيء الهيموغلوبين

2-أنماط الهيموغلوبين السوي

يجري التمييز بين ثلاثة أنماط من الهيموغلوبين السوية التي تشترك جميعا في احتوائها على سلسلتين α يتألف كل منها من 141 حمض أميني، فيما تختلف عن بعضها بمكونات السلسلتين β من الحموض الأمينية.

أ- هيموغلوبين الكهل (A أو A1) : يتألف هذا الخضاب من سلسلي ألفا (141 حمض أميني) وسلسلي بيتا (146 حمض أميني)، ويشكل 98% من مجموع هيموغلوبين الكهل السوي.

ب- الهيموغلوبين A2: يماثل هذا الخضاب الهيموغلوبين A، إلا أنه يختلف عنه في كون السلاسل بيتا تحتوي عشرة أحماض أمينية مختلفة، وتسمى

بالسلاسل δ (دلتا). ويشكل الهيموغلوبين A2 نحو 2% من الخضاب الكلي للكهل.

ت - الهيموغلوبين F: وهو الخضاب التنفسي الرئيسي أثناء الحياة الرحمية، ويختلف عن الهيموغلوبين A في كون السلسلة بيتا تحتوي على 37 حمضا أمينيا مختلفا عما هو عليه في الهيموغلوبين A، وتعرف بالسلسلة γ (غما). ويشكل هذا الخضاب مانسبته 80-90% من مجموع الهيموغلوبين عند الولادة، إلا أن هذه النسبة تنخفض إلى نحو 50% خلال ستة شهور وإلى 1% في سن البلوغ والكهولة.

وتجدر الإشارة إلى تشكل هيموغلوبينات جنينية آخر في الحياة داخل الرحمية مثل هيموغلوبين $Gower-1$ ($2\epsilon 2$) و $Gower-2$ ($2\epsilon 2$) وكذلك هيموغلوبين $Portland-1$ ($2\gamma 2$) وخاصة في الكيس المحي. أما الهيموغلوبين F فيتكون في الكبد والطحال بشكل خاص ويستمر بعد ذلك تكونه في نقي العظم إلى جانب الهيموغلوبين A2 (الشكل).

3- وظائف الهيموغلوبين

ينحصر دور الهيموغلوبين في نقل الغازات التنفسية كأحد أهم الوظائف الحيوية للدم إلى جانب دوره في صيانة درجة حموضة الدم كأحد أهم المؤشرات الاستتبابية للوسط الداخلي.


أ- نقل الأكسجين

ينقل معظم الأكسجين في الدم (97%) على شكل اتحادات كيميائية عكوسة مع الهيموغلوبين، فيما لا تتجاوز كمية الأكسجين المنقولة على شكل محلول فيزيائي في المصورة مانسبته 3% من مجمل كمية الأكسجين المنقولة في الدم. وهكذا يرفع الهيموغلوبين كفاءة الدم على نقل الأكسجين بمقدار 60 مرة. ويستطيع الجزيء الواحد من الهيموغلوبين الاتحاد مع أربعة جزيئات من الأكسجين، على فرض أن جزيء

الهيموغلوبين يحتوي على أربع زمر هيمية، ترتبط كل منها مع جزيء أكسجين بروابط عكوسة عندما يكون توتر الأكسجين مرتفعاً، كما هو الحال في الشعريات الرئوية

، وتعرف عملية اتحاد الأكسجين مع الهيموغلوبين بالأكسجة Oxygenation.


، ويدعى الهيموغلوبين بالأكسي هيموغلوبين (الهيموغلوبين المؤكسج) . و لدى انخفاض توتر الأكسجين كما هو الحال في النسيج، يتخلى الهيموغلوبين عن الأكسجين ويتحول إلى هيموغلوبين متزوع الأكسجين Desoxy-hemoglobin (الشكل 12-2).



الشكل 12-2: تفاعل أكسجة الهيموغلوبين

ويتعلق اتحاد الأكسجين مع الهيموغلوبين ، وتشكل الهيموغلوبين المؤكسج بتركيز الغاز المنحل ،الذي يرتبط بدوره بتوتر الأكسجين في الدم. وتعرف نسبة الهيموغلوبين المؤكسج إلى مجمل كمية الهيموغلوبين (المؤكسج ومتزوع الأكسجين) بدرجة إشباع الهيموغلوبين. ويعكس منحني تفكك الأكسي هيموغلوبين العلاقة بين توتر الغاز في الدم ودرجة إشباع الهيموغلوبين (الشكل 13-2) . وتكون نسبة الإشباع مساوية الصفر عندما يكون الهيموغلوبين متزوع الأكسجين بشكل كامل، بينما تبلغ نسبة الإشباع 100% عندما يكون الهيموغلوبين مؤكسجاً بالكامل . ويعرف توتر الأكسجين الذي تكون عنده نسبة الإشباع 50% بتوتر نصف الإشباع . ويبلغ توتر نسبة الإشباع في الحالة السوية 26 ملم. زئبق. وكما هو موضح في الشكل يأخذ منحني تفكك


حرارة العضلات أثناء التمرين أن يسهم في تيسير إمدادها بالأكسجين من خلال تأثير الحرارة في تخفيض ألفة الهيموغلوبين للأكسجين.



الشكل 14-2: - تأثير درجة الحرارة على منحنى تفكك الأكسي هيموغلوبين


تأثير درجة الحموضة (PH) وتوتر ثاني أكسيد الكربون.

كما هو موضح في الشكل (15-2) يترافق ارتفاع درجة حموضة الدم (انخفاض تركيز أيونات الهيدروجين وارتفاع الرقم الهيدروجيني) بازدياد ألفة الهيموغلوبين للأكسجين، بينما تخفض هذه الألفة لدى انخفاض درجة الحموضة (ارتفاع تركيز أيونات الهيدروجين في الدم وانخفاض الرقم الهيدروجيني). ويعرف تأثير درجة الحموضة على ألفة الهيموغلوبين للأكسجين بفعل بور Boher effect.



الشكل 15-2 : تأثير درجة الحموضة على منحنى تفكك الأكسي هيموغلوبين

ويعتلك توتر ثاني أكسيد الكربون تأثيرا مشابها لدرجة الحموضة في ألفة الهيموغلوبين للأكسجين. فارتفاع توتر ثاني أكسيد الكربون في الدم (الذي يترافق بارتفاع تركيز أيونات الهيدروجين) يعمل على تخفيض الألفة بين الهيموغلوبين والأكسجين، بينما يترافق انخفاض توتر هذا الغاز (الذي يترافق بانخفاض تركيز أيونات الهيدروجين)، بازدياد الألفة (الشكل 16-2). ويعرف أيضا تأثير توتر ثاني أكسيد الكربون على ألفة الهيموغلوبين للأكسجين بفعل بور. ولكن من الواضح أن تأثير ثاني أكسيد الكربون في شكل المنحنى لا يعود فقط إلى ما يرافق ذلك من تغير في تركيز أيونات الهيدروجين، بل أيضا لتأثيره الخاص والنوعي في ألفة الهيموغلوبين للأكسجين.




الشكل 16-2: تأثير توتر ثاني أكسيد الكربون على منحنى تفكك الأكسي هيموغلوبين

ويعتلك أثر بور أهمية محددة في تيسير ارتباط الأكسجين في الرئتين من جهة، وتسهيل تقديمه للنسج من جهة أخرى. ففي الرئتين تتزامن عملية اتحاد الأكسجين مع الهيموغلوبين بتحرر ثاني أكسيد الكربون من الدم إلى الأسناخ، الأمر الذي يترافق بانخفاض توتر ثاني أكسيد الكربون في الدم ازدياد ألفة الهيموغلوبين للأكسجين ومن ثم تسريع انتشار الأكسجين للدم الوريدي وتحوله إلى دم شرياني. وفي النسج يسهل أيضا أثر بور تحلي الهيموغلوبين عن الأكسجين نظرا لكون عملية تحرر الأكسجين

سوف تكون مترافقة بانتشار ثاني أكسيد الكربون إلى الدم ، الأمر الذي يخفض إلفة الهيموغلوبين للأكسجين وتحرره بسهولة إلى النسج.

○ تأثير 2,3-ثنائي فوسفو غليسيرات (2,3-DPG)

يتشكل 2,3-ثنائي فوسفو غليسيرات (2,3-DPG) في الكريات الحمر انطلاقاً منه 1,3-ثنائي فوسفو غليسيرات بتوسط أنزيم ثنائي فسفوغليسيرات موتاز . ويرتبط هذا المركب بروابط ملحية مع السلاسل بيتا في جزيء الهيموغلوبين منزوع الأكسجين (الشكل 17-2) ، ويسبب في الحالة السوية انزياح منحني تفكك الأكسجين هيموغلوبين اليمين بشكل قليل. إلا أن تشكل 2,3-DPG بكميات كبيرة في الكريات الحمر لدى نقص الأكسجين يسبب انزياح أكبر في منحني تفكك الأكسجين هيموغلوبين وازدياد تحرر الهيموغلوبين للنسج. وفي الرئتين يؤدي قبط الأكسجين إلى تحطم الروابط الملحية بين سلاسل بيتا ويتم التحلي عن 2,3-DPG وتزداد الألفة للأكسجين. وبدون شك يشكل ذلك آلية مهمة للتلاؤم مع نقص الأكسجين، إلا أن انخفاض الألفة لدى ازدياد تشكل 2,3DPG يمكن أن يعيق ارتباط الأكسجين في الرئتين ، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن أهمية انزياح المنحني لدى انخفاض توتر الأكسجين في الرئتين.



الشكل 17-2: ارتباط 3,2 - ثنائي فوسفو غليسيرات مع الهيموغلوبين منزوع الأكسجين

وتجدر الإشارة إلى امتلاك انزياح منحني تفكك الأكسي هيموغلوبين نحو اليمين أهمية كبيرة أثناء التمرين الذي يترافق بتشكيل كميات كبيرة نسبيا من ثاني أكسيد الكربون وأيونات الهيدروجين، إضافة إلى ازدياد حرارة العضلات نفسها، الأمر الذي يسمح بتيسير تحرر الأكسجين إلى العضلات عند ضغوط مساوية 40 ملم. زئبق. ويلاحظ تغير شكل منحني تفكك الأكسي هيموغلوبين في العديد من الفاقات الدموية المرتبطة بتشكيل خضابات شاذة، وكذلك في حالات الحماض والقلاء المرضيين، إلى جانب استنشاق الغازات السامة مثل أول أكسيد الكربون.


نقل ثاني أكسيد الكربون.

ينقل ثاني أكسيد الكربون في الدم على شكل محلول فيزيائي وعلى شكل اتحادات كيميائية تكون أكثر تعقيدا من مثيلتها بالنسبة للأكسجين، نظرا لكونها تؤمن في الوقت نفسه ثبات التوازن الحمضي - الأساسي .

تترافق عمليات التبادل الغازي في مستوى النسيج بارتفاع توتر ثاني أكسيد الكربون من 40 ملم. زئبق في الدم الشرياني إلى 46 ملم. زئبق في الدم الوريدي. ولاتتجاوز كمية غاز ثاني أكسيد الكربون المنقول على شكل محلول فيزيائي مانسبته 10٪، فيما ينقل القسم الأكبر منها على شكل اتحادات كيميائية ، يمكن إيجازها على النحو التالي:

ينتشر ثاني أكسيد الكربون في البداية إلى داخل الكرية الحمراء حيث تجري عملية ربطه بالماء وتحوله إلى حمض الكربون بتواسط أنزيم الكربوهيدراز. ويتشرد حمض الكربون إلى أيونات الهيدروجين وأيونات البيكربونات، حيث يتم انتشار قسم من أيونات البيكربونات إلى المصورة بالتبادل مع أيونات الكلور ، وتعرف هذه العملية بانزياح الكلور Chloride shift (الشكل 18-2). وهكذا يجري نقل مانسبته 80٪ من غاز ثاني أكسيد الكربون على شكل بيكربونات 35٪ منها داخل الكريات الحمر، و 45٪ في المصورة الدموية. وبالرغم من ترافق هذه العملية بارتفاع تركيز أيونات الهيدروجين في الكريات الحمر، فإن درجة حموضة الكريات (ph) لا تتعرض


لتقلبات ملحوظة ،على فرض أن قسما كبيرا من هذه الأيونات يرتبط مع الهيموغلوبين الذي يمتلك سعة دائرية (موقية) كبيرة.أضف إلى ذلك يمتلك الهيموغلوبين المتروغ الأكسجين خواصا حمضية ضعيفة تفوق مثيلتها لدى الهيموغلوبين المؤكسج، الأمر الذي يسهم أيضا في إزاحة كمية إضافية من أيونات الهيدروجين. أما ما تبقى من ثاني أكسيد الكربون والتي تبلغ نسبته نحو 10٪، فينقل داخل الكريات الحمر مرتبطا مع الزمر الأمينية لبروتينات الهيموغلوبين على شكل روابط كاربامينية ويدعى عند ذلك بالكاربامينو هيموغلوبين Carbinohemoglobin أو كارباهيموغلوبين.



الشكل 18-2: نقل الغازات التنفسية ومبادلاتها في الحويصلات الرئوية والنسيج

ويتعلق مقدار ثاني أكسيد الكربون المنقول على شكل محلول فيزيائي واتحادات كيميائية بتوتر هذا الغاز في الدم. ويمكن تمثيل العلاقة بين محتوى ثاني أكسيد الكربون المنقول بمختلف أشكاله وتوتر هذا الغاز في الدم، بمنحنى مشابه لمنحنى تفكك الأكسي هيموغلوبين، ويعرف بمنحنى ارتباط ثاني أكسيد الكربون. وكما هو موضح في الشكل (19-2)، فإن مقدرة الدم غير المؤكسج على نقل ثاني أكسيد الكربون تفوق مثيلتها للدم المؤكسج عند نفس التوتر. ويرتبط ذلك بمقدرة الهيموغلوبين متروغ الأكسجين على ربط كميات إضافية من أيونات الهيدروجين، إضافة إلى كونه أكثر ميلا لتشكيل روابط كاربامينية من الهيموغلوبين المؤكسج.

وتدعى العلاقة بين محتوى غاز ثاني أكسيد الكربون ونسبة أكسجة الهيموغلوبين والذي يسهل عملية تبادل ثاني أكسيد الكربون في النسيج والرئتين بفعل هالدان Haldane effect. ففي النسيج تترافق عملية تحرر الأكسجين بانخفاض نسبة الهيموغلوبين المؤكسج وازدياد مقدرة الدم على ربط ثاني أكسيد الكربون. أما في الرئتين فتتزامن عملية أكسجة الهيموغلوبين بانخفاض مقدرة الدم على ربط ثاني أكسيد الكربون مما يسهل انتشاره إلى الأسناخ.



الشكل 19-2: علاقة محتوى الدم من ثاني أكسيد الكربون بدرجة أكسجة الهيموغلوبين

الوظيفة الموقية (الدائرة)

ترتبط الخواص الدائرة للبروتينات بما فيها الهيموغلوبين بمقدرة الحموض الأمينية على التأين وخاصة الجانبية منها، مثل حلقة الأميادازول في الحمض الأميني الهستيدين. ويعد الهيموغلوبين مسؤولاً عما نسبته 75% من القوة الدائرة للدم نظراً لتركيزه الكبير ضمن الكريات الحمر من جهة، وتضمنه نسبة مرتفعة من الحمض الأميني الهستيدين من جهة أخرى. وعلاوة على ذلك تنجم الأهمية الدائرة للهيموغلوبين من حقيقة كون تبادل الأكسجين في النسيج والرئة يعزز بشكل ملحوظ التأثير الدائر للهيموغلوبين. فالخواص الحمضية للهيموغلوبين تتعلق بدرجة أكسجته، فالهيموغلوبين مترواح الأكسجين يمتلك خواص حمضية ضعيفة أعلى من

الهيموغلوبين المؤكسج، وهو الأمر المتعلق بتأثير الأكسجين المرتبط مع الحديد في ألفة حلقة الأميدازول لأيونات الهيدروجين. وبفضل ذلك فإن تخلي الهيموغلوبين عن الأكسجين في النسج يكسبه مقدرة أكبر على ربط أيونات الهيدروجين ودرء انخفاض باهاء الدم نتيجة انتشار ثاني أكسيد الكربون. أما في الرئتين فيلعب الهيموغلوبين المؤكسج دور الحمض الذي يمنع ارتفاع باهاء الدم إثر طرح ثاني أكسيد الكربون.

4-الهيموغلوبينات (الخضابات) غير الفعالة فيزيولوجيا

تشبه الهيموغلوبينات غير الفعالة فيزيولوجيا الهيموغلوبينات السوية من حيث البنية إلا أنها تختلف عنها بعدم مقدرتها على نقل الغازات التنفسية، إما بسبب تأكسد ذرة الحديد في جزئي الهيم أو ارتباط جزئي الهيم بأحد الغازات السامة، وهي تتضمن الخضابات التالية:

أ- الكربوكسي هيموغلوبين **Carboxyhemoglobin**. وينجم هذا الخضاب عن اتحاد أول أكسيد الكربون مع الهيموغلوبين المتزوج الأكسجين حتى في التراكيز الضئيلة جدا لهذا الغاز بسبب إفته الكبيرة للهيموغلوبين والتي تفوق إلفة الأكسجين بنحو 200 مرة. وفي الحالة السوية يشكل الكربوكسي هيموغلوبين مانسبته 1% من مجمل هيموغلوبين الدم، وترتفع هذه النسبة لتصل نحو 3% لدى المدخنين و 20% لدى سائقي التوكسي. ولا ترتبط سمية أول أكسيد الكربون بإفته الكبيرة للهيموغلوبين فقط، بل أيضا بانزياح منحني تفكك الأكسي هيموغلوبين نحو اليسار، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض أكبر في توتر أكسجين الشعريات النسيجية، وتفاقم الأثر السمي لهذا الغاز.

ب- الهيموغلوبين المؤكسد **Methemoglobin**. يتشكل هذا الخضاب بنتيجة أكسدة الحديد وتحوله من حديد ثنائي إلى حديد ثلاثي القيمة الاتحادية غير قادر على ربط الأكسجين. ويمكن لهذا الخضاب أن يوجد في

الحالات السوية بتراكيز ضئيلة تقدر بنحو 0.01-0.3% إلا أن تركيزه يرتفع بشكل ملحوظ في بعض الاضطرابات الأنزيمية داخل الكريات الحمر وخاصة عدم إنتاج كميات كافية من توائم الغلوتاتيون ريډوكتاز أو الميت-هيموغلوبين ريډوكتاز ($NADH_2, NADPH_2$) ، أو غياب هذه الأنزيمات، أو تناقص فعاليته إضافة لتناول بعض المركبات المؤكسدة.

ت- **السيانهموغلوبين Syanhemoglobin**. (الخضاب السيانوجيني) لا يوجد هذا الخضاب في الحالة السوية، ويتشكل نتيجة اتحاد الهيموغلوبين موزوع الأكسجين مع حمض سيان الماء $K HCN$ كما في حالات التسمم بالسيانيد.

ث- **السفهموغلوبين Sulfhemoglobin** (الخضاب الكبريتي). يتشكل هذا الخضاب من اتحاد الهيموغلوبين موزوع الأكسجين مع غاز كبريت الهيدروجين (كما هو في المناجم)، أو بسبب تناول بعض الأدوية المؤكسدة، ولا يوجد أيضا في الحالات السوية.

5- تركيز الهيموغلوبين وطرائق تمييزه

يتراوح تركيز الهيموغلوبين عند الرجل السليم بين 130 و 180 غ/ل (13-18 غ/100 مل)، ولدى الإناث بين 115 و 165 غ/ل (11.5-16.5 غ/100 مل). ويشير انخفاض تركيز الهيموغلوبين عن 130 غ/ل لدى الذكور وعن 115 غ/ل لدى الإناث إلى انخفاض مقدرة الدم على نقل الأكسجين، الأمر الذي يصطلح على تسميته بفقر الدم.

ويستخدم في قياس تركيز الهيموغلوبين العديد من الطرائق التي تختلف في درجة تعقيدها ودقتها. ونذكر من الطرائق غير المباشرة تحديد تركيز الهيموغلوبين بالاعتماد على تقدير كمية الأكسجين المرتبطة في الدم، ومن ثم حساب تركيز الهيموغلوبين انطلاقا من عدد هيوغفر (كل 1 غ من الهيموغلوبين يرتبط مع 1.34 مل من الأكسجين). كما ويمكن حساب تركيز الهيموغلوبين من خلال

قياس مقدار الحديد في الدم، والذي يشكل 34٪ من الهيموغلوبين (الغرام الواحد من الهيموغلوبين يرتبط بـ 3,4 ملغ من الحديد). وتعد طريقة القياس الضوئي الطيفي Spectrophotometry من أكثر الطرائق المستخدمة بدقة في تحديد تركيز الهيموغلوبين. ويتلخص مبدأ هذه الطريقة في تحويل الهيموغلوبين إلى سيان ميثهيموغلوبين بواسطة محلول مخفف (محلول درابكن مثلاً) ومن ثم قياس امتصاصية هذا المحلول التي تكون متناسبة مع تركيز الهيموغلوبين وفقاً لقانون بير-لامبرت:

$$E = \log(I^0/I) = \Sigma c d$$

حيث: I^0 و I شدة الضوء المسلط والنافذ تبعاً، Σ : معامل الامتصاصية، c : تركيز المحلول، d : سماكة المحلول.

ويستخدم أيضاً مقياس الطيف الضوئي Spectroscope في تمييز مختلف أنماط وأشكال الهيموغلوبينات ومعايرتها والتي تبدي طيوف امتصاص متباينة في المرئي، وما فوق البنفسجي وما تحت الأحمر. فالهيموغلوبين المؤكسج يمتلك طيف امتصاص أعظمي في الموجة 540 نانومتر، بينما يبدي الهيموغلوبين مزروع الأكسجين طيف امتصاص أعظمي في الموجة 556. وكذلك يكون طيف الامتصاص الأعظمي للهيموغلوبين المؤكسد في الموجة 630 والكربوكسي هيموغلوبين في الموجة 535 والسلفوهيموغلوبين في الموجة 618 والسيان ميثهيموغلوبين في الموجات 480 و 541.

ومن الطرائق المستخدمة أيضاً في التمييز بين مختلف أنماط الهيموغلوبينات الطبيعية والشاذة نذكر طريقة الرحلان الكهربائي Electrophoresis والمسح القلوي Alkali denaturation، والدوبان في الأملاح المعتدلة، إضافة إلى طرائق التفريق اللوني Chromatography، والطرق المناعية وتقنيات البيولوجيا الجزيئية.

6-اصطناع الهيموغلوبين


يتم تركيب الهيموغلوبين في مختلف مراحل تكون الكريات الحمر ابتداء من الأرومة الحمراء وانتهاء بالشبكة حيث توجد المعلومات الوراثية اللازمة لاصطناع سلاسل الغلوبين، وكذلك العضيات الخلوية الضرورية لتركيب زمر الهيم.

يتم اصطناع سلاسل الغلوبين وفق الشيفرة الوراثية التي تحملها المورثات في صبغيات النواة وبشكل مماثل لآلية اصطناع البروتينات الخلوية الأخرى. أما الحموض الأمينية اللازمة لتركيب السلاسل فيتم تأمين قسم منها عن طريق الغذاء، والقسم الآخر يصطنع داخل الجسم .

أما الهيم فيتم اصطناعه ضمن الجسيمات الكوندرية للخلايا نفسها التي تتم فيها عملية اصطناع سلاسل الغلوبولين.

وتبدأ عملية اصطناع الهيم باتحاد 8 جزيئات من السوكسينيل غم-آ SuccinylCoA ،الذي يشتق من حمض الخليك في حلقة كريس مع 8 جزيئات من الغليسين Glycine ليتشكل 8 جزيئات من دلتا-حمض الليفولينيك Amino-levulinic acid . ويتوسط هذا التفاعل أنزيم صانع حمض الأمينولينيك التي تتطلب توفر الفيتامين B6.(الشكل 20-2) وبوجود أنزيم ديهيدراتاز يتشكل حلقة على شكل بورفوبيلينوجين Porphobilinogen من كل جزيئين من حمض الأمينو ليفولينيك ، ثم تتحد الحلقات الأربع مع بعضها مشكلة جزيء بروتوبورفيرين Protoporphyrin يرتبط مع الحديد مشكلا جزيء هيم بتوسط أنزيم سنتيتاز.

وفي المرحلة الأخيرة يتم ارتباط جزيء الهيم مع إحدى سلاسل الغلوبين ،ثم تتحد السلاسل الأربع لتشكل جزيء الهيموغلوبين.




الشكل 20-2: مخطط اصطناع الهيم

و يلاحظ اضطراب اصطناع الهيم في الإنسمام بالمعادن الثقيلة مثل الرصاص والزئبق والكادميوم والزرنيخ. فمعظم هذه العناصر تعمل على تثبيط الأنزيمات التي تتواسط اصطناع الهيم، كما تتنافس وشاردة الحديد على الارتباط مع البروتوبورفيرين، مما يرفع من تركيز الكوبروبورفيرين Coproporphyrin في الدم، ويزداد إطراحه في البول. وتعد معايرة الكوبروبورفيرين في البول من أهم الاختبارات التشخيصية للإنسمام بالمعادن الثقيلة، ففي الإنسمام الرصاصي يزداد معدل إطراحه عن 280 ميكروغرام/يوم، وقد يصل في بعض الحالات إلى 10000 ميكروغرام/يوم

7- تفكك الهيموغلوبين خارج الأوعية

يتم تحطم الهيموغلوبين وتقويضه بعد اكتمال حياة الكرية الحمراء وتخرها في خلايا الجملة الشبكية البطانية لكل من الكبد والطحال ونقي العظم. ففي البداية يتأكسد الهيموغلوبين ويتحول إلى فيردوغلوبين، يتفكك بدوره ذاتيا إلى بيليغريدين بعد

تخليه عن الحديد الذي ينقل بوساطة الترانسفيرين، ويختزن على شكل فيريتين. أما الغلوبين فيتفكك إلى أحماض أمينية يمكن الاستفادة منها . ويتحول البيليغرين إلى صباغ صفراوي يعرف بالبليروبين بعملية إرجاع، ويتحرر من خلايا النسيج الشبكي البطاني إلى المصورة الدموية ، حيث يرتبط بالألبومين، ويعرف في هذه الحالة بالبليروبين الحر Free bilirubin ، أو البليروبين غير المباشر Indirect bilirubin ، وهو مركب غير منحل في الماء ويبلغ تركيزه السوي في المصورة نحو 0,2-0,7 ملغ/100 مل. ويعاد النقاط البليروبين الحر من قبل الخلايا الكبدية، ويتم تحوله إلى بيليروبين مرتبط Conjugated bilirubin ، أو ما يعرف بالبليروبين المباشر عن طريق ربطه بحمض الغلوكورونيك Glucuronic acid . والبليروبين المرتبط مركب منحل في الماء وغير سام يبلغ تركيزه السوي في المصورة الدموية نحو 0,2 ملغ/100 مل. ويتم إفراز البليروبين المرتبط بآلية نقل فعالة من الخلايا الكبدية، وينقل إلى المعى مع مكونات العصارة الصفراوية، حيث يتحول بفعل البكتريا المعوية إلى مولد الستركوبيلين Stercobilinogen . وفيما طرح معظم الستركوبيلين مع البراز الذي يتحول إلى ستيركوبيلين ويعطي البراز لونه المميز، يعاد امتصاص نحو 20% منه عبر ظهارة الأمعاء لتعود إلى الكبد عبر وريد الباب. ويعاد طرح معظم الكمية الممتصة من جديد مع مكونات الصفراء، فيما تطرح الكمية المتبقية مع البول على شكل مولد اليوروبيلين Urobilinogen الذي يتأكسد حال تعرض البول للهواء، ويتحول إلى يوروبيلين (الشكل 2-21).



الشكل 21-2: تقويض الهيموغلوبيين

وتعرف الحالة السريرية التي تترافق بارتفاع تركيز البيليروبين في المصورة وتراكمه في أنسجة الجسم (الجلد والنسج البطانية والصلبة) باليرقان **K Jaundic** الذي يصنف في ثلاثة أشكال:

1- **اليرقان الانحلالي (قبل الكبدي):** ينجم عن انحلال الكريات الحمر المرضي الذي يصادف في فقر الدم الانحلالي متعدد الأسباب. ويتميز هذا النمط من اليرقان بارتفاع تركيز البيليروبين الحر في المصورة وكذلك ارتفاع تركيز مولد اليوروبيلين في البول، دون أن يترافق ذلك بارتفاع تركيز البيليروبين المرتبط في المصورة وغيابه التام من البول.


2- **اليرقان الانسدادي (بعد الكبدي):** ينجم عن انسداد اقناة الصفراوية بحصاة أو نتيجة ورم ضاغط مما يسبب ارتفاع تركيز البيليروبين المرتبط في المصورة وانفراغه عن طريق

البول. ونظرا لعدم مرور البيليرويين إلى الأمعاء فلا يتشكل مولد الستيركوبيلين ومن ثم يخلو البول من مولد اليوروبيلين، فيما يكون البراز حواريا أو غضاريا لغياب الأصبغة الصفراوية.

-اليرقان الخمجي (الإنثاني الكبدي): ويحدث نتيجة إصابة الكبد بحمات أو عوامل ممرضة تسبب التهاب الكبد وتأذي الخلايا الكبدية.

8-تخطم الهيموغلوبين داخل الأوعية

إضافة لتخرب الكريات الحمر في خلايا النسيج الشبكي البطاني ، ينحل نحو 10% من الكريات في الحالة السوية داخل الأوعية الدموية ويتحرر الهيموغلوبين في الدم مباشرة. وفي هذه الحالة يرتبط الهيموغلوبين مع بروتين مصوري يعرف بالهبتوغلوبين Haptoglobin الذي يشكل معه معقد يعيق ارتشاحه عبر الكيب الكلوية ويمنع طرحه مع البول. ويجري التقاط معقد الهيموغلبين-هبتوغلوبين من قبل الخلايا الكبدية حيث تجري عملية تقويض الهيموغلوبين وفق الآلية خارج الوعائية المبينة أعلاه. ومع ازدياد الأنحلال يرتفع تركيز الهيموغلوبين إلى مستوى أعلى من سعة الربط القصوى للهبتوغلوبين الأمر الذي يسمح للفائض من الهيموغلبين بالارتشاح عبر الكيب الكلوية. وتستطيع الخلايا الظهارية في النبيبات الكلوية إعادة امتصاص الهيموغلوبين المرتشح وتحويل قسم منه إلى هيموسيدرين Hemosiderin يخزن في حبيباتها.



الشكل 22-2: تفكيك الهيموغلوبين داخل الأوعية.

ويمكن للهيموغلوبين أو الهيموسيدرين أو كلاهما العبور إلى البول لدى ارتفاع تركيز الهيموغلوبين في الرشاحة الكنية إلى حدود تفوق المقدرة القصوى لعودة امتصاصه في النبيبات الكلوية وهو ما يعرف باليلة الهيموغلوبينية Hemoglobinuria واليلة الهيموسيدرينية Hemosidreinuria. أما الهيموغلوبين غير المرتبط مع الهبتوغلوبين فيتأكسد في الدم متحولاً إلى ميتهموغلوبين Methemoglobin وتنفصل زمرته الهيمية لترتبط مع بروتين يعرف بالهيموبكسين Hemopexin. ويزاح الهيموبكسين من الدوران ويجري تقويضه بواسطة الخلايا الكبدية، فيما ترتبط زمرة الهيم الفائضة عن سعة الربط الكلية للهيموبكسين مع ألبومين المصورة، ويتشكل معقد يعرف بالميتهم ألبومين Methemalbumin يمكن أن يزاح لدى توفر الهيموبكسين (الشكل 22-2). ويعد نفاذ الهبتوغلوبين والهيموبكسين مع ظهور اليلة الهيموسيدرينية وارتفاع تركيز الميتهم ألبومين من أهم مؤشرات فقر الدم الانحلالي الوعائي وتخرب الكريات الحمر النقوي. أما ارتفاع تركيز الميتهم ألبومين المترافق بنفاذ الهيموبكسين وعدم ظهور

البيلة الهيموسيدرينية ، فيشير إلى نزيف داخل النسيج، كما هو في النزيف داخل البطن لدى الحمل خارج الرحم.

رابعاً: استقلاب الكريات الحمر

بالرغم من كون الكرية الحمراء الناضجة لا تحتوي نواة ولا جسيمات كوندريية، فهي تمتلك مجموعة من الأنزيمات السيتوبلاسمية التي تتوسط استقلاب الغلوكوز واختزان طاقته المتحررة على شكل مركبات عالية الطاقة تتمثل بالأدينوزين ثلاثي الفوسفات (ATP)، والنيكوتين أميد ثنائي النكليوتيد (NADH₂) والنيكوتين أميد ثنائي النكليوتيد فسفات (NADPH₂). وتستخدم هذه المركبات في تأمين قيام الكريات الحمر بوظيفتها K وهي نقل الغازات التنفسية و تبادل الأيونات والمواد من خلال أغشيتها، إلى جانب المحافظة على خصائص الغشاء والشكل السوي الكرية. ويجري استقلاب الغلوكوز في الكرية الحمراء وتحرير طاقته وفق المسالك الثلاثة التالية:

1- مسلك امبدن-ميرهوف Embden-Meyrehof، ويجري وفق هذا المسلك

تحطم الغلوكوز إلى حمض اللبن عبر سلسلة من التفاعلات اللاهوائية التي يتوسطها نحو 12 أنزيم توجد جميعاً في السيتوبلازما (الشكل 23-2). وينتج عن هذا المسلك

4 جزيئات ATP يستهلك منها أثنان في التفاعلات 1 و 3، إضافة إلى جزيئين

NADH₂ يتشكلان في التفاعل (6). وتستخدم جزيئات ATP في تأمين الطاقة


اللازمة لعمل مضخة الصوديوم-البوتاسيوم، وتبادل الشحوم الغشائية مع المصورة

، إضافة لدورها في المحافظة على لدونة الغشاء والشكل القرصي للكرية. أما جزيئات

NADH₂ فتعد ثمماً رئيساً لأنزيم الميتهيموغلوبين

ريدوكتاز Methemoglobin reductas، التي تتوسط إرجاع الهيموغلوبين

المؤكسد بتحويل الحديد الثلاثي إلى ثنائي القيمة الاتحادية كما هو موضح في الشكل .



الشكل 2-23: مسارات استقلاب الغلوكوز في الكريات الحمر

2-مسلك الأكسدة **Oxidative pathway** أو حلقة الهكسوز أحادي الفوسفات **Hexose monophosphate shunt**. ويعرف هذا المسلك أيضا بحلقة السكاكر الخماسية أو مسلك البنتوزفسفات أو مسلك **Warberg Dicken**. ويتم وفق هذا المسلك تحطيم نحو 10% من الغلوكوز وتحويله إلى حمض اللبن وثاني أكسيد الكربون. وكما هو موضح في الشكل تكون نقطة الانطلاق في هذا المسلك أكسدة الغلوكوز -6-فسفات وتحويله إلى 6-فوسفوغاوكونات بتوسط أنزيم

الغلوكوز -6-فسفات ديهيدروجيناز. ويتعرض المركب الناتج لعملية نزع كربوكسيل تأكسدي ويتحول إلى ريبولوز-5-فسفات بتوسط أنزيم 6-فوسفوجلوكونات ديهيدروجيناز. ونجم عن هذين التفاعلين تشكل $NADPH_2$ الذي يعد ثميما رئيسا لأنزيم الغلوتاتيون ريدوكتاز $Glutathion\ reductase$. وتعمل الأنزيم الأخيرة على ارجاع الزمر السفهيدريل (SH) في الغلوتاتيون الذي يرجع بدوره الهيموغلوبين المؤكسد (الميتهموغلوبين) ، ويحوّله إلى هيموغلوبين ثنائي القيمة الاتحادية . ويجري التفاعل الأخير بتوسط أنزيم الغلوتاتيون بيروكسيداز، والتي تتوسط أيضا الدور المهم للغلوتاتيون في تخليص الكريات من الحموض الدسمة المؤكسدة (البيروكسيدات) والناجمة عن تراكم الجذور الحرة ، والتي تؤدي إلى تأكسد الغلوبين وتشكل أجسام هيتز $Heinz$. أما الريبولوز-5-فسفات فيدخل مجددا مسلك اميدن -ميرهوف عن طريق تحوله إلى فركتوز -6-فسفات أو/و غليسرالدهيد-3-فسفات (الشكل 23-2).

3- مسلك Luebering-Rapaportk ويجري وفق هذا المسلك تشكل مركب 2،3-ثنائي فسفو غليسرات ($2,3DPG$) انطلاقا من 1،3-ثنائي فوسفو غليسرات وبتوسط انزيم المواتاز $Mutase$. ويملك هذا المركب أهمية كبيرة في تنظيم ألفة الهيموغلوبين للأكسجين كما أشرنا أعلاه. ويمكن لهذا المركب أن يدخل مجددا في مسلك اميدن -ميرهوف بتحوّله إلى 3-فوسفو غليسرات بتوسط أنزيم الفسفاتاز $Phosphatase$ (الشكل 23-2).

خامسا: الخواص الحلولية للكريات الحمر.

يقارب الضغط الحلولي للكريات الحمر الضغط الحلولي للمصورة الدموية . فهي تمتلك ضغطا غروانيا مرتفعا مرتبطا بمحتواها من البروتينات مقارنة بمثيله في المصورة الدموية . وتجري معادلة هذا الضغط مع الضغط الحلولي للمصورة بالحفاظ على تركيز منخفض لأيونات الصوديوم داخل الكرية. وتتولى هذه العملية مضخة الصوديوم التي تعمل على إزاحة أيونات الصوديوم التي تدخل الكرية بظاهرة الانتشار بالتبادل مع أيونات

البوتاسيوم. ويؤدي تثبيط عمل هذه المضخة إلى ارتفاع تركيز هذه الأيونات داخل الكرية وتوقف عملية التعويض عن الضغط الحلوي المرتفع للبروتينات ، الأمر الذي يسبب عبور الماء وانتاج الكرية ومن ثم تخرب الغشاء، وهو ما يعرف بالانحلال الدموي الحلوي (الحلوي - الغرواني).

ويعادل الضغط الحلوي للمصورة الدموية الضغط الحلوي لمحلول كلور الصوديوم بتركيز 0.9% ويدعى هذا المحلول أسوي التوتر ، تحافظ فيه الكريات الحمر على شكلها وحجمها الطبيعي. ولدى وضع الكريات في محلول منخفض التوتر فلها تبدأ بالانتاج نتيجة لدخول الماء، ومن ثم تخرب الغشاء وتحرر الهيموغلوبين. ويمكن دراسة مقاومة الكريات للانحلال من خلال وضع الدم في محاليل منخفضة التوتر ، ففي الحالة السوية ينحل 50 % من الكريات في محلول كلور الصوديوم بتركيز 0.43% . ويلاحظ تغير المقاومة الحلوية للكريات الحمر في العديد من أمراض فقر الدم. ويمكن أن يحصل الانحلال الدموي في محاليل أسوية التوتر للمواد النفوذة عبر أغشية الكريات مثل البولة. أما الانحلال الكيميائي فيحصل نتيجة تأثير المواد الحالة للشحوم في غشاء الكرية مثل المنظفات والأثير والكلوروفورم ، فيما يحصل الانحلال البيولوجي في حالات نقل الدم غير الموافق.

سادسا: عمر الكريات الحمر

يبلغ عمر الكرية الحمراء لدى الأشخاص البالغين والأصحاء نحو 100-120 يوما، وهو الزمن الذي ينقضي منذ مغادرتها النقي حتى اختفائها من الدوران وتخربها في النسيج الشبكي لكل من الكبد والطحال. ويقدر معدل تخرب الكريات يوميا بنحو 0.8% من مجمل عددها الكلي في الدوران، أي ما يقارب 160 مليون كرية في الدقيقة الواحدة، وهو ما يعرف بالانحلال الفيزيولوجي للكريات الحمر. ويهدف المحافظة على ثبات التركيز العددي للكريات في الدوران يتم إنتاج الكريات بنفس معدل تخربها، الأمر الذي يعني تحديد العدد الكلي للكريات كل ثلاثة إلى أربعة اشهر.

ويعود تخرب الكريات إلى هرمها المتروقي بسبب عوز وانخفاض فعالية الأنزيمات المشاركة في استقلاب الغلوكوز ونقص أمداها بالطاقة (التمثلة بجزيئات ATP, NADH₂, NADPH₂) اللازمة لاستمرار حياتها والتغلب على الأخطار التي تتهددها . وترافق هذه الحداثيات بتغيرات حيوية تشمل ارتفاع تركيز أيونات الصوديوم وانخفاض تركيز أيونات البوتاسيوم ونقص الشحوم ، إلى جانب تغيرات كيميائية حيوية تطرأ على غشاء الكرية ، وتُجعل بروتيناته تمتلك خصائص مولدة للضد يتم التعرف عليها من قبل أضداد نوعية خاصة تسبب انحلالاً مناعياً للكريات .


ويمكن قياس عمر الكريات الحمر والتعرف على أماكن تخربها بعد وسمها بالكروم المشع . وتتلخص هذه الطريقة بحضن حجم معين من الدم مع محلول أملاح الكروم المشع (59) في درجة حرارة 37م ، ومن ثم إعادة الدوران عن طريق الحقن بالوريد ومن ثم مراقبة الفعالية الإشعاعية يومياً باستخدام أجهزة خاصة . ويتم التعرف على مكان تخرب الكريات في الكبد والطحال من خلال قياس كمية الإشعاع من سطح الجسم . أما قياس عمر الكرية فيتم بمقارنة مقدار الإشعاع في عينات الدم المأخوذة يومياً مع كمية الإشعاع المتبقية في الدوران . ويمكن تقدير الزمن اللازم لتخرب نصف العدد الكلي للكريات ، وهو ما يعرف بالعمر النصفى للكريات الحمر ، من خلال قياس الزمن الذي يوافق انخفاض نسبة الإشعاع بمقدار 50٪ من قيمته المقاسة في عينة الدم اليومية . ويبلغ العمر النصفى للكريات الحمر نحو 25-35 يوماً ، ويعد انخفاضه إلى ما دون 20 يوماً مؤشراً هاماً لفقر الدم الانحلالي .



الفصل الثالث

الأشكال غير السوية للكريات الحمر

يبلغ قطر الكرية الحمراء في الحالة السوية 7،2 ميكرون وحجمها 83 ميكرومتر مكعب . وتبدو الكرية الحمراء لدى فحص لطاخة دموية ملونة ،دائرية الشكل مع شيء من عدم الانتظام ،يتلون محيطها بالقرنفلي العاتم ومركزها بالوردي الشاحب (الشكل 24-2) .



الشكل 24-2: الكريات الحمر السوية


ويلاحظ تغير شكل الكرية في الكثير من الحالات المرضية، إما بسبب اضطراب في تكون الدم أو نقص في اصطناع الهيموغلوبين، أو تخرب الكريات، أو محاولة النقي زيادة إنتاجه لتعويض فقر الدم. ولذلك يعد فحص لطاخة دموية ملونة ،مملون رايت أو ملون غيمزا من الاختبارات الهامة التي تفيد في تشخيص العديد من الفاقات الدموية. وتشمل الأشكال غير السوية للكريات الحمر التغيرات في قد الكرية وتلوها وشكلها إلى جانب ظهور بعض المتضمنات فيها.

أولا: تغيرات قد الكرية: وتشمل الأشكال التالية:

1- الكريات الصغيرة Microcytes: تبدو الكريات بحجم صغير لا يزيد قطرها


عن 5 ميكرون (الشكل 25-2) ، وتشاهد في فقر الدم بعوز الحديد وفاقات

الدم المرتبطة بتشكيل هيموغلوبينات شاذة مثل التلاسييميا.




الشكل 25-2: الكريات الصغيرة

2-الكريات الكبيرة Macrocytes: تبدو الكريات كبيرة الحجم وبقطر يبلغ نحو 9-10 ميكرون (الشكل 26-2)، وتشاهد في فقر الدم بعوز الفيتامين B12 (فقر الدم ضخيم الأرومات وفقر الدم الوبيل) وفقر الدم بعوز حمض الفوليك، إلى جانب بعض أمراض الكبد المزمنة وبعض أمراض الدم الانحلالية.



الشكل 26-2: الكريات الكبيرة


3-تفاوت حجم الكريات Anisocytosis: وهي صفة غير نوعية يبدو فيها قسم من الكريات بحجم صغير (كريات صغيرة)، وقسم آخر بحجم كبير (كريات كبيرة)، إلى جانب كريات سوية الحجم (الشكل 27-2).



الشكل 28-2: تفاوت حجم الكريات



ثانياً: تغيرات اللون. وتشمل الأشكال التالية:

1- نقص الصباغ Hypochromia: تبدو الكرية بشحوب مركزي قطره يفوق ثلث قطر الكرية نتيجة لنقص تركيز الهيموغلوبين أو اضطراب اصطناعه في الخلية (الشكل 29-2). ويشاهد نقص الصباغ في فقر الدم بعوز الحديد (كريات صغيرة الحجم ناقصة الصباغ) وفي التلاسيميا (نتيجة خلل اصطناع الغلوبين)، إلى جانب بعض الإصابات الجرثومية.



الشكل 29-2: كريات ناقصة الصباغ


2- فرط الصباغ Hyperchromia: تبدو الكرية شديدة الصبغة بشحوب مركزي قطره أقل من ثلث قطر الكرية وقد يزول الشحوب المركزي فتبدو الكرية وكأنها ممتلئة بالخصاب (الشكل 30-2). وتشاهد هذه الكريات في تكور الكريات الوراثي وفقر الدم المرطل إلى جانب كريات الوليد مفرطة الصبغة.



الشكل 30-2 : كريات مفرطة الصباغ (كروية)

3- تفاوت الصباغ Polychromasia: يعني ظهور كريات متفاوتة اللون بحسب درجة التطور والنضج (الشكل 31-2). وتشاهد في فقر الدم بعوز


الحديد أثناء الاستجابة للعلاج وفي حالات فرط نشاط النقي (كما في التزوف الحادة وتحلل الدم)، وكذلك بعد نقل كمية من الدم إلى شخص مصاب بققر دم ناقص الصباغ.



الشكل 31-2-: تفاوت الصباغ

ثالثا: تغيرات الشكل، وتتضمن الأشكال التالية:

1- الكريات الشائكة Acanthocytes، وهي كريات منكشحة تصدر منها بروزات شائكة مؤنفة (الشكل 32-2)، تشاهد في حالة فقد البروتين الشحمي بيتا من الدم Abetalipoproteinemia، وفي تشمع الكبد المرافق لفقر دم انحلاي، وكذلك فقر الدم الوليدي وفقر الدم المهبازي وإثر استئصال الطحال.



الشكل 32-2: الكريات الشائكة

أما الكريات المشوكة Burr cells فهي كريات حمراء تملك نتوءا شوكيا أو أكثر يخرج من غشاء الكرية (الشكل 33-2). وتشاهد في السرطانات المعوية

والقرحات الهضمية والقصور الكلوي وكذلك في عوز أنزيم البيروفات كيناز وارتفاع تركيز البولة في الدم.




الشكل 33-2: الكريات المشوكة

ومن الكريات الشائكة نذكر أيضا الكريات المفروضة Crenated cells والتي تمتلك استطالات غشائية غير حادة ، ولا تدل على حالة مرضية، بل تظهر في المحاليل مرتفعة التوتر ولدى ارتفاع تركيز البولة في الدم (الشكل 34-2).




الشكل 34-2: الكريات المفروضة

2-الكريات النقطية Blister cells. وتبدو الكرية وقد برز من جسمها فقاعة أو أكثر بشكل مشابه لفقاعات الجلد (الشكل 35-2)، وتشاهد في فقر الدم المنجلي المترافق مع صمات رئوية، وفي فقر الدم الانحلالي الوعائي.




الشكل 35-2: الكريات النقطية

3-الكريات الهدفية Target cells: تتصف الكريات بوجود الهيموغلوبين في مركزها الشاحب على شكل دائرة يحيط بها منطقة خالية من الخضاب بحيث تبدو الكريات وكأنها درية الهدف (الشكل 36-2). وتشاهد هذه الكريات بنسبة ضئيلة في الحالة السوية، إلا أن نسبتها تزداد في فقر الدم الانحلالي وفقر الدم المنجلي والتلاسيميا، وبعض اعتلالات الخضاب الأخرى، وكذلك في عوز الحديد وأمراض الكبد المترافقة مع يرقان أو بدون، إضافة إلى التجفاف والحروق لدى الأطفال وبعد استئصال الطحال.



الشكل 36-2: الكريات الهدفية


4-الكريات الرخيفة Leptocytes: وتشبه الكرية الهدفية من حيث التلون الجيد للكرية في المركز والمحيط، بينما تتميز عن الكريات الهدفية بكون الهيموغلوبين المركزي محاطاً بحلقة شاحبة غير مكتملة (الشكل 37-2). وتشاهد هذه الكريات في فقر الدم بعوز الحديد والتلاسيميا وأمراض الكبد.



الشكل 37-2: الكريات الرخيفة


5-الكريات الفموية Stomatocytes: تتصف الكرية بوجود شق في مركزها يشبه الثغر (الشكل 38-2). وتشاهد في كثرة الفمويات الولادي ولدى الكحوليين، والتلاسيميا الصفري وعوز الغلوتاتيون، ووجود الحمر

الكروية الوراثي والتسمم الرصاصي، وكثرة الوحيدات الخحمجية، إضافة للخبثات وبعض أمراض الكبد.





الشكل 38-2: الكريات القموية

6-الكريات المنجلية Sickle cells: وتبدو الكريات متطاولة وضيقة ذات نهاية مؤنفة تشبه الزورق (الشكل 39-2) وتشاهد في فقر الدم المنجلي.




الشكل 40-2: الكريات المنجلية

7-الكريات الدمعية Teardrop cells: وهي كريات أصغر عادة من الكريات السوية وسميت بالدمعية لكونها تشبه الدمعة (الشكل 41-2). وتشاهد في التلاسيميا بيتا، وفقر الدم المرطل، وتليف النقي، وفقر الدم المزمن.



الشكل 41-2 الكريات الدمعية

8- الكريات البيضوية (Ovalocytes) Elliptocytes: وهي كريات ذات شكل بيضوي أو اهليلجي (الشكل 2-42) . وتشاهد في فقر الدم بفرط الكريات البيضوية الوراثي، وفقر الدم الانحلالي، وفقر الدم المنجلي والتلاسيميا، واعتلال الهيموغلوبين C وفقر الدم المرتبط بالخبثاء، إلى جانب فقر الدم بعوز الحديد وفقر الدم العرطل.





الشكل 2-42: الكريات البيضوية

9- الكريات المنشقة schizocytes: عبارة عن أشلاء للكريات تأخذ أشكالاً مختلفة (الشكل 2-43) ، وتلاحظ في في فاقات الدم الانحلالية المرتبطة بالحروق والصدمات البديلة وفي حالات رفض الزرع الكلوي.



الشكل 2-43: الكريات المنشقة

أما الكريات المنشقة الخوذية Helmet cells فهي شذف أكبر حجماً للكريات الممزقة والتي تأخذ شكل الخوذة (الشكل 2-44). وهي تتشكل في الطحال وفي الجلطات الوعائية الليفية.



الشكل 44-2: الكريات الخوذية

10- الكريات البكيلة **Poikilocytes** : يطلق مصطلح تبكل الكريات أو عدم انتظام الشكل **Poikilocytosis** على وجود الكريات بأشكال مختلفة كمثرية وإحاصية ومتطاولة ومثلثية ومسننة (الشكل 45-2) . وتشاهد في فقر الدم الانحلالي، وتليف النقي وفقر الدم الوبيل والتلاسييميا .




الشكل 45-2: تبكل الكريات

11- الكريات الغليظة **Pyknocytes**: تبدو الكريات صغيرة منكماشة غير منتظمة وذات صباغ شديد. وتشاهد في فقر الدم الانحلالي الحاد والمزمن وفي عوز أنزيم الغلوكوز -6- فسفات ديهيدروجيناز، وكذلك في انحلال الدم العابر والمجهول الآلية خلال الأسابيع الأولى بعد الولادة، والذي يعرف بكثرة الحمر الغليظة الطفلي.


رابعاً: المتضمنات والأجسام الغريبة: قد تشاهد في الكريات الحمر بعض المتضمنات والأجسام الغريبة، وهي:

1- التنقيط القاعدي Basophilic stippling: وهي عبارة عن بقايا الحمض الريبي النووي RNA تظهر في هيولى الكريات على شكل حبيبات مختلفة الحجم بلون أزرق أو رمادي أوبني (الشكل 46-2) ، وتشاهد في أمراض الدم الناجمة عن شذوذ اصطناع الهيموغلوبين والتسمم بالمعادن الثقيلة، وخاصة التسمم الرصاصي إلى جانب فقر الدم بالأرومات الحديدية.



الشكل 46-2: التنقيط القاعدي


2- أجسام هول-جولي Howel-Jolly: وهي عبارة عن أنقاض نووية تأخذ شكل جسيم وحيد صغير دائري أو جسيمين بلون بنفسجي غامق (الشكل 47-2). وتصادف هذه الأجسام في بعض أمراض الدم الانحلالية ، واستئصال الطحال والداء الزلاقي.



الشكل 47-2: أجسام هول-جولي



3- أجسام هينز Heinz: وهي عبارة عن أجسام يبلغ قدها نحو 0.2-2 ميكرون تتلون بزرقة الكريزل الالامعة (الشكل 48-2)، وتصادف في

أمراض الدم الانحلالية وعوز أنزيم الغلوكوز-6-فسفات
ديهيدروجيناز وكذلك في انحلال الدم المرتبط بتناول الأدوية
مثل Phenacetin وبعض اعتلالات الهيموغلوبين.



الشكل 48-2: أجسام هينز

4- أجسام بابنهايمر Pappenheimer : هي عبارة عن تجمع للجسيمات
الكوندرية والريبوسومات وذرات الحديد في كريات الدم المحيطي والتي يمكن
إظهارها بملون رايت (الشكل 49-2). ويمكن إظهار الحبيبات الحديدية
Siderotic granules في الكريات الحمر أيضا بملونات الحديد مثل
ملون بروسيان والتي تعد بئى مشاهدة لأجسام بابنهايمر. وتعرف عموما
الكريات التي تحتوي حبيبات الحديد بالكريات الحديدية Siderocyte وتشاهد
في فقر الدم بعوز الحديد، وفقر الدم الانحلالي وإثر استئصال الطحال.



الشكل 49-2: أجسام بابنهايمر (ملون الحديد في الأعلى وملون رايت في الأسفل)

5- حلقة كابوت Cabot rings: وهي عبارة عن بقايا نووية تأخذ شكل


حلقة حمراء اللون أو الرقم 8، وتصادف في فقر الدم الوبيل والتسمم الرصاصي.

6- الكريات الحمر المنواة (الأرومات السوية Normoblast): وهي

كريات مدورة غير منتظمة يبلغ قطرها نحو 8-10، مكرون وتتضمن نواة صغيرة

بنفسجية قائمة غالباً ما تكون بعيدة عن مركز الهيولى وردية اللون (الشكل 50-2)


، وتُشاهد هذه الكريات في الأنواع الشديدة من فقر الدم الانحلالي، وفي التليف
الدموي الشديد وفرط نشاط النقي المرضي.



الشكل 50-2: الكرية الحمراء المنواة


9- الطفيليات: تُشاهد في كريات الدم المحيطي بعض الطفيليات التي تسبب انحلال دم

شديد مثل البلاسموديوم المسبب لداء الملاريا (الشكل 51-2)



الشكل 51-2: الملاريا المسببة بالبلاسموديوم فيفاكس

ويمكن للكريات الحمر أن ترتص بشكل نضائد (الشكل 52-2) كما هو الحال في النقيوم المتعدد أو بشكل غير منتظم لدى وجود أضاد في المصورة الدموية.



الشكل 52-2: تشكل النضائد

خامسا: المناسب الدموية

يفيد تحديد تركيز الهيموغلوبين والهيماتوكريت إضافة إلى التركيز العددي للكريات الحمر في حساب ثلاثة مناسب مهمة في دراسة مختلف أمراض فقر الدم وتفريقا وهي:

- 1- تركيز خضاب الكرية الوسطي M.C.H.C. : ويحسب بتقسيم تركيز الهيموغلوبين مقدرا ب غ/ل على الهيماتوكريت ، ويمثل المقدار الوسطي من الهيموغلوبين الذي تحتويه الكريات مقدرا ب غ/ل. ويبلغ الحد الأدنى لخضاب الكرية الوسطي 322 غ/ل والحد الأعلى 370 غ/ل وتدعى الكريات في هذه الحال بسوية الصباغ . وتدعى الكريات بناقصة الصباغ إذا انخفض هذا الرقم عن الحد الأدنى مثلما هو الحال في فقر الدم ناقص الصباغ، فيما تدعى الكريات بمفرطة الصباغ (أكثر تلونا من الطبيعي) إذا تجاوز هذا النسب الحد الأعلى كما هو الحال في كثرة الحمر الوراثية.
- 2- متوسط محتوي الهيموغلوبين في الكرية M.C.H. : ويمثل هذا النسب متوسط كمية الهيموغلوبين في الكرية الواحدة ، ويحسب بتقسيم كمية الهيموغلوبين في حجم محدد من الدم على عدد الكريات في نفس الحجم. وتدعى الكريات بسوية الصباغ إذا تراوحت قيمة النسب بين 26 و 36 بيكوغرام، فيما تدعى بناقصة الصباغ لدى انخفاض القيمة عن الحد الأدنى كما هو الحال في فقر الدم بعوز الحديد وبمفرطة الصباغ لدى تجاوز النسب الحد الأعلى كما هو الحال في فقر الدم الحبيث.

3-حجم الكرية الوسطي .M.C.V : يحسب هذا النسب بتقسيم الهيماتوكريت على عدد الكريات الحمر، وتتراوح قيمته في الحالة السوية بين 76 و 96 مكرومتر مكعب، وينخفض حجم الكرية الوسطي عن الحد الأدنى في فقر الدم صغير الكريات، فيما يفوق الحد الأعلى في فقر الدم كبير الكريات .



الباب الثالث

فقر الدم

الفصل الأول

أسباب فقر الدم وتصنيفه وأعراضه

يعرف انخفاض هيموغلوبين الدم إلى مادون مستوياته السوية بالنسبة للعمر نفسه والجنس نفسه بفقر الدم *Anemia*، ويشير هذا المصطلح إلى نقص إمداد النسيج بالأكسجين الذي يحدد عمليا بانخفاض تركيز الهيموغلوبين إلى مادون 12 غ/100 مل لدى الإناث، وأقل من 13 غ/100 مل لدى الذكور، وأقل من 14 غ/100 مل لدى الوليد.

أولاً: أسباب فقر الدم

يمكن إجمال أسباب فقر الدم في ثلاث مجموعات رئيسية:

- 1- فقد الدم: ينتج فقر الدم في هذه الحالة عن نقص الكريات الحمر إما بسبب النزوف الحادة كما في حوادث السير أو بسبب النزوف المزمنة، كما في النزوف الهضمية المرافقة للبواسير والقرحات، أو الإصابة بالديدان المعوية.
- 2- نقص إنتاج الكريات الحمر: يحدث تناقص إنتاج الكريات الحمر في نقى العظم نتيجة للأسباب التالية:

- أ- عوز بعض المركبات والعناصر الغذائية الضرورية لإنتاج الكريات الحمر وهي الحديد والفيتامين B12، والفيتامين C وحمض الفوليك والبروتينات.
- ب- فقر الدم اللاتنسجي: ويحدث تناقص إنتاج الكريات الحمر بسبب الخلل الولادي أو المكتسب، الذي يصيب الخلايا الجذعية وسلاسلها المولدة للدم في النقي.

ت- ارتشاح النقي: ويحصل تناقص إنتاج الكريات الحمر نتيجة لاحتياج الخلايا السرطانية للحيز الذي يشغله نقي العظم كما في الانتقالات السرطانية وايضاض الدم وورم النقي (النقيوم) والليمفومات. أو نتيجة لشغل هذا الحيز من قبل أنسجة ليفية كما في التصلب النقوي.

ث- فقر الدم العرضي: ويحدث نقص إنتاج الكريات بسبب القصور الكلوي، أو قصور الدرق أو قصور النخامة، إضافة لأمراض الكبد المزمنة وأمراض الغراء (الدبة الحممية)، وكذلك نتيجة الإصابة بالأمراض الخبيثة.

3- المحال (تخرب) الكريات: ويحدث فقر الدم نتيجة التخرب الزائد للكريات الحمر والعائد للأسباب التالية:

أ- خلل في تركيب الكريات الحمر: ويحدث تخرب الكريات نتيجة خطأ في تركيب الكرية، غالباً ما يكون وراثي المنشأ كما هو الحال في نقص أو عوز الأنزيمات وبخاصة الغلوكوز-6-فسفات ديهيدروجيناز، واعتلالات الهيموغلوبين (التلاسيميا وفقر الدم المنجلي وغيرها)، وتكون غشاء غير سوي للكريات (تكور الكريات الوراثي).

ب- أسباب لا تتعلق بتركيب الكريات الحمر: ويرتبط انحلال الكريات بمسببات خارج الكريات الحمر غالباً ما تكون مكتسبة المنشأ وتشمل:

- انحلال الكريات الحمر لأسباب مناعية مثل الانحلال المناعي الذاتي (الأضداد الحارة والباردة)، والانحلال المناعي الدوائي (البنسلين، الكلوروبرومازين، الفلاميتيل، دوبا، ايزونيازيد، الكوينين، بارامينو ساليسيليك)، والانحلال بعدم توافق الزمر الدموية.
- انحلال الدم لأسباب فيزيائية: كما هو في داء الأوعية الدقيقة والدمامات القلبية الاصطناعية، و البيلة الدموية للمسير الطويل والإشعاعات والحروق.

- فرط نشاط الطحال: يحدث انحلال الدم في معظم الحالات المرضية المرافقة لتضخم الطحال، والذي يترافق بنقص الكريات البيض والصفائح إلى جانب الكريات الحمر.
- الأحماج: يحدث فقر الدم بسبب التأثير الحال للذيفانات الجرثومية مثل التيفوئيد والتهاب السحايا بالمستديمة النزلية، وتجرثم الدم أو تطور العامل الممرض ضمن الكريات الحمر مثل الملاريا.
- انحلال الدم لأسباب كلوية: ويحصل انحلال الدم نتيجة القصور الكلوي المزمن ومتلازمة الانحلال اليوريميائي في الأطفال، وارتفاع الضغط الخبيث لدى البالغين وفرفرة قلة الصفائح.
- الأورام والأمراض الجهازية: كما في اللمفوم الخبيث وبعض أورام المبيض والتهاب القولون التقرحي، وبعض أمراض الغراء وفقر الدم الخبيث.
- السموم: ويحدث الانحلال بسبب لدغات بعض أنواع العقارب والأفاعي والنحل بسبب احتواء السموم على أنزيمات الفسفوليپاز التي تحلل الشحوم في غشاء الكرية الحمراء.

ثانيا: تصنيف فقر الدم

تصنف أمراض فقر الدم بحسب الآلية الفيزيولوجية المرضية إلى مجموعتين رئيسيتين:

- 1- فقر دم محيطي: ويعرف بفقر الدم المعوض حيث ترتفع نسبة الشبكيات في الدم المحيطي، ويشمل فقر الدم الناجم عن فقد الدم (الزوف)، وفقر الدم الانحلالي المرتبط بأسباب داخل الكرية الحمراء، وبمسببات خارج الكرية الحمراء.
- 2- فقر دم مركزي: ويعرف بفقر الدم غير المعوض، ويرتبط بقصور النقي الكمي (أذية الخلايا المولدة لعناصر الدم) والكيفي (تكون خلايا شاذة). ويتصف فقر الدم المركزي بانخفاض الشبكيات في الدم المحيطي، ويضم:

أ- فقر الدم المرتبط بشذوذ تركيب الخضاب، ويشمل عوز الحديد، التلاسيميا، فقر الدم بالأرومات الحديدية، فقر الدم المرافق للأمراض المزمنة.

ب- فقر الدم المرتبط بشذوذ تركيب DNA ويشمل فقر الدم ذو الأرومات الضخمة.

ث- فقر الدم المرتبط بقصور الخلية الجذعية: ويضم فقر الدم اللاتنسجي، ابيضاضات الدم، ارتشاح النقي، تليف النقي، اللمفومات، الورم النقوي المتعدد.

ح- فقر الدم المرتبط بعوز هرموني: ويشمل فقر الدم المرافق للقصور الدرقي، وفقر الدم المرافق للقصور النخامي وقصور مكون الحمر.

خ- فقر الدم المعند: ويضم فقر الدم المعند الولادي وفقر الدم المعند المكتسب.

ويصنف فقر الدم بحسب المشعرات الدموية إلى ثلاث مجموعات رئيسية:

1- فقر دم صغير الكريات: و يترافق عادة مع نقص الصباغ ويشاهد في عوز الحديد والتلاسيميا وفقر الدم الأرومي الحديدي. أما في كثرة الحمر الكروي الوراثي، فيكون فقر الدم صغير الكريات مع فرط الصباغ.

2- فقر الدم سوي الكريات: وتكون الكريات سوية الحجم سوية الصباغ ويصادف بعد الزوف والحمل، وفي انحلال الدم وفقر الدم اللاتنسجي، وتليف النقي وارتشاح النقي وابيضاض الدم، وسوء تكون الحمر السمي والاستقلابي والقصور الكلوي والأمراض الغدية، إلى جانب الأمراض الخبيثة وأمراض الكبد.

3- فقر الدم كبير الكريات: ويشاهد في فقر الدم العرطل (ذو الأرومات العرطلة) بسبب نقص الفيتامين B12 وعوز حمض الفوليك، وفي فقر الدم سوي

الأرومات (الأرومات غير العرطلة) كما في فقر الدم اللاتنسجي وقصور الدرقية وأمراض الكبد والكحولية .

ثالثا: أعراض وعلامات فقر الدم

تنجم أعراض فقر الدم عن نقص إمداد النسيج بالأكسجين بسبب نقص مقدرة الدم على نقل الأكسجين وأثر ذلك على مختلف أجهزة الجسم . وتكون شدة الأعراض على علاقة بمستوى الهيموغلوبين من جهة وسرعة تطور فقر الدم من جهة أخرى

وتشمل الأعراض العصبية لفقر الدم الوهن والصداع والدوار والطنين وعدم المقدرة على التركيز وضعف الذاكرة ، إضافة على الشعور ببرودة الأطراف مع الأحساس بوخز والتنمل والخدر في الأطراف السفلية. أما الأعراض الدورانية فتتمثل بآلام في الصدر وخلف عظم القص أثناء الإرهاق والذي يزول عند الراحة بسبب قلة كمية الأكسجين التي تصل إلى القلب. وينتج عن القصور الوظيفي لعضلة القلب ظهور الوذمات في القدمين مساء مع آلام في عضلات إحدى الساقين (العرج المتقطع) . وغالبا مايشكو المريض من تعب وضعف عام وخفقان . وتتمثل الأعراض الهضمية بفقدان الشهية وصعوبة في البلع أو أحساس بوجود كتلة في البلعوم ، أو حرقة في اللسان بعد تعاطي المشروبات الساخنة وقد يتضخم الكبد ويصبح مؤلما أحيانا. أما الأعراض البولية والتناسلية فتتمثل بعدم مقدرة الكلية على تكثيف البول و البيلة البروتينية (الآحينية) . وقد ينعدم الطمث في فقر الدم الشديد أو يصبح غزيرا ويكون سببا لفقر الدم لاسيما في حالة نقص الصفيحات ويسبب فقر الدم عند الذكور عدم المقدرة على الانتصاب . ونادرا ما يلاحظ اضطرابات في الجهاز التنفسي إلا إذا كان فقر الدم شديدا حيث يزداد تواتر الحركات التنفسية مع احتقان في قاعدي الرئتين نتيجة لقصور القلب.

وتتمثل علامات فقر الدم بشحوب الجلد والأغشية المخاطية ولون الأظافر وتتصبغ
المتحمة والصلبة باللون اليرقاني في انحلال الدم . ويبدو اللسان أملس ناعما وزوايا
الفم مشققة والأظافر معلقة الشكل مقعرة في عوز الحديد الشديد. وقد ترتفع
حرارة المريض مع آلام في اللسان تتناوب مع فترات خالية من الألم لدى نقص
الفيامين B12. وفي الحالات المتقدمة يترافق ذلك باعتلال الأعصاب الطرفية
واضطراب الإحساس والحركة.

ويستطيع المريض التلاؤم مع فقر الدم إذا ما تطور تدريجيا ولا يشكو من الأعراض
إلا حين يكون فقر الدم شديدا. ويهدف التعويض عن نقص الأكسجين والاستفادة
الكاملة من الهيموغلوبين المتبقي، يتحرر الأكسجين من الهيموغلوبين إلى النسيج
بسرعة، و تزداد سرعة دوران الدم في الجسم بسبب زيادة تواتر ضربات القلب
وننتاجه ، و يترافق ذلك بتوسع الأوعية الدموية وارتفاع حرارة الأطراف ، الأمر
الذي يفضي إلى ارتخاء القلب بسبب ازدياد جهد القلب ونقص الأكسجين.

الفصل الثاني

فقر الدم بعوز الحديد Iron deficiency anemia و فقر الدم الأرومي الحديدي Siderblastic Anemia

أولاً: فقر الدم بعوز الحديد

يعد فقر الدم بعوز الحديد من أكثر أنواع فقر الدم انتشاراً وأكثرها مصادفة، وينجم عن النقص المترقي لمخزون الجسم من الحديد المتاح والمرتبط بمسببات متعددة

١- أسباب فقر الدم بعوز الحديد

أ- النزوف المزمنة على أنواعها وأسبابها المتعددة: وتشمل النزوف الهضمية المرتبطة بالقرحات النازفة المعدية والعفجية أو ورم خبيث أو وجود حليمات نازفة، أو التهاب الكولون، أو دوالي المري أو فتق الحجاب الحاجز أو التهاب معدي نزفي مرتبط بتناول الأسبرين. والنزوف الرحمية الشديدة وغزارة الطمث لدى الإناث، وكذلك نتيجة لنزوف الجهاز البولي مع بيلة دموية، أو بيلة انحلالية حضائية، إضافة للنزوف الناجمة عن الإصابة بالديدان مثل البلهارسيا.

ب- سوء الامتصاص متعدد الأسباب: ويشمل سوء الامتصاص لأسباب معدية، وعلى رأسها اللاكلورية والتهاب المعدة الضموري واستئصال المعدة، وسوء الامتصاص المعوي كما في الداء الزلاقي.

ت- زيادة الطلب على الحديد نقص الوارد الغذائي: يعد نقص الحديد أمراً شائعاً لدى الأطفال وخاصة المتأخرين في الفطام (بسبب افتقار الحليب لعنصر الحديد)، وفي سن البلوغ وكذلك في سن الطمث والحمل لدى الإناث

حيث تزداد متطلبات الجسم للحديد لتعويض ما تفقدها الأم من الحديد لتغطية حاجات الجنين والمشيمة والثرث أثناء الولادة. ويرتبط نقص الحديد في جميع هذه الحالات بعدم تناول كمية كافية من الأغذية الغنية بالحديد.

ث- انحلال الدم داخل الأوعية وما يرافقه من ضياع للحديد على شكل بيلة هيموغلوبينية أو بيلة هيموسيدرينية كما في البيلة الهيموغلوبينية الإنتنايية الليلية وصمامات القلب البديلة أو التهاب الأوعية الرئوية التي تسبب تمزق الكريات بسبب خشونة سطحها.


2- أعراض فقر الدم بعوز الحديد

يتطور فقر الدم بشكل خفي ومترقى خلال عدة شهور وأحيانا سنوات وتختلف الأعراض السريرية حسب شدة فقر الدم وسرعة حدوثه. ففي فقر الدم الحاد والشديد تبدو على المريض علامات فقر الدم كافة بشكل عام، وهي الشحوب وسرعة التعب والدوار والصداع والطنين ونقص القدرة على التركيز إلخ، إلى جانب الأعراض والعلامات الخاصة بفقر الدم بعوز الحديد، والتي تتجلى بالتهاب اللسان وضمور حلیماته وتشقق زوايا الفم والأظافر المعلاقية ذات التشققات الطولية وجفاف الشعر وسقوطه. وقد يصاب المريض بعسر البلع مع ظهور غشاء غير حقيقي وبخاصة لدى الإناث فيما بين سن الأربعين والسبعين، وهذا ما يعرف بمتلازمة بلمر فنسون Plummer Vinson. وقد تشكو الإناث من حكة فرجية شديدة، وقد يرافق المرض ضخامة طحالية وأحيانا الوحم وخاصة لدى الأطفال حيث يأكل المريض موادا كالتراب أو الفحم وغير ذلك.

3- الموجدات المخبرية

أ- تبدو الكريات الحمر في اللطاخة الدموية المحيطية في البداية سوية الشكل ناقصة الصبغة ثم تصبح صغيرة ناقصة الصبغة (الشكل 1-3)، وتظهر في اللطاخة كريات هدفية وكريات قلمية Pencil cells، تأخذ شكل الأجاص

ويكون عدد الكريات البيض في الحدود السوية مع ازدياد عدد فصوص نوى الكريات البيض وصغر حجمها في بعض الحالات، فيما يلاحظ ازدياد عدد الكريات البيض والصفائح في حالة النزف المسبب لنقص الحديد . أما الشبكيات فيبقى عددها ضمن الحدود السوية مع انخفاض في بعض الحالات.



الشكل 1-3: فقر الدم بعوز الحديد

ب- يتناقص هيموغليين الدم، وقد يصل إلى 3 غ/ل، وتنخفض المناسب الدموية المتمثلة بحجم الكرية الوسطي وهيموغلوبين الكرية الوسطي ونسبة تركيز الهيموغلوبين في الكرية.

ت- ينخفض حديد المصل إلى نحو 10-30 ميكروغرام/100 مل (السوي 70-180 ميكروغرام/100 مل)، وترتفع السعة الكلية لرابطة للحديد إلى نحو 360-450 ميكروغرام/100 مل (السوي 300-360 ميكروغرام/100 مل) ويتناقص محتوى الفيريتين في المصل إلى مادون 70 ميكروغرام/ل عند الذكور، ومادون 35 ميكروغرام/ل عند الإناث.

ث- يدي فحص لطاخة النقي غياب الحديد من خلايا النقي وخلايا السلسلة الحمراء المتطورة، وفرد نشاط السلسلة المولدة للحمر مع غياب ذرات الحديد (الهيموسيدرين) بعد تلويها بملون بيرل.

ج- يسبب عوز الحديد المزمن لدى الأطفال تغيرات شعاعية شبيهة بالتلاسيما وسحنة شبيهة بالمنغولية ، كما يمكن إظهار الغشاء خلف الحلقي بالتصوير الشعاعي بعد إعطاء لقمة بارتينية، و يمكن إظهار التهاب المعدة الضموري وتسطح غشاءها بعد الوجبة البارتينية.

4- تحري أسباب فقر الدم بعوز الحديد

إذا كان من السهل تشخيص فقر الدم بعوز الحديد، فإن الصعوبة تكمن في معرفة سبب المرض والذي يعتمد على تحري القصة السريرية للمريض، ونتائج الفحص الشعاعي والتشخيص التفريقي. وتتضمن القصة السريرية مسائلة المريض عما إذا كان يتناول أدوية الساليسيلات، ومعرفة فيما إذا كان يقطن في منطقة موبوءة بالطفيليات مثل البلهارسيا والملقوات . ومعرفة فيما إذا كان المريض مصابا بالبواسير أو الحليمات النازفة أو إذا كان دم الحيض غزيرا، أو كان هناك نزيف رحمي بعد انقطاع الحيض بعد سن اليأس . ويجب تحري وجود تقرحات في المري أو قرحة معدية أو عفجية أو ورم خبيث في الجهاز الهضمي. ويجب التحري عن الدم الخفي في البراز وتنظير القسم الأخير من الأمعاء. ويفيد الفحص الشعاعي في تحري أماكن الترف في القناة الهضمية. ونظرا لتشابه الصورة الدموية مع التلاسيما أو فقر الدم الأرومي الحديدي أو فقد الترانسفيرين الولادي، فإن فحص حديد المصل والسعة الإجمالية الرابطة للحديد ومخزون النقي من الحديد ومعايرة الترانسفيرين قد تساعد في التشخيص الصحيح.

5- العلاج

يعتمد العلاج على معرفة السبب وعلاجه مثل إيقاف تناول الساليسيلات أو التدخل الجراحي لاستئصال القرحة الهضمية أو الورم الخبيث من جهة ، والمعالجة الدوائية

لتعويض النقص والمخزون من جهة أخرى. وتعتمد المعالجة على تعويض الحديد المفقود بإعطاء أملاح الحديد عن طريق الفم مثل أقراص Ferrous sulphate ، ويمكن إعطاء الحديد عن طريق العضل مثل مركب Iron dextran ، أو وريديا مثل مركب Iron dextrin مع الانتباه إلى المضاعفات التي يمكن أن تحدث نتيجة تراكم الحديد. ويعتمد في مراقبة مدى فعالية المعالجة على تعداد الشبكيات الذي يرتفع بعد أسبوع من بدء المعالجة ، وعلى قياس تركيز الهيموغلوبين الذي يجب أن يزداد بعد ثلاثة أسابيع بمقدار 2 غ/100 على الأقل.

ثانيا: فقر الدم الأرومي الحديدي Sidrblastic Anemia

يتميز فقر الدم الأرومي الحديدي بوجود كريات حمراء ناقصة الصباغ إلى جانب الكريات السوية في الدم المحيطي، وكذلك وجود الأرومات الحديدية المرضية التي تحتوي على كميات زائدة من الحديد في النقي. وتشمل الفيزيولوجيا المرضية لفقر الدم الأرومي الحديدي في خلل اصطناع الهيم، وفشل اتحاده مع الحديد الذي يساء استخدامه، مما يؤدي إلى ترسب الحديد في أرومات الكريات الحمر ضمن النقي وتشكل الأرومات الحديدية المرضية التي تتصف بتجمع ذرات الفيريتين ضمن الجسيمات الكوندرية وحول النواة بشكل حلقة. ولا تستطيع الكريات الحديدية أن تنتج كمية كافية من الهيموغلوبين لتركم الحديد فيها ، وهي إما أن تموت في النقي أو تتطور إلى كرية ناقصة الصباغ ، ويزداد امتصاص الحديد ويرتفع حديد المصل والحديد المدخر بسبب تكون الكريات الحمر غير الفعال.

1- الأسباب


أ- انسمام النقي : ويشمل الانسمام الرصاصي وماينجم عنه من تثبيط للإنزيمات التي تتوسط اصطناع الهيم وكذلك الانسمام بالأدوية، وخاصة تلك التي تثبط عمل الفيتامين B6 ، مثل Isoniazide ، إضافة إلى الانسمام الكحولي.

ب- فقر الدم الأرومي الحديدي الولادي، وهو مرض عائلي يصيب الذكور وينتقل بوساطة الإناث ، وينجم عن نقص أو عدم فعالية أنزيم فوسفاتاز البيريدوكسال ،التي تتوسط اصطناع حمض دلتا أمينو ليفولينيك . ولذلك فإن هذا المرض يستجيب للعلاج بالفيتامين B6. أما فقر الدم الأرومي الحديدي الوراثي فينتقل بنفس الطريقة ،ولا يستجيب للعلاج بالفيتامين B6.

ت- فقر الدم الأرومي الحديدي المكتسب أو الثانوي ، ويحدث في الأعمار المتوسطة والمتأخرة والذي يتلو أو يرافق العديد من الأمراض مثل تليف النقي ،وابيضاض الدم النقوي المزمن، ونقص نشاط الدرق ومتلازمات سوء الامتصاص والتهاب المفاصل الرثياني.

2-الموجودات المخبرية

- انخفاض هيموغلوبين الدم مع ارتفاع حيد المصل، وارتفاع محتوى الفيريتين
- تبدي اللطاخة الدموية كريات حمر صغيرة الحجم ناقصة الصباغ ،أو كريات ناقصة الصباغ إلى جانب الكريات سوية الصباغ مع وجود كريات كبرية ودمعية ومنشقة (الشكل 2-3)



الشكل 2-3: فقر م أرومي حديدي

- تبدي لطاخة النقي الملونة بملون بيرل وجود نسبة مرتفعة من الأرومات الحديدية المرضية التي تتميز بوجود الفيريتين على شكل حلقة أو تاج حول النواة. وتعتمد المعالجة على تشخيص السبب وإزالته (الرصاص ، الكحول ، الأدوية)، ويمكن أن يعطى الفيتامين B6 بكميات كبيرة (100-200ملغ/يوم)، وكذلك طارحات الحديد لمنع تراكم الحديد في الجسم.





الفصل الثالث

ثالثاً: فقر الدم كبير (ضخم) الكريات

Macrocytic(Megalocytic) Anemia

يتصف فقر الدم كبير الكريات بوجود كريات حمر كيرية في الدم المحيطي، ويقسم إلى مجموعتين : فقر الدم ضخم الأرومات Megaloblastic Anemia، وفقر الدم سوي الأرومات Normoblastic Anemia.

أولاً: فقر الدم ضخم الأرومات

يتميز فقر الدم ضخم الأرومات بتغيرات وصفية في طلائع الكريات الحمر تنتج عن التطور غير السوي للأرومات الحمر في نقي العظم. ويرتبط تكون الأرومات الضخمة بخلل تركيب واستقلاب DNA المسبب بعوز الفيتامين B12 أو عوز حمض الفوليك الضروريان لتركيب DNA وأثر ذلك في عمليتي الانقسام والنضج الخلوي. ويتجلى خلل تركيب DNA في تأخر نضج نواة الأرومة الحمراء وتباطؤ الانقسام الخلوي في حين يكون تطور الهيولى طبيعياً، الأمر الذي يفضي إلى تبدلات شكلية في الأرومات التي تعرف بالأرومات الضخمة أو العرطلة. وتتصف الأرومات العرطلة بكبر حجم الخلية وبنواة فتية غير ناضجة تحتوي كروماتين غير متكتل على شكل خيوط مبعثرة، فيما يكون تطور الهيولى وتشكل الهيموغلوبين سوياً.

1- تطور الكريات الضخمة

يمر بتطور الأرومة الحمراء غير السوية أو العرطلة إلى كريات ضخمة في الدم المحيطي بالمراحل التالية:

- أ- سليفة الأرومة العرطلة Promegaloblast: يبلغ قطر الخلية نحو 19-28 ميكروناً، وتحتوي على نواة ذات كروماتين ناعم أقل كثافة مما هو

عليه في سليفة الأرومة السوية وتتضمن نحو 3-5 نويات. أما الهيبولى فتكون بلون أزرق وهي أغزر مما هي عليه في سليفة الأرومة السوية.

ب- ب- الأرومة العرطلة الأساسية Basophilic megaloblast :
يبلغ قطر الخلية نحو 17-24 ميكرونا وتتلون الهيبولى بالأزرق الغامق ولا تحتوى النواة على نويات وهي ذات كروماتين ناعم وأقل كثافة من الأرومة السوية الأساسية.

ت- الأرومة العرطلة متعددة الألوان Polychromatophilic megaloblast : وهي خلية بقطر يبلغ نحو 15-20 ميكرونا تتميز عن الأرومة السوية المتوسطة باحتمال وجود أجسام هول-جولي في الهيبولى ويكون كروماتين النواة أقل كثافة.

ث- الأرومة العرطلة سوية اللون Orthochromic megaloblast :
يبلغ قطر الخلية نحو 10-15 ميكرونا، وتتميز عن الأرومة السوية الحامضية بهيبولى وردية اللون أكثر غزارة وكروماتين النواة الأقل تكتلاً.

ج- الشبكية Reticulocyte : وهي تماثل شبكية السلسلة السوية إلا أنها أكبر حجماً.

ح- الكرية الحمراء العرطلة أو الكبيرة Macrocyte : يبلغ قطر الكرية نحو 9-12 ميكرونا ويمكن أن تأخذ شكلاً بيضوياً في اللطاخة الدموية.

2- فقر الدم ضخيم الأرومات المسبب بعوز الفيتامين B12

ينتج فقر الدم ضخيم الأرومات بسبب نقص (عوز) الفيتامين B12 الضروري لتطور أرومات الحمر السوي في نقي العظم.

3- استقلاب الفيتامين B12

الفييتامين B12 عبارة عن نواة رباعية البيرول تتوسطها ذرة الكوبالت، و يلعب دور تميم أنزيمي في اصطناع DNA . ويوجد الفييتامين B12 في الغذاء البيروتيبي الحيواني ، كاللحوم والكبد والسمك .

يتحرر الفييتامين B12 من البيروتينات الغذائية في المعدة بفعل العصارة الهاضمة الحامضية ثم يتحد مع بروتين سكري تفرزه الخلايا الجدارية يعرف بالعامل الداخلي، وهو ضروري لامتنصاص الفييتامين وحمايته من التخرب. ويتم امتصاص الفييتامين B12 في القسم الأخير من المعى الدقيق (الصائم) بعد ارتباطه بمستقبلات على سطح الخلايا الظهارية خاصة ونوعية بالعامل الداخلي . وينقل الفييتامين B12 في المصورة الدموية إلى مختلف الخلايا وبخاصة خلايا النقي مرتبطا مع بروتين ناقل يصطنع في الكبد ونسج أخرى ويعرف بالترانس كوبالامين transcobalamin 11 . وينقل الكوبالامين داخلي المنشأ (الشكل المدخر) بوساطة بروتين ناقل يصطنع في العدلات أو المحببات ويعرف بالترانس كوبالامين transcobalamin 11 .

تبلغ الحاجة اليومية من الفييتامين B12 نحو 2-3 ميكروغرام وهو يخترن في الكبد بكميات تفوق ذلك بكثير (2-5 ملغ) ويمكن أن تغطي احتياجات الجسم من هذا الفييتامين لمدة 2-5 سنوات بعد الانقطاع التام عن تناوله في الغذاء. أما محتوى الفييتامين في مصل الإنسان السوي فيبلغ نحو 160-925 بيكوغرام . ويلاحظ ارتفاع محتواه في أمراض الكبد والكلبتين وتليف النقي ، فيما ينخفض هذا المحتوى لدى ثلث المرضى المصابين بنقص حمض الفوليك.

4-أسباب عوز الفييتامين B12

يرتبط عوز الفييتامين B12 بالعديد من المسببات أهمها:

أ- سوء امتصاص الفييتامين B12 المرتبط بأسباب معدية: ويرتبط سوء الامتنصاص بغياب العامل الداخلي الضروري لامتنصاص الفييتامين B12 في الأمعاء. ويعرف فقر الدم المرتبط بغياب العامل الداخلي بفقر الدم الخبيث

أو الوبيل Pernicious Anemia، وهو من أمراض المناعة الذاتية التي تتصف بضمور دائم لغشاء مخاطية المعدة وخاصة الخلايا الجدارية، يقضي إلى نقص إفراز العامل الداخلي. ويرتبط فقر الدم الوبيل بوجود أضداد في مصل المرضى موجهة نحو العامل الداخلي وتمنع اتحاده بالعامل الخارجي ومن ثم تعمل على تخريبه وهضمه، وتعرف بالأضداد الحاصرة. ويمكن لنوع آخر من الأضداد إعاقه ارتباط معقد الفيتامين والعامل الداخلي مع مستقبلات الخلايا المعوية ومن ثم عدم امتصاص الفيتامين. ومن أسباب غياب العامل الداخلي نذكر أيضا الاستئصال الكلي أو الجزئي للمعدة، كذلك ظهور الأورام في هذا العضو. أما في حالة نقص العامل الداخلي الولادي (الخلقي) فتكون معدة المرضى سليمة، وتفرز حمض كلور الماء بصورة سوية، إلا أن العصارة لا تحتوي العامل الداخلي.

ب- سوء امتصاص الفيتامين B12 المرتبط بمسببات معوية: وتشمل متلازمات سوء الامتصاص المعوية وعلى رأسها سوء الامتصاص المعوي المرتبط بالتهاب الأمعاء وضمور الزغابات المعوية، وعدم مقدرة الأمعاء على امتصاص كافة المواد الغذائية بما فيها الفيتامين B12، والتي تعرف بالذرب Sprue. ويوجد نوعان شائعان من الذرب: الذرب المداري الناجم عن التهاب وضمور ظهارة الأمعاء والمسبب بالبكتريا، والذرب الالامداري المرتبط بضمور ظهارة الأمعاء لأسباب مناعية على علاقة باحتواء الأطعمة على مادة الغلوتين (القمح والشعير) وتعرف هذه الحالة بالداء الزلاقي. ومن مسببات سوء الامتصاص نذكر أيضا قطع جزء من المعى اللفائفي والورم الحبيبي المعوي، إضافة لالتهاب القولون التقرحي وتناول المواد الخالبة Phytate.

ت- استنزاف الفيتامين B12 بواسطة البكتريا أو الطفيليات: يرتبط استنزاف

الفيتامين ببعض الاضطرابات المعوية مثل متلازمة العروة العمياء Blind loop syndrome التي تتمثل بوجود انسداد أو مفاغرة في الأمعاء تسبب تراكم كمية كبيرة من البكتريا تقوم بامتصاص الفيتامين. وكذلك الإصابة ببعض الطفيليات مثل الدودة الشريطية السمكية *Diphyllobothrium Latum* (العوساء العريضة)، والتي تنتقل إلى الإنسان لدى تناول بعض الأسماك غير المطهية جيدا.

ث- نقص الوارد الغذائي : ويحصل في حالات نادرة قليلة ، كما في المجاعات وسوء التغذية الشديد .

ج- ازدياد الطلب عن الوارد الغذائي: يلاحظ ازدياد الطلب عن الحاجة اليومية في بعض الحالات الفيزيولوجية ،مثل الحمل والإرضاع والطفولة ،إلى جانب بعض الحالات المرضية المترافقة بازدياد تحطم الخلايا مثل اللغمومات والسرطانات ،وانحلال الدم المزمن والأمراض الرثائية.

ح- تناول بعض الأدوية مثل الباراسيتامول والسليسيليك والكولشيسين والنيوميسين والميتفورمين.


5- أعراض فقر الدم بعوز الفيتامين B12 وعلاماته، (فقر الدم الوبيل):

تظهر الأعراض تدريجيا وبشكل متأخر بسبب المخزون الذي يكفي لعدة سنوات . ويكون فقر الدم معتدل الشدة عند وضع التشخيص . يشكو المريض من أعراض فقر الدم العامة، وهي التعب والصداع والدوار والطنين . و يعاني بعض المرضى من اضطرابات عقلية كالخرف وضعف الذاكرة والأوهام والهوس . أما الأعراض المميزة لفقر الدم بعوز الفيتامين B12 فتتمثل بألم في اللسان يظهر ويختفي على التناوب مع فقد الشهية وتناوب الأسهال والإمساك . ويكون الجلد ناعم الملمس مع شحوب يرقاني خفيف ، وقد ترتفع درجة حرارة المريض بدون إصابة حمجية مع ضخامة

بسيطة في الكبد والطحال. وتتمثل الاضطرابات الدورانية في تسرع القلب مع زلة وخفقان والشعور بخوارج الانقباض مع ميل الضغط نحو الانخفاض. وقد يصاب المريض علامات اثنان رئوي متكرر. وتظهر علامات الاعتلال العصبي نتيجة إصابة الحبال الخلفية والجانبية والقشرة المخية، والتي تتجلى بحس الوخز والحار في إبهام القدمين الذي يمتد إلى باقي الأطراف على شكل القفازات أو الجوارب، وينجم عن إصابة الحبال الخلفية عدم اتساق حركي يتمثل باضطراب في الحس العميق وفقدان الحس المميز وحس الموضع وحس الاهتزاز (الهزاع). أما إصابة العصبونات الحركية العلوية فتتجلى في فرط المنعكسات الوترية وشذوذ المنعكس الأحصبي (انبطاس) مع فقدان المنعكس الرضفي (منعكس نفضة الركبة). وقد يصاب المريض في حالات نادرة بفقدان البصر نتيجة ضمور العصب البصري.


6-الموجودات المخبرية

- تختلف الموجودات المخبرية باختلاف مراحل المرض وشدته وهي تتمثل بما يلي:
- أ- تناقص في عدد الكريات الحمر وعدد الكريات البيض وعدد الصفائح
 - ب- انخفاض معتدل في تركيز الهيموغلوبين لا يتناسب والانخفاض الشديد في عدد الكريات الحمر
 - ت- ترتفع المناسب الدموية المتمثلة بحجم الكرية الوسطي وهيموغلوبين الكرية الوسطي ونسبة تركيز الهيموغلوبين في الكرية.
 - ث- يبدى فحص اللطاخة الدموية كريات حمر كبيرة يزيد حجمه عن 96 ميكرومتر مكعب (الشكل 3-3) مع وجود كريات بيضوية إضافة إلى وجود كريات بأحجام مختلفة (اختلاف الحجم Anisocytosis) وأشكال مختلفة Poikilocytosis.



الشكل 3-3: كريات حمراء كبيرة

ج- و يشاهد كريات هدفية يمتد غشاء بعض منها على شكل ذيل ، وقد تلاحظ أيضا أجسام هول جولي. ويلاحظ انخفاض في عدد الشبكيات مع ميلها نحو الارتفاع بعد الاستجابة للعلاج بأسبوع. وتزداد نسبة المحييات شديدة التفصص (خمسة فصوص أو أكثر) في الدم المحيطي مع بقاء حجمها ضمن الحدود السوية (الشكل 3-4).



الشكل 3-4: فرط تفصص العدلات في فقر الدم العرطل

ج- يبدي فحص لطاخة النقي فرط تنسج في سلالة الكريات الحمراء مع خلل الأنقسام الطبيعي. وتبدو خلايا السلالة الحمراء كبيرة الحجم من النوع العرطل والتي تتميز نواها بكروماتين ناعم ومبعثر. وقد تلاحظ أجسام هول جولي في

بعض الأرومات العرطلة المتأخرة إضافة لخلايا بيضاء كبيرة الحجم كالنقوية
وسليفة النقوية. كما ينخفض نسبة النواءات وكذلك نسبة نقيائي
حمراني M/E.

خ- تظهر الفحوصات المصلية انخفاض تركيز الفيتامين B12 في المصل عن الحدود
السوية التي تبلغ نحو 300-400 ميكروغرام/مل. وتتم معايرة الفيتامين في
المصل بواسطة النظائر المشعة أو باستخدام الجراثيم التي لاتنمو إلا في وسط
يتوفر فيه الفيتامين B12، حيث تقارن درجة نمو الجراثيم في مصل المريض مع
درجة نموها في مصل مشابهة تحتوي مقداراً معيناً من الفيتامين. ويسجل
ارتفاع حديد المصل وزيادة طفيفة في نسبة البيليروبين إضافة لارتفاع عيار
أنزيم اللاكتات ديهيدروجيناز LDH. ويلاحظ انخفاض عيار الهبتوغلوبين
والكولسترول وأنزيم الفسفاتاز القلوية.

7- التشخيص التفريقي

يعتمد التشخيص التفريقي على دراسة حالة المريض السريرية والمخبرية، والتي يجب
أن تفرق بين فقر الدم الوبيل، وأنواع فقر الدم الأخرى كبيرة الكريات كتلك المرتبطة
بعوز حمض الفوليك، أو سوء امتصاص الفيتامين الولادي أو استنزاف الفيتامين، أو
انحلال الدم وغيرها.

أ- اختبار امتصاص الفيتامين B12

يجرى هذا الاختبار لمعرفة فيما إذا كان الجسم يستطيع امتصاص الفيتامين B12 أم
لا. ويتمثل هذا الاختبار باعطاء المريض صباحاً قبل تناول أي نوع من الطعام
جرعة فيزيولوجية فموية من الفيتامين B12 الموسوم بالكوبالت المشع مقدارها
(1) ميكروغرام. وفي الوقت نفسه يحقن المريض عضلياً بجرعة كبيرة من الفيتامين
غير الموسوم مقدارها 1000 ميكروغرام، بهدف إشباع نواقل الفيتامين المتمثلة
بالترانس كوبالامين 1.11. وبينما يطرح الشخص السوي عن طريق البول

ملا يقل عن 10٪ من الجرعة الموسومة تنخفض هذه الكمية إلى مادون 5٪ عند الأشخاص المصابون بفقر الدم الوبيل . أما الأشخاص الذين يعانون من التهاب المعدة الضموري أو متلازمات سوء الامتصاص فتبلغ نسبة الفيتامين المشع المطروحة في البول نحو 5-10٪. ويهدف التمييز بين نقص العامل الداخلي وسوء الامتصاص تعاد نفس التجربة مع إعطاء العامل الداخلي.


ب- معايرة إطراح حمض ميثيل المالنوك في البول
يزداد معدل إطراح حمض الميثيل المالنوك في البول لدى نقص الفيتامين B12 من 2 ملغ وسطيا في الأربع والعشرين ساعة في الحالة السوية ليصل إلى أكثر من 15 ملغ . فيما يبقى معدل إطراح هذا الحمض طبيعيا في حالة نقص حمض الفوليك.

ت- تحري نسبة الشبكيات إثر إعطاء جرعة فيزيولوجية من الفيتامين B12
مقدارها 1-2 ملغ، وحذف المواد الغذائية التي تحتوي كمية كبيرة من الفيتامين وحمض الفوليك . حيث يلاحظ ارتفاع نسبة الشبكيات بعد ثلاثة أيام، وتصبح أعلى مما يمكن بعد سبعة أيام ، ويظهر فحص النقي عودة إنتاج الكريات السوية بعد أربعة أيام.

ث- تحري تركيز حمض الفوليك وتركيز الفيتامين B12 في المصل.
ج- معايرة العامل الداخلي بالطرق المناعية الذي يكون منخفضا، وكذلك معايرة حجم العصارة المعدية الذي ينقص مع انخفاض نسبة حمض كلور الماء (اللاكلورية) وارتفاع الرقم الهيدروجيني (الباهاء أكثر من 6 عادة)، والذي لا يرتفع بعد إعطاء حقنة من الهستامين.

8-العلاج

تعتمد معالجة فقر الدم بعوز الفيتامين B12 على حقن الفيتامين عضليا التي تستمر مدى الحياة في فقر الدم الوبيل. ويهدف تعويض مخزون الفيتامين يعطى المريض 6



الشكل 5-3: فقر الدم ضخّم الأرومات مسبب بعوز ث الفولات

12-تشخيص عوز (نقص) حمض الفوليك

- أ- الاختبار العلاجي : ويجري بإعطاء جرعة فيزيولوجية من حمض الفوليك عن طريق الفم أو زرقاً تبلغ نحو 100-200 ميكروغرام ، ومتابعة عدد الشبكيات والتغيرات الأخرى في الدم المحيطي والنقي.
- ب- معايرة تركيز حمض الفوليك في المصل والكريات الحمر بوساطة المقايسة المناعية الشعاعية أو بوساطة عصيات *Lactobcillus Casei*، حيث تكون النسبة مرتفعة أو طبيعية في فقر الدم بعوز الفيتامين B12.
- ت- اختبار طرح مركب *Formaminoglutamic Acid (Figlu)* : يعتمد هذا الاختبار على حاجة مركبات حمض الفوليك التي تتوسط تحول مركب *Figlu* إلى حمض الغلوتاميك . وهو اختبار حساس لنقص حمض الفوليك والذي يترافق بازدياد طرح مركب *Figlu*، إلا أنه يمكن الحصول على نتائج خاطئة في حالة الحمل، وكذلك في حالة العوز الشديد بالفيتامين B12، وأمراض الكبد والسرطانات.

13-العلاج

تعتمد المعالجة على إعطاء حمض الفوليك (5 ملغ/يوم) إلى جانب معالجة الأسباب حتى تزول كافة الأعراض، وتستقر الصورة الدموية ضمن الحدود السوية حيث يمكن الاعتماد حينها على المصدر الغذائي.

ثانياً: فقر الدم كبير الخلايا سوي الأرومات (ذو الأرومات غير العرطلة) ويشمل مجموعة من الاعتلالات التي تتميز بوجود كريات كبيرة في الدم المحيطي دون أن يترافق ذلك بظهور الأرومات العرطلة في نقي العظم، ودون مظاهر عوز الفيتامين B12، وحمض الفوليك والتي تكون تراكيزهما في المصل ضمن الحدود السوية . وأهم هذه الحالات المرضية الكحولية وأمراض الكبد المزمنة وفقر الدم اللاتنسجي وقصور الدرقية، إضافة إلى تناول الأدوية السامة، للخلايا، وخاصة تلك التي تخل باستقلاب DNA مثل مضادات البورين والتيميدين.



Hemolytic Anemia فقر الدم الانحلالي

يرتبط فقر الدم الانحلالي كما أشرنا بمجموعتين رئيسيتين من المسببات، تتميز المجموعة الأولى منها بخلل تركيب الكرية الحمراء، فيما تكون المجموعة الثانية على علاقة بمسببات خارج الكريات الحمر . ويتميز فقر الدم الانحلالي على اختلاف مسبباته بعدد من الصفات العامة والمتمثلة بنقص تركيز الهيموغلوبين، وقصر عمر الكريات الحمر وازدياد نشاط السلالة المولدة للحمر في النقي لتعويض الكريات المخربة.

أولاً: مؤشرات فقر الدم الانحلالي ودلائله

يتصف فقر الدم الانحلالي بعدد من الدلائل الصريحة التي تشير إلى ازدياد انحلال الدم وهي:

1. ارتفاع تركيز البليروبين غير المباشر (غير المرتبط) في مصل المريض وازدياد نسبة مولد اليوروبيلين في البول مع ظهور اللون اليرقاني على المريض عندما يصل تركيز البليروبين في المصل إلى 3 ملغ/100 مل.
2. غياب الهبتوغلوبين الحر من المصل بعد إشباعه التام بالهيموغلوبين وظهور الميتهم البومين Methemalbumin نتيجة اتحاد الهيم الفائض مع الألبومين، وكذلك طرح الهيموغلوبين الحر مع البول (بيلة هيموغلوبينية) في الانحلال الوعائي الشديد.
3. بيدي فحص الدم وجود خلايا مكمورة في تكور الدم الوراثي وانحلال الدم المناعي، أو كريات محطمة (شدفية)، كما في فقر الدم المرتبط بالصمامات البديلة، أو خلايا هدفية كما في اعتلالات الهيموغلوبين والحروق وأمراض الكبد، أو تراص الكريات بسبب وجود راصات باردة.
4. ازدياد انتاج الكريات الحمر. يتجلى ازدياد توالد وإنتاج الكريات الحمر بازدياد نسبة الشبكيات في الدم المحيطي التي تتراوح نسبتها ما بين 3-4% في حالة الانحلال البسيط، و 20-60% في حالات الانحلال الشديدة، ويترافق ذلك بازدياد حجم

الكريات الوسطي. ويكون النقي زائد الخلوية الذي يمكن أن يرداد إنتاجه ثمانية أضعاف قبل ظهور علائم فقر الدم.

5. انخفاض العمر النصفى للكريات الحمر إلى مادون 20 يوماً، والذي يوافق الزمن اللازم لانخفاض نسبة الإشعاع بمقدار 50% بعد وسم الكريات بالكروم المشع وإعادتها إلى المريض.

ثانياً: تقصي أسباب فقر الدم الانحلالي (التشخيص التفريقي)

يعتمد تقصي أسباب فقر الدم الانحلالي ووضع التشخيص الصحيح على القصة السريرية للمريض، والفحوص المخبرية التي يمكن من خلالها مقارنة سبب فقر الدم الانحلالي، وتمييز نوعه ودرجته.

1 - التقصي السريري

يهدف التقصي السريري إلى التعرف فيما إذا كان للمرض قصة عائلية، أو له علاقة بالتوزع الجغرافي، أو تناول الأدوية.

فتقصي وجود حالات مشاهة في العائلة الواحدة إلى جانب صلة قرابة تربط بين الوالدين يمتلك أهمية كبرى في التمييز بين فقر الدم الانحلالي والمكتسب.

أما التوزع الجغرافي والعرق، فيمكن أن يعطي فكرة عن نوع فقر الدم المرتبط باعتلال الهيموغلوبين الذي مازالت بعض أنواعه شائعة في منطقة ما أكثر من أخرى. فعلى سبيل المثال تنتشر التلاسيميا بين سكان البحر الأبيض المتوسط والهنود والصينيين أو أي بقعة في العالم يعود أصل سكانها إلى هذه المناطق. أما اعتلالات الهيموغلوبين S

و C، فهي شائعة بين سكان غرب أفريقيا، فيما ينتشر اعتلال الهيموغلوبين E بين سكان الصين وتايلاند.

كما أن تقصي نوع الأدوية التي يتناولها المريض قد يفيد في تشخيص سبب انحلال الدم، مثل الأدوية المؤكسدة ومركبات السلفا التي قد تسبب انحلال الدم لدى نقص انزيم الغلوكوز-6-فسفات ديهيدروجيناز.

ومن الفحوصات السريرية الهامة نذكر الضخامة الطحالية التي إذا ترافقت مع ضخامة الغدد اللمفاوية فتشير إلى أن الانحلال مرافق لايبضاض لمفاوي مزمن. أما البلية البروتينية والإصابة الجلدية، فتدل على انحلال الدم المرافق لداء الذئبة الحمامية المنتشر.

2-الاختبارات التشخيصية

وتشمل عددا من الاختبارات والفحوصات التشخيصية أهمها:

أ- فحص لطاخة الدم المحيطي لتقصي وجود كريات شاذة وتحديد نسبة الشبكيات كما أسلفنا.

ب- اختبار الهشاشة الكروية (المقاومة الحلوية للكريات الحمر): حيث تزداد الهشاشة الكروية (انخفاض المقاومة الحلوية) في تكور الكريات الوراثي وكذلك في فقر الدم الانحلالي المناعي الذاتي (تكور الحمر المناعي)، إضافة إلى التسممات والحروق. ويبدأ الانحلال في حالات زيادة الهشاشة في محلول كلور الصوديوم بتركيز 0.48% ويصبح تاما في محلول بتركيز 0.40%.

أما نقص الهشاشة الكروية (ارتفاع المقاومة الحلوية)، فيلاحظ في التلاسيميا الكبرى وفقر الدم المنجلي واحمرار الدم، إضافة للحالات الشديدة من عوز الحديد والهيموغلوبين C. وفي هذه الحالات يبدأ الانحلال في المحلول بتركيز 0.38%، ويصبح تاما في محلول يبلغ تركيزه 0.30%.

ت- الكشف عن الأجسام الضدية على سطح الكريات الحمر (اختبار كومب): يستخدم اختبار كومب Combs test للكشف عن الأضداد الذاتية على سطح الكريات الحمر، والتي يتم التعرف عليها وبلعمتها من قبل خلايا الجملة الشبكية البطانية لكل من الكبد والطحال ونقي العظم. ويشمل اختبار كومب بإحداث تراض للكريات التي تحتوي مثل هذه الأضداد على سطوحها لدى حضنها في مصلول تحتوي على أضداد للأجسام الضدية (أضداد الغلوبولين Antiglobulin). ويمكن التمييز بين نوعين من الأضداد الذاتية:

ث- الأضداد الدافئة: وهي غلوبولينات مناعية من النمط (IgG)، وزنها الجزيئي نحو 150000، تعطى تفاعلا ايجابيا في اختبار كومب لدى حضانها بدرجة حرارة 37 مئوية، وتصادف الأضداد الدافئة في التهاب الكبد المزمن والورم المسخي المبيضي والتهاب القولون التقرحي، وابيضاض الدم اللمفاوي المزمن.

ج- الأضداد الباردة: وهي غلوبولينات مناعية من النمط (IgM)، يبلغ وزنها الجزيئي نحو 900000، وتعطي تفاعلا ايجابيا في اختبار كومب في درجة حرارة منخفضة (4-22 درجة مئوية). وتصادف هذه الأضداد في كثرة الوحيدات الخمجي، وذات الرئة بالمفطورة *Mycoplasma*.

ح- كما ويمكن للأضداد التواجد في المصل، ويكشف عنها باختبار كومب غير المباشر الذي يتمثل بإضافة كريات تتوافق مع مصل المريض ثم حضانها في درجة حرارة 37 مئوية، وبعد غسلها فإنها تحدث تراصا في مصل كومب.

خ- اختبارات الكشف عن نقص فعالية الأنزيمات الكمي والكيفي. يؤدي نقص الأنزيمات التي تتوسط المسارات الاستقلابية داخل الكريات الحمر (مسلك امبدن-ميرهوف ومسلك البنتوز فسفات) إلى انحلال دموي وراثي يكشف عنه بمعايرة الأنزيمات في الكريات الحمر.

د- الكشف عن أجسام هايتر: تتشكل أجسام هايتر نتيجة ترسب سلاسل الغلوبين إما بسبب عوز أنزيم الغلوكوز-6-فسفات ديهيدروجيناز أو أي اضطراب في مسلك إرجاع الكرية الحمراء، وخاصة لدى تناول بعض الأدوية مثل البريماكين أو السلفا أو المواد المؤكسدة. وتتشكل هذه الأجسام عندما يكون هناك هيموغلوبين غير مستقر ولاسيما بعد استئصال الطحال. ويمكن أظهار أجسام هايتر بعد تلوينها بزرقة الكريزل للاماعة أو زرقة المتيلين.

ذ- اختبار هام Hams test: يستخدم اختبار هام من أجل التمييز بين انحلال الدم المرافق لعوز الأنزيمات وانحلال الدم المرافق لاعتلال البيلة الهيموغلوبينية الانتبائية الليلية، الذي يتميز بوجود كريات حمراء ذات حساسية زائدة للانحلال بالمتنمة. ويتمثل اختبار هام بوضع معلق الكريات مع مصل حامضي وملاحظة انحلال نسبة من الكريات. ويتميز هذا الانحلال بكونه يثبط لدى تسخين المصل إلى درجة 56 مئوية لتخرب المتنمة.

ر- يحتاج تقصي أسباب انحلال الدم اختبارات أخرى ، مثل اختبار الرحلان الكهربائي للهيموغلوبين ، واختبار ثبات الهيموغلوبين في درجات الحرارة العالية ، وكذلك قياس نسبة السلاسل ألفا إلى السلاسل بيتا ودراسة منحني تفكك الأكسي هيموغلوبين، والتي تفيد في تشخيص الانحلال المرتبطة بشذوذ الهيموغلوبين. و يفيد تحري مكان انحلال الكريات بعد وسمها في تشخيص انحلال الدم المرتبط بفرط نشاط الطحال. أما اختبار الانحلال الذاتي للكريات الحمراء في درجة حرارة 37 مئوية فيفيد في تشخيص فقر الدم كروي الخلايا الذي يترافق بازدياد نسبة الكريات المنحلة مقارنة مع الكريات السوية ، ويمكن إنقاص هذا الانحلال بإضافة الغلوكوز إلى المحلول.

ز- الفحوص الشعاعية: يكشف الفحص الشعاعي لعظام الجمجمة وبعض العظام الإسفنجية الأخرى عن تغيرات وصفية مختلفة ذات أهمية في التعرف على ازدياد نشاط النقي لتعويض الكريات المنحلة. فتبدو المسافة التي يحتلها نقي العظم بين طبقتي عظم الجمجمة متسعة وتظهر خطوط عمودية على سطح العظم. وتبدو عظام العمود الفقري أقل كثافة، أما العظام الطولية فتبدو أكثر سماكة وتصلبا. وتكون هذه الصورة واضحة في التلاسيميا، وفقر الدم المنجلي، وفقر الدم الكروي الوراثي



الفصل الخامس

فقر الدم الانحلالي المرتبط بشذوذ تشكّل غشاء الكرية الحمراء

أولاً: فقر الدم الكروي الخلايا Spherocytic Anemia (تكوّ الكريات الوراثي Spherocytosis)

تكوّن الكريات الوراثي مرض عائلي يعرف بانحلال الدم اليرقاني الوراثي أو داء شوفار ويورث كصفة جسدية قاهرة، ويكشف عادة في سن مبكرة (5-10 سنوات)، كما يكشف في السنين المتأخرة في الحالات البسيطة. ويتصف المرض بفرط انحلال مختلف الشدة، ويعتبر من أكثر أمراض الكريات الحمر الوراثية انتشاراً في شمال أوروبا. تتمثل الآلية الفيزيولوجية للمرض بخلل مستوى الشحوم الفسفورية والكليسترول والبروتينات الغشائية. فتفقد الكرية شكلها القرصي المميز، وتصبح مكورة وتعجز عن تغيير شكلها، وتصبح عرضة للتخرب في الطحال. وتضرب نفوذية الكرية للإيوانات، وخاصة الصوديوم التي تزداد نفوذيتها إلى داخل الكرية، ويترافق ذلك بازدياد فعالية الأتبياز ATPase، وانخفاض سريع في مستوى 2-3 ثنائي فوسفوغليسرات.


1- الأعراض والعلامات

تختلف شدة الأعراض باختلاف درجة الإصابة، فبينما لا تترافق الحالات البسيطة بفقر الدم، تظهر على المريض في الحالات الأشد أعراض فقر الدم العامة مع لون يرقاني تختلف شدته حسب شدة الانحلال، وضخامة طحالية غير مؤلمة. وقد يصبح الطحال مؤلماً أثناء النوبة الانحلالية مع آلام بطنية وصداع وغثيان، إلى جانب ارتفاع درجة الحرارة الحمجي بسبب توقف النقي عن إنتاج الكريات البيض في الحالات الشديدة أو يصاب المريض بالرعاف والتروّف نتيجة توقف تشكّل الصفيحات، وغالباً ماتزول الأعراض الأخيرة أثر عودة النقي لنشاطه بعد عدة أيام. وتترافق الحالات الشديدة

بتقرحات في الساقين، وتشكل حصيات صفراوية قد تكون سببا ليرقان انسدادى (انسداد القناة الجامعة).

2- الفحوصات والموجودات المخبرية

- أ- يبدى الفحص الشعاعى التبدلات الوصفية في العظام المسطحة نتيجة ازدياد نشاط النقي . وتبدو الجمجمة برجية الشكل مع سماكة في عظامها الجبهية والحدارية، ويمكن للفحص الشعاعى إظهار وجود الحصيات المرارية.
- ب- يسجل تناقص تركيز الهيموغلوبين بشكل معتدل وتناقص حجم الكرية الوسطى MCV، وازدياد هيموغلوبين الكرية الوسطى MCHC.
- ت- يظهر فحص لطاخة الدم المحيطي كريات مكورة بقطر 6-7 ميكرون دون شحوب مركزى (الشكل 6-3)



الشكل 6-3: كريات حمر مكورة (تكور الحمر الوراثي)

- ث- يظهر اختبار المشاشة الكروية نقص مقاومة الكريات الحمر للانحلال. ويتميز عن فقر الدم الانحلالي المناعى الذى يعطى صورة مشاهمة لدى فحص اللطاخة الدموية واختبار المشاشة الكروية باختبار كومب الذى يكون سلبيا.


- ج- ينخفض العمر النصفى للكريات الحمر.
- ح- تزداد نسبة الشبكيات حيث تتراوح بين 3 و15%.
- خ- يرتفع تركيز البيليروبين غير المباشر.
- د- ينخفض تركيز حمض الفوليك في المصل بسبب زيادة استهلاكه.

3-العلاج

تعتمد المعالجة على استئصال الطحال الذي يكون عادة شافيا، ويؤدي إلى زوال النوبات الانحلالية وشفاء التقرحات في الساقين، ويخفض فرص تشكل الحصيات. ويمكن استئصال الحصى الصفراوية . و قد يحتاج المريض إلى معالجة الأحماج وتعويض حمض الفوليك بجرعات علاجية مقدارها 5ملغ /يوم.

ثانيا:مرض الكريات البيضوية (Elliptocytosis)Ovalocytosis

يعد وجود الكريات البيضوية من الأمراض الوراثية المرتبطة بشذوذ غشاء الكرية والذي يتصف بوجود الكريات البيضوية في الدم المحيطي بنسبة 50-90 % (الشكل 7-3)، وقد يعود سبب المرض إلى خلل في البروتينات الغشائية . ويكون المرض لاعرضيا عند متخالفي اللواقح فيما تكون علامم الانحلال شديدة لدى متماثلي اللواقح.



الشكل 7-3: الكريات البيضوية

وبخلاف تكور الكريات الوراثي فإن اختبار الهشاشة الكروية يكون طبيعياً وكذلك فعالية أنزيم الأتيياز . وتُحذر الإشارة إلى أن الكريات البيضوية في عدد من أمراض الدم الأخرى، مثل فقر الدم بعوز الحديد والتلاسيميا وفقر الدم ضخيم الأرومات، وفقر الدم العرضي أو الثانوي، أما علاج المرض فيكون باستئصال الطحال.

ثالثاً: اعتلال الكريات القموية Stomatocytosis

يتميز فقر الدم بالكريات القموية بوجود الكريات القموية في الدم المحيطي ، وتعد هذه الحالة من الأمراض النادرة ، والتي ترتبط بشذوذ في غشاء الكرية ، وتتصف بانخفاض المقاومة الحلولية . ويكون العلاج باستئصال الطحال الذي يخفف من شدة الانحلال . وقد توجد الكريات القموية في التلاسيميا ، والتسمم الرصاصي والتسمم الكحولي ، وبعض الأدوية إضافة لشذوذات بعض الأنزيمات وأمراض الكبد.

الفصل السادس

فقر الدم الانحلالي المرتبط بشذوذ أنزيمات الكرية الحمراء

تؤدي الاضطرابات الكمية أو النوعية (الكيفية) في الأنزيمات التي تتوسط المسارات الاستقلابية للغلوكوز ضمن الكريات الحمر إلى فقر دم انحلاي وراثي يصنف في مجموعتين رئيسيتين: فقر الدم الانحلالي المرتبط بشذوذ أنزيمات مسلك اميدن - ميرهوف، وفقر الدم الانحلالي المرتبط بشذوذ أنزيمات الأكسدة والإرجاع.

أولاً: فقر الدم الانحلالي المرتبط بعوز أنزيمات مسار اميدن-ميرهوف

1- عوز الهكسوكيناز **Hexokinase**: تعد الهكسوكيناز (غلوكوكيناز) الأنزيم

المفتاحية في مسلك تحطم الغلوكوز والتي تتوسط فسفرة الغلوكوز وتحويله إلى غلوكوز-6 - فسفات. ويؤدي عوز هذه الأنزيم إلى فقر دم متوسط الشدة يتميز بانخفاض محتوى الغلوكوز-6-فسفات و2-3 ثنائي فسفوغليسيرات في الكرية. ويتصف منحنى تفكك الأكسي هيموغلوبين بانزياح شديد نحو اليسار، ويمكن أن يرتفع تركيز الهيموغلوبين وتحسن حالة المريض باستئصال الطحال.

2- عوز فسفو هكسوزايزوميراز **Phosphohexose Isomerase**:

يتوسط هذا الأنزيم قلب الغلوكوز-6-فسفات إلى فركتوز-6-فسفات. ويؤدي عوز هذه الأنزيم إلى فقر دم انحلاي يورث كصفة جنسية متنحية، وقد يفيد استئصال الطحال في تحسين نسبة الهيموغلوبين.

3- عوز الفسفوفركتوكيناز **Phosphofructokinase**. يتوسط هذا الأنزيم

تحول الفركتوز-6-فسفات إلى فركتوز-1,6-ثنائي الفسفات. و يسبب عوز الأنزيم نوعان من فقر الدم يورثان كصفة جنسية متنحية، قد يترافق أحدهما باعتلال عضلي.

4- عوز الألدولاز **Aldolase**: يتوسط الأنزيم تحول الفركتوز-6،1-ثنائي الفسفات إلى ثنائي هيدروكسي الأسيتون وجليسر الدهيد فسفات. ويكون عوز الأنزيم قليل الأهمية ويرافق هذا العوز تكور الكريات الوراثي أحيانا .

5- عوز التريوز فسفات ايزوميراز **Triosephosphate Isomerase**: يتوسط الأنزيم تحول ثنائي هيدروكسي الأسيتون إلى غليسر الدهيد فسفات: ويؤدي عوزه إلى فقر دم انحلاي مترافق مع اعتلالات عصبية، يورث كصفة جسمية متنحية، ولا يقتصر هذا العوز على الكريات الحمر بل يشمل الكريات البيض والعضلات الهيكلية والسائل الدماغي الشوكي.

6- عوز البيروفات كيناز **Pyruvate Kinase**: يتوسط الأنزيم تحول الفسفو اينول بيروفات إلى حمض البيروفيك، ويؤدي عوزه إلى فقر دم انحلاي يورث كصفة جسمية متنحية. ويترافق عوز الأنزيم بنقص ATP الكريات الحمر وارتفاع تركيز 2-3 ثنائي فسفو غليسرates وانحراف منحني تفكك الأكسي هيموغلوبين إلى اليمين .

ثانيا: فقر الدم الانحلاي المرتبط بعوز أنزيم الغلوكوز-6-فسفات ديهيدروجيناز.
1- الفيزيولوجيا المرضية

يعد الغلوكوز-6-فسفات ديهيدروجيناز أنزيم مفتاحي في تحطم الغلوكوز وفق مسلك السكاكر الخماسية، والذي يؤدي إلى إنتاج مركب NADPH الذي ي يلعب دور تميم لأنزيم الغلوتايون ريدوكتاز. ويتوسط الأنزيم الأخير إرجاع الغلوتاتيون الذي يقي بدوره أكسدة الهيموغلوبين بفعل المواد الدوائية والغذائية والإنتاية، والتي تعمل على تخرب الهيموغلوبين وترسبه في الكرية الحمراء على شكل أجسام هايتر .

يسبب عوز الأنزيم فقر دم انحلاي يورث كصفة قاهرة غير كاملة النفوذية على الصبغي الجنسي X. يصيب المرض الذكور بشكل خاص، ويكثر انتشاره بين

الزنج و يشاهد أيضا لدى سكان حوض المتوسط (سوريا واليونان وإيطاليا).
وينتشر المرض بوتيرة عالية لدى الأشخاص المصابين بنقص اللوتين الأحمر
والأخضر، الأمر الذي قد يكون على علاقة بتقارب موقع هذه المورثات على
الصبغي الجنسي X.

2- الأعراض والعلامات السريرية

لاييدي معظم المصابين بعوز أنزيم G6PD أية أعراض في الحالة السوية لأن
كمية ضئيلة من الأنزيم تكفي عادة للحفاظ على سلامة الكرية ووظيفتها. وتظهر
النوبات الانحلالية بعد التعرض للعوامل المؤكسدة على اختلاف أنواعها كالأدوية
(البريماكين ومركبات الساليسيلات والسلفاميدات والفيتامين K)، أو تناول بعض
الأطعمة مثل الفول الأخضر أو المطبوخ، أو حتى استنشاق غبار الطلع لهذا النبات،
ويعرف انحلال الدم في هذه الحالة بالفوال Favism. وتلاحظ نوبات الانحلال
بعد عدة أيام من الإصابة الإثنائية ولدى بعض الأشخاص الذين يتناولون النفطالين
(كرات العت). وقد لوحظ ارتباطا شديدا بين نقص G6PD وفقر الدم المنجلي
لدى مختلف الشعوب. وتبين أن فقر الدم الانحلالي الخلقي غير المكور وبعض
يرقانات الوليد غير المرتبطة بعدم توافق الزمر الدموية أو اعتلالات الهيموغلوبين
تكون على علاقة بنقص G6PD. أضف إلى ذلك فإن الأشخاص المصابين بعوز
G6PD يقاومون الإصابة بداء الملاريا. وتختلف شدة النوبة الانحلالية من مريض
إلى آخر، والتي تتجلى عموما بآلام بطنية وظهرية وغثيان وصداع وترفع حروري،
وظهور اللون اليرقاني، إضافة إلى تغير لون البول الذي يصبح غامقا.

3- التشخيص المخبري


يعتمد التشخيص المخبري على كشف نقص G6PD، وتحري أجسام هايتر.

- أ- كشف نقص G6PD : يمكن الكشف عن فعالية G6PD بصورة
مباشرة عن طريق قياس تغير الامتصاصية المحدث بإرجاع مركب NADP.

ويمكن التحري عن فعالية G6PD بطرق بسيطة غير مباشرة ، وخاصة لدى عدم توفر الأجهزة الدقيقة ، وحيث الحصول على نتائج دقيقة جدا غير مطلوب كما في المناطق النائية . ومن هذه الطرائق نذكر اختبار زمن إزالة اللون باستعمال زرقة الكريزل للماعة لموتولسكي Motulsky's brilliant cresyl blue حيث يكون زمن إزالة اللون طويلا لدى الأشخاص المصابين بعوز G6PD . وكذلك اختبار إرجاع الميثيموغلوبين بوجود زرقة الميثيلين ثم قياس نسبة الإرجاع بالنظر المباشر أو باستخدام الأجهزة، حيث تكون درجة الإرجاع أقل في حالة نقص G6PD.

ب- تحري أجسام هايتر داخل الكريات بعد إضافة مادة مؤكسدة مثل الفينيل هيدرازين Phenyl hydrazine ، وحضن الدم مع حجم مماثل من ملون زرقة كريزيل للماعة، وفحص اللطاخة الدموية. وبعد الاختبار إيجابيا عندما تكون نسبة الكريات التي تشكل فيها أجسام هايتر أكثر من 40%.

ت- يظهر فحص اللطاخة الدموية كريات حمراء سوية الصباغ إلى جانب كريات متعددة الصباغ وكريات كروية وشذوية وشائكة. وتتضمن الكريات البيض العادلة الحبيبات السامة (الشكل 8-3).



الشكل 8-3: لطاخة الدم المحيطي في فقر الدم بعوز الغلوكوز 6 فسفات ديهيدروجيناز

ويعتمد العلاج على شدة النوبة الانحلالية فالنوبات الخفيفة لا تحتاج إلى معالجة لأن الأعراض تزول تلقائياً، أما النوبات الشديدة فتعالج بنقل الدم الطازج، وتنبيه المريض إلى لزوم الابتعاد عن العوامل المؤكسدة.



الفصل السابع

فقر الدم الانحلالي المرتبط باعتلالات الهيموغلوبين

تصنف اضطرابات الهيموغلوبين المؤدية إلى فاقات دموية في ثلاث مجموعات:

■ الاضطرابات الكيفية في واحدة أو أكثر من سلاسل الغلوبين، حيث يرتبط الاعتلال بخلل بنية السلاسل الببتيدية نتيجة استبدال أحد الحموض الأمينية السوية لأحدى سلاسل الغلوبين بحمض أميني آخر، كما في الهيموغلوبينات S, C, D, E.

■ الاضطرابات الكمية في واحدة أو أكثر من سلاسل الغلوبين، وينجم الاعتلال عن نقص اصطناع سلسلة ببتيدية واحدة أو أكثر في جزيء الهيموغلوبين كما في التلاسيميا *Thalassemia*.

■ الاضطرابات المشتركة في سلاسل الغلوبين، وينجم الاعتلال عن اشتراك الاضطرابات الكمية والكيفية معا في السلاسل الببتيدية لجزيء الهيموغلوبين، كما في التلاسيميا المنحلية *Sickle-Beta Thlassemia*.

وتجدر الإشارة إلى أن الاضطرابات الكمية أو الكيفية في السلاسل الببتيدية تغير الكثير من خصائص الهيموغلوبين وتكسبه صفات جديدة من أهمها التغير في الشحنة الكهربائية التي تتجلى بحركية غير نظامية أثناء الرحلان الكهربائي، وتغير الطيف الامتصاصي الضوئي، وكذلك ازدياد أو نقص الألفة للأكسجين، إلى جانب تغيرات أخرى مثل عدم استقرار جزيء الهيموغلوبين الذي يتسبب بعد التسخين وانخفاض نسبة الانحلال وارتفاع تركيز الميتهموغلوبين.

أولاً- الاضطرابات الكيفية

يصنف ضمن هذه المجموعة اعتلالات الهيموغلوبين S (HbS) والهيموغلوبين C (HbC) والهيموغلوبين E (HbE) إلى جانب عدد من الاضطرابات الأخرى في بنية الهيموغلوبين.

1- فقر الدم المنجلي Sickle cell anemia

أ- الفيزيولوجيا المرضية

فقر الدم المنجلي مرض وراثي ينقل كصفة وراثية قاهرة، ينتشر بكثرة في المناطق الاستوائية الأفريقية، ويكون أقل انتشاراً في دول الحوض المتوسط (سوريا، قبرص، اليونان). ويتصف المرض بوجود هيموغلوبين شاذ يعرف بالهيموغلوبين S، ينجم عن استبدال الحمض الأميني الغلوتاميك بالحمض الأميني الفالين في الموقع السادس من السلسلة بيتا (الشكل 6-3).




Figure 5.21

الشكل 6-3: مقارنة بين الهيموغلوبين المنجلي والهيموغلوبين السوي

ويتصف الهيموغلوبين S بأنه يأخذ شكلا هلاميا لزج لدى عبور الأكسجين، (الخلاصة: الضغط الجزئي للأكسجين)، مما يفقد الكرية شكلها الكروي مقر الوجهين، وتأخذ الشكل الهلامي (المنجلي). وإلى جانب قصر عمر الكريات المنجلية ونقصها في النسيج الشبكي البطاني، فإنها تصبح قاسية وتلتصق إلى بعضها مشكلة حشرات تعمل على سد الأوعية الشعرية وإحداث نقص تأكسج موضعي، يحدث بدوره زيادة في لزج الأكسجين وازدياد تمحل الكريات. وتؤدي هذه الحلقة المعيبة إلى توسع الأوعية المسبب بانسداد الأوعية، وهو السبب المباشر الأول للمرضية والوفاة في فقر الدم المنجلي.

ينتج الهيموغلوبين S عن طفرة تصيب المورثة المسؤولة عن اصطناع السلسلة بيتا ويملك كل فرد مورثتين مسؤولتين عن اصطناع السلسلة بيتا، أحدهما من الأب والأخرى من الأم. ويتم توريث شذوذات الهيموغلوبين بمفاهيمها الهيموغلوبين S بحسب قانون مندل. وبهذا الشكل يمكن تمييز شكلين من فقر الدم المنجلي: متمائلي اللواقح HbSS، وهو ما يعرف بفقر الدم المنجلي Sickle cell anemia، ومتماثلي اللواقح HbSA الذي يعرف بالصفة المنجلية Sickle cell trait.

ب - أعراض فقر الدم المنجلي (متماثل اللواقح) وعلاماته

تظهر الأعراض بعد الشهر السادس من العمر عندما يحل الهيموغلوبين المنجلي (HbS) مكان الهيموغلوبين الجنيني (HbF)، حيث تظهر أعراض فقر دم مزمن مع لون يرقاني مرافق لفقر انحلال الكريات إلى جانب أعراض سوء النمو التي تتجلى بتبدلات عظمية ونقص تكلس في العمود الفقري تكون سببا في القزامة. ويسبب انسداد الشرايين الصغيرة احتشاءات في مختلف أعضاء الجسم، كعظام اليد ورؤوس العظام الطويلة والرقبة والعينين والكبد والكلية والدماغ، والتي تترافق بنوبات ألمية، ويتضمن الطحال الذي يصاب بالإنتان والضمور بسبب الاحتشاءات المتكررة مع ميل للإصابة بالأخماج الخطيرة. وتشكل تقرحات جلدية في ناحية الطرفين السفليين إلى جانب

تشكل الحصيات الصفراوية بسبب فرط الانحلال. وتزداد شدة المرض إثر تشييط تكون الحمر بسبب الخمج وعوز حمض الفوليك.

ث - الموجودات المخبرية

- انخفاض تركيز الهيموغلوبين الذي يصل لحدود 3ملغ/100مل أثناء النوبات الانحلالية إلى جانب انخفاض الهيماتوكريت (18-30%).
- يرتفع تركيز كل من حديد وفيريتين المصل إلى جانب ارتفاع تركيز البيليروبين غير المباشر.
- يسجل انخفاض سرعة التثفل بسبب ازدياد لزوجة الدم.
- يظهر فحص اللطاخة الدموية كريات منجلية إلى جانب كريات هدفية وكريات حديدية وأجسام هول-جولي وطلائع الكريات الحمر، وترتفع نسبة الشبكيات.
- يظهر اختبار الرحلان الكهربائي وجود الهيموغلوبين S بنسبة 75-95% والهيموغلوبين F بنسبة 5-15% والهيموغلوبين A₂ بنسبة 2-3% مع غياب تام للهيموغلوبين A.
- ايجابية اختبار التمنجل.

ج- العلاج

تعتمد المعالجة على الوقاية من النوبات الانحلالية والألمية ومعالجة مضاعفاتها من خلال إعطاء اللقاحات والمضادات الحيوية عند حدوث الخمج، وتجنب الركودة الدموية المسببة بالبرد والألبسة الضيقة، ومعالجة حالات القيء والاسهال والتجفاف لتجنب ازدياد لزوجة الدم. و يعطى المريض مانعات التخثر والمسكنات لتخفيف الألم إلى جانب حمض الفوليك لتجنب فقر الدم العرطل، ويعمد إلى تبديل الدم الجزئي، أو نقل الدم الطازج في الحالات الاضطرابية. وتتم الوقاية من المرض بتجنب تزواج حاملي مورثة الهيموغلوبين S.

خ- الصفة المنجلية (HbSA) Sickle cell trait

تنتشر الصفة المنجلية بكثرة في أفريقيا الوسطى حيث تصل نسبة الإصابة إلى زهاء 30٪ ، ولا يعاني الأشخاص حاملو الصفة المنجلية من أي أعراض عادة، ويظهر الدم طبيعياً، ولكنهم يتعرضون للخطورة لدى انخفاض توتر الأكسجين بشدة كما هو لدى ركوب الطائرات غير مكيفة الضغط، أو أثناء التخدير بمزيج غازي قليل الأكسجين، وقد يعاني حملة الصفة المنجلية من نوبات ألمية واحتشاء في الطحال مع انخفاض المقدرة على تركيز البول. وتظهر الفحوصات المخبرية إيجابية اختبار التمنجل (ظهور الكريات المنجلية لدى إضافة كاشف مرجع يستهلك الأكسجين مثل Sodium metabisulfite ويتأكد التشخيص بالرحلان الكهربائي للهيموغلوبين الذي يظهر وجود الهيموغلوبين S بنسبة أقل من 50٪).

2- الهيموغلوبين C

ينجم الهيموغلوبين C عن طفرة وراثية يتم بموجبها استبدال الحمض الأميني الغلوتاميك بالحمض الأميني الليزين في الموقع السادس من السلسلة بيتا. ويكون المرض لاعرضياً عند متخالفي اللواقح (HbAC)، أما الشكل متماثل اللواقح (HbCC) فيحدث فقر دم انحلالي خفيف مترافق مع ضخامة طحالية. ويظهر فحص اللطاخة كريات هدفية وميل الهيموغلوبين لتشكيل البلورات داخل الكريات ولاسيما في وسط مفرط التركيز. ويتم تأكيد التشخيص بالرحلان الكهربائي حيث يكون للهيموغلوبين C حركية خاصة. ولا يوجد لهذا المرض أي علاج.

3- الداء المنجلي بالهيموغلوبين C (HbSC)

ينجم فقر الدم المنجلي بالهيموغلوبين C عن إصابة إحدى السلاسل بيتا بالطفرة S وإصابة السلسلة الأخرى بالطفرة C، وينتج عن التقاء المورثتين فقر دم خفيف أو متوسط الشدة يترافق عادة بضخامة طحالية مع نوبات ألمية واحتشاءات واحتمال حصول مضاعفات عينية بما فيها خثرات الشبكية وانفصالها، إضافة إلى خطر البيلة الدموية

الناجمة عن احتشاء اللب الكاوي. ويظهر فحص اللطاخة الدموية كريات هدفية إلى جانب بعض الأشكال المنحلية المدورة.

4- الهيموغلوبين E (HbE)

ينجم الهيموغلوبين E عن طفرة وراثية يتم بموجبها استبدال الحمض الأميني الغلوتاميك بالحمض الأميني الليزين في الموقع 26 من السلسلة بيتا. ويصادف الهيموغلوبين E في جنوب شرق آسيا، وقد يكون لأعراضه حتى في الحالات متماثلة المواقع، ويتم تشخيصه بالحلان الكهربائي حيث يمتلك حركية خاصة.

5- هيموغلوبين كونستانت سبرينغ **HbConstant spring**، ينجم هذا الهيموغلوبين عن إضافة 31 حمض أميني إلى نهاية السلسلة ألفا. ومن الناحية السريرية تشبه الصورة الدموية مثيلتها في اعتلال الهيموغلوبين H.

6- هيموغلوبين ليبور **HbLepore**: ينجم هيموغلوبين ليبور من تشارك في السلسلة حيث يكون نصف السلسلة دلتا ونصفها الآخر بيتا نتيجة التصلب في الصبغات. وتشبه الصورة الدموية الصفة التلاسيمية بينما يظهر الرحلان الكهربائي أن هيموغلوبين ليبور الذي تبلغ نسبته نحو 6-15 %، يرحل على مكان مماثل لمكان الهيموغلوبين A₂S.

7- الهيموغلوبينات غير المستقرة

لقد ثبت وجود 65 نوعا من الهيموغلوبينات غير المستقرة أو غير الثابتة التي تتصف بترسبها لدى تسخين محلول الدم بلطف (50 درجة مئوية). وتنجم هذه الهيموغلوبينات الشاذة إما عن استبدال حمض أميني واحد في السلسلة بيتا، أو فقدان حمض أميني واحد أو أكثر من السلسلة بيتا. وتسبب الهيموغلوبينات غير المستقرة فقر دم انحلالي خلقي مختلف الشدة، ويترافق عموما بمشكلات من الهيموغلوبين المترسب (أجسام هائز). وتعرف خلايا النسيج الشبكي على الكريات المحتوية على هذه المشكلات، فتقوم بتخليصها من الحظام داخل الخلوي (التوهده) أو تحريبها. ونظرا

لتفاوت عدم ثبات هذه الهيموغلوبينات يحصل تفاوت أيضا في درجة الانحلال، فبينما لا تسبب بعض الهيموغلوبينات انحلالا إلا لدى توفر عامل مؤكسد (تناول الأدوية) كما في هيموغلوبين زيورخ، يسبب هيموغلوبين هامر سميت انحلالا مستمرا وتخربا تلقائيا للكريات. وتكتشف الحالات الشديدة من الإصابة في سن الرضاعة المتأخرة أو في سن الطفولة المبكرة، حيث يترافق المرض بلون يرقاني وضخامة طحالية وبول داكن بسبب تحطم الهيموغلوبين.

يظهر فحص اللطاخة الدموية كريات حمراء سوية الشكل مع نقص صبغ خفيف وترقط أساسي. وفي بعض الحالات تبدو الكريات وكأنها قضمت من طرفها وأفرغت منها أجسام هائز. ويزداد عدد أجسام هائز وحجمها بعد استئصال الطحال. ويتم تأكيد فقر الدم باختبار التمسح الحراري الذي يظهر ترسب الهيموغلوبين في درجة حرارة 50 مئوية، وكذلك باختبار الرحلان الذي يظهر حركية غير نظامية لما نسبته 30% من الهيموغلوبين، إلى جانب شذوذ منحني تفكك الأكسي هيموغلوبين.

تكون معالجة المرض داعمة بالدرجة الأولى، وتتمثل بنقل الدم في الانحلال الشديد وتجنب الأدوية المؤكسدة وإعطاء حمض الفوليك واستئصال الطحال.

8- الهيموغلوبينات ذات الألفة العالية للأكسجين

يوجد أكثر من 20 نوعا من الهيموغلوبينات شديدة الألفة للأكسجين، منها هيموغلوبينات شيزابك، باكيما، كمبسي، مالو... إلخ. ويكون الأشخاص المصابون لاعرضيين، ولا يبدون موجودات فيزيائية مزعجة باستثناء حمرة الوجه. ويرتبط ذلك بكثرة الحمر نتيجة صعوبة تخلي الهيموغلوبين عن الأكسجين وأثر ذلك في ازدياد إنتاج مكون الحمر. ويمكن تأكيد التشخيص باظهار ألفة الدم الزائدة للأكسجين، وكذلك وجود هيموغلوبينات ذات حركية شاذة بالرحلان الكهربائي.

9-الهيموغلوبينات M

تنجم الهيموغلوبينات M عن استبدال الحمض الأميني الهستيدين في السلسلة ألفا أو السلسلة بيتا بالحمض الأميني الثيروزين وينتج عن ذلك خمسة أنواع من الهيموغلوبينات (هايدبارك، بوسطن، أيويت، ميلواكي، ساسكاتون) ذات أطراف امتصاص شاذة نتيجة أكسدة الحديد في زمرة الهيم المرتبطة بالسلسلة الشاذة. وتسبب هذه الهيموغلوبينات شكلا نادرا من الزراق الخلقي العائلي، ويكون المرضى لا عرضيين ولا يحتاجون للمعالجة.

ثانيا- الاضطرابات الكمية

تشمل الاضطرابات الكمية مجموعة من الاعتلالات الدموية الخلقية (الوراثية) التي تنقل كصفة جسمية متنحية، وتتميز بقصور إنتاج واحدة أو أكثر من سلاسل الهيموغلوبين، وتفضي إلى فقر دم صغير الكريات ناقص الصباغ، و تعرف بالتلاسيميا. ويميز للتلاسيميا نوعان : التلاسيميا بيتا (β) والتلاسيميا ألفا (α).

1-التلاسيميا بيتا Beta Thlassemia

أ- الفيزيولوجيا المرضية

تنجم التلاسيميا بيتا عن نقص أو غياب إنتاج السلاسل بيتا، وما ينتج عن ذلك من تناقص أو غياب للهيموغلوبين $A(\alpha_2\beta_2)$ ، الذي يحمل محله الهيموغلوبين الجنيني $HbF(\alpha_2\gamma_2)$ الذي يتميز بألفته العالية للأكسجين وإحداثه نقص أكسجة نسجية. وتترافق التلاسيميا بيتا بازدياد تشكل السلاسل ألفا التي تترسب وتشكل مشتملات ضمن الكريات الحمر وأروماها، مما يؤدي إلى تخرها ضمن النقي أو الطحال. وتورث التلاسيميا بيتا كصفة جسمية متنحية، وهي شائعة الانتشار في حوض البحر الأبيض المتوسط، ويميز منها شكلان : التلاسيميا الكبرى والتلاسيميا الصغرى.

ب-التلاسيميا بيتا الكبرى

تعرف التلاسيميا بيتا الكبرى بفقر دم كولي Cooley وهو من أشد أنواع فقر الدم الانحلالي الخلقي، حيث يرث الوليد (متماثل اللواقح) الصفة بيتا من كلا الأبوين (متخالفي اللواقح). ونتيجة اختلال التوازن في تكوين سلاسل الهيموغلوبين تسبب التلاسيميا درجات متفاوتة من انحلال الدم و تكون الحمر غير المجدي .

ت-الأعراض والتظاهرات السريرية.

تظهر الأعراض السريرية بعد الأشهر الأربعة الأولى من الولادة عندما يحدث التحول من إنتاج الهيموغلوبين الجنيني F إلى إنتاج الهيموغلوبين A، واستبدال السلاسل γ بالسلاسل β . وقد يتأخر ظهور الأعراض عدة أشهر وحتى عمر السنتين. وتشمل التظاهرات السريرية بالإضافة للشحوب واللون اليرقاني ، وتأخر التطور الجسمي والجنسي، تبدلات عظمية مختلفة أهمها ضخامة الوجنتين التي تعطيه سحنة السنجاب الأمريكي (السحنة المنغولية). وتظهر الصور الشعاعية اتساع المسافة التي يشغلها نقي العظم بين الصفائح العظمية للجمجمة بسبب فرط نشاط النقي. وتظهر أعراض انضغاطية بسبب تضخم الطحال والكبد إلى جانب ضخامة قلبية بسبب الفاقة الدموية المزمنة، وتشكل الحصيات الصفراوية نتيجة ارتفاع تركيز البليروبين، ويعاني المريض من مضاعفات مختلفة بسبب تراكم الحديد في الأنسجة.

ث-الموجودات المخبرية

- ينخفض تركيز الهيموغلوبين الذي قد يصل لحدود 2-3 غ/100مل
- ينخفض مستوى الهيماتوكريت عن 20% ، وتنخفض المشعرات الدموية المتمثلة بحجم الكرية الوسطي MCV ، ومحتوى الكرية الوسطي من الهيموغلوبين M.C.H ، وتركيز الهيموغلوبين الوسطي MCHC.
- تظهر لطاخة الدم المحيطي كريات حمر صغيرة الحجم ناقصة الصباغ مع وجود بعض الكريات الهدفية والكريات الحمر المنواة وأشلاء متناثرة للكريات احمر.

- زيادة معتدلة في نسبة الشبكيات (4-10٪) ، مما يشير إلى قصور استجابة النقي.

- يرتفع تركيز البيليروبين غير المباشر ، ويظهر مولد اليوروبيلين في البول

- يرتفع حيد المصل والفيريتين بشكل تدريجي.

- يظهر اختبار الهشاشة الكروية ازدياد المقاومة الحلوية للكريات الحمراء.

- يظهر الرحلان الكهربائي للهيموغلوبين أن نسبة الهيموغلوبين الجنيني (HbF)

تبلغ نحو 95-99٪ في حال الغياب التام للسلاسل بيتا، ونحو 20-80٪ في حال

نقص هذه السلاسل. أما نسبة الهيموغلوبين A₂ فتكون أقل من 6٪ ونسبة

الهيموغلوبين A تتراوح بين الصفر و1٪ لدى الغياب التام للسلاسل بيتا ومتغيرة

بحسب نسبة الهيموغلوبين F لدى نقص إنتاج هذه السلاسل.

خ-العلاج

تعتمد المعالجة على نقل الدم كل أربعة أسابيع للتغلب على أعراض فقر الدم

ونقص النمو وتأخر البلوغ، ولوضع النقي في حالة راحة، لتجنب التشوهات العظمية

وفرط نشاط الطحال ، وتضخم الكبد المرتبطة بفرط النقي غير المجدي. كما تتطلب

المعالجة التخلص من الحديد والوقاية من تراكمه في النسيج ، والذي يمكن أن يسبب

أذية الكبد والقلب وأعضاء هامة أخرى ، والتسبب بالوفاة في سن العشرين.

وتستخدم مركبات الديسفيرال (Desferioxamin) في استخلاص الحديد وطرحه

من الجسم. ويلجأ إلى استئصال الطحال بهدف التقليل من نقل الدم وإنقاذ ترسب

الحديد إلى جانب زرع نقي العظم لدى وجود متبرع متوافق. ويعطى المريض حمض

الفوليك والفيتامين C كعلاج داعم.

ح-التلاسييميا بيتا الصغرى

يعد الأشخاص المصابون بالتلاسييميا الصغرى متخالفي اللواقح من الناحية الوراثية .

فهم يمتلكون مورثة شاذة ومورثة طبيعية، أما من الناحية السريرية فهم صامتون وغير

عرضيين ،ولا يحتاجون لمعالجة. لكن يجب أن يخضعوا لدراسة وراثية قبل الزواج للحيلولة دون تزاوج حاملي الصفة. وتظهر الفحوصات المخبرية لحاملي الصفة انخفاضاً بسيطاً في تركيز الهيموغلوبين (11-12 غ/100مل) وارتفاع عدد الكريات الحمر (5.5 مليون كرية/ملم³) إلى جانب انخفاض حجم الكرية الوسطي وهيموغلوبين الكرية الوسطي وتفاوتاً في حجم الكريات وشكلها في الدم المحيطي . أما حديد المصل فيبقى ضمن الحدود الطبيعية مع ميل للارتفاع بشكل بسيط. ويظهر فحص الرحلان وجود الهيموغلوبين A2 بنسبة 3.5-7٪ ويمكن للهيموغلوبين الجنيني التواجد بنسبة 1-3٪ في 50٪ من الحالات.

2- التلاسيميا ألفا α -Thalassemia

أ- الفيزيولوجيا المرضية

التلاسيميا ألفا نادرة نسبياً وتنتشر بالدرجة الأولى في آسيا الجنوبية والوسطى، وتنجم التلاسيميا ألفا عن نقص أو غياب في اصطناع السلاسل ألفا لجزيء الهيموغلوبين ومن ثم يحدث نقص أو غياب للهيموغلوبينات الطبيعية التي يدخل في تركيبها السلاسل ألفا، وتشكل هيموغلوبينات شاذة يدخل في تركيبها سلاسل أخرى لتعويض النقص . ويعتقد بأن اصطناع السلسلة ألفا يخضع لإشراف مورثتين محمولتين على نفس الصبغي الجسدي، وبالتالي يمتلك الشخص أربع مورثات في الخلية، اثنتان من الأب واثنتان من الأم. ووفقاً لدرجة الخلل في اصطناع السلاسل ألفا (غياب مورثة أو أكثر) يمكن للتلاسيميا ألفا أن تأخذ أشكالاً مختلفة تمتد بين حاملي الصفة الصامتين الذين يمتلكون مورثة سوية واحدة على الأقل، والمولود الميت الذي يتصف بغياب تام لاصطناع السلاسل ألفا بسبب فقدان المورثات الأربع.

ب- تظاهرات المرض

يمكن للمرض أن يتظاهر بالأشكال التالية:

■ استسقاء الجنين (الموه الجنيني) **Hydrops fetalis** : وهي من أشكال

التلاسيميا الشديدة التي لا تتوافق مع الحياة، وتنجم عن خلل المورثات الأربع كلياً أو جزئياً وغياب تام لتشكيل السلاسل ألفا. ويتميز هذا الاعتلال بفقر دم شديد يكون فيه الهيموغلوبين مكوناً من أربع سلاسل غما ويعرف بهيموغلوبين بارت $HbH(\gamma 4)$ ، إلى جانب كمية ضئيلة من الهيموغلوبين $HbH(\beta 4)$. وتورث هذه الحالة من أبوين متخالفي اللواقح (حاملتي الصفة)، حيث يصاب المولود بالوذمة، وإذا لم يولد ميتاً فإنه سيموت خلال الساعة الأولى من الولادة.

■ الهيموغلوبين **H**: وهو فقر دم انحلاي يلاحظ لدى اليونانيين والصينيين، وينجم عن نقص ثلاث من المورثات الأربع الخاصة بالسلسلة ألفا، ويورث المرض من أبوين متخالفي اللواقح. ويتميز الاعتلال بتشكيل الهيموغلوبين H المكون من أربع سلاسل بيتا $HbH(\beta 4)$ ، والذي يكون مستواه غير ثابت. وتميل السلاسل بيتا للترسب خارج الكريات، أو تشكل مشتملات داخل الكريات يمكن إظهارها بصبغة الكريزيل للامعة. ويؤدي المريض ضخامة طحالية أو كبدية. ويظهر فحص لطاخة الدم المحيطي كريات صغيرة، ونقص الصباغ إلى جانب كريات هدفية وكريات متفاوتة الحجم. ويتميز الهيموغلوبين H بحركية مميزة في اختبار الرحلان الكهربائي.

■ الصفة التلاسيمية ألفا: تنجم الصفة التلاسيمية ألفا عن اضطراب مورثتين على الأرجح من المورثات الأربع، وهي صامتة سريريا، ويؤدي فلم الدم صورة مشابهة للتلاسيميا بيتا الصغرى، أما تأكيد التشخيص فيتم بإظهار نقص السلاسل ألفا، وانخفاض النسبة α/β عن الواحد.

■ الصفة التلاسيمية ألفا الخفيفة: وهي شكل خفيف من التلاسيميا ألفا شائع الانتشار لدى الهنود وشبه الجزيرة العربية وغرب أفريقيا. ويرجح أن تنتج هذه الحالة عن نقص إحدى المورثات الأربع .

■ التلاسيميا $\beta\delta$: يتصف هذا الاعتلال بنقص إنتاج السلاسل بيتا ودلتا. وتترافق هذه الحالة بفقر دم غير حاد عند متمثلي اللواقح ، حيث يتراوح مستوى الهيموغلوبين بين 9 و12 غ/100 مل ، ويظهر فلم الدم كريات صغرية، ويتألف هيموغلوبين المريض من الهيموغلوبين الجنيني مع غياب تام للهيموغلوبين A والهيموغلوبين A2.

■ اشتراك التلاسيميا ألفا والتلاسيميا بيتا: تظهر هذه الحالة عندما يكون أحد الأبوين مصابا بالتلاسيميا ألفا والآخر مصابا بالتلاسيميا بيتا. ونظرا لكون تركيب نمطي السلاسل مشبعا بشكل متساو، فإن النسبة α/β تكون مساوية للواحد، ولا يوجد فائض في أي من نمطي السلاسل، وتترافق هذه الحالة عموما بفقر دم خفيف نسبيا.

ثالثا- الاضطرابات المشتركة

تشمل الاضطرابات المشتركة الاعتلالات الناجمة عن تشارك الاضطرابات الكمية والاضطرابات الكيفية في سلاسل الهيموغلوبين. وتعد التلاسيميا بيتا المنحلية من أهم هذه الاعتلالات سريريا. ينجم هذا المرض عن وراثة الصفة المنحلية من أحد الأبوين والصفة بيتا من الأب الآخر. وهو يفضي إلى فقر دم انحلالي خلقي مختلف الشدة يصادف عادة عند سكان البحر الأبيض المتوسط وسكان افريقيا الوسطى. و يترافق المرض بضخامة طحالية في 70٪ من الحالات، ويمكن مشاهدة كافة مظاهر انسداد الأوعية الملاحظة لدى المنحليين إلا أن النوبات الألمية أقل حدوثا وأقل شدة. ويظهر فحص لطاخة الدم المحيطي كريات صغرية ناقصة

الصبغة مع تعدد اللون إلى جانب كريات هدفية وكريات مرقطة وأحيانا كريات منجلية. تتراوح نسبة الهيموغلوبين S بين 60 و90% والهيموغلوبين F بين 10 و30%، فيما تبلغ نسبة الهيموغلوبين A نحو 10-30% عندما تكون المورثة بيتا قادرة على إنتاج بعض سلاسل الهيموغلوبين A. أما لدى مرضى التلاسيميا بيتا الكبرى المنجلية فيغيب تماما الهيموغلوبين A ، وبالتالي يصعب تمييز هذه الحالة عن فقر الدم المنجلي متمثل اللواقع HbSS. ولا يحتاج أغلب المرضى لعناية طبية دقيقة أو معالجة نوعية ، وقد يكون استئصال الطحال مفيدا إذا كان يحتجز كميات هامة من الكريات الحمر.

القصل الثامن

فقر الدم الانحلالي غير المرتبط بخلل تركيب الكريات الحمر

يرتبط انحلال الكريات بعوامل خارجية غالباً ما تكون مكتسبة ومرتبطة بمسببات مختلفة، مناعية ، فيزيائية ، حمجية ، فرط نشاط الطحال ، الأورام والأمراض الجهازية.

أولاً: فقر الدم الانحلالي المناعي

يصنف فقر الدم الانحلالي المناعي في مجموعتين رئيسيتين: الانحلال المناعي الذاتي، والانحلال المناعي بعدم توافق الزمر الدموية.

1- فقر الدم الانحلالي المناعي الذاتي Autoimmune hemolytic anemia

يتصف فقر الدم الانحلالي الذاتي بوجود أضداد ذاتية موجهة ضد الكريات الحمر صنف في مجموعتين: الأضداد الساخنة والأضداد الباردة والتي تثبت على سطح الكريات الحمر ، مما يؤدي إلى تعرفها من قبل خلايا النسيج الشبكي البطاني لكل من الكبد والطحال وحدوث فرط انحلال دموي.

أ- فقر الدم الانحلالي المناعي الذاتي بالأضداد الساخنة

يتصف هذا المرض بوجود الأضداد الساخنة من نوع IgG ، والتي تكون فعالة في درجة حرارة الجسم (37 درجة مئوية) . ويحصل الانحلال بسبب تعرف خلايا النسيج الشبكي البطاني للطحال على الكريات المغلفة بهذه الأضداد. ويكون الانحلال أكثر شدة عندما يترافق وجود الغلوبولينات المناعية (IgG) إلى جانب أحد بروتينات المتممة (C3) على سطح الكريات الحمر.

مسببات المرض وتظاهراته

إن وجود الأضداد الساخنة والخلل الدم يكون بدنيا مجهول السبب في 50٪ من الحالات أو ثانويا مرافقا لبعض الأمراض التي تؤثر على الجملة الناعية، مثل الابيضاض اللمفاوي المزمن، والذئبة الحمامية المنتشرة والأورام اللمفاوية، وأورام المبيض والتموس. ويمكن للخلل المناعي أن يحدث لدى تناول ثلاثة أنواع من الأدوية لكل منها آلية عمله الخاصة وتشمل:

- تناول ألفا ميتيل دوبا الذي يحدث فقر دم انحلاي مناعي مشابه لذلك المحدث بالأضداد الساخنة .
- تناول البنسيلين والصادات الحيوية المشابهة والتي تتحد مع سطح الكريات الحمر محرضة تشكل أضدادا نحو معقد الكرية -الدواء.
- تناول الأدوية التي تشكل معقدات مع بروتينات المصورة محرضة تشكل أضداد ومن ثم يتم تثبيت معقد الدواء-البروتين- الضد على سطح الكريات الحمر أو الصفائح مورطا إيها في حدثيات تخريبية بتثبيت المتممة على أساس المتفرج البريء. ويكون هذا النوع من الانحلال قليل المشاهدة رغم أن الأدوية المسببة له شائعة الاستعمال مثل الكينين والفيناستين والسلفوناميدات، ومختلف قاتلات الحشرات.

يحدث فقر الدم الانحلاي المناعي الذاتي بالأضداد الساخنة في كل الأعمار وتكون نسبة الإصابة لدى الإناث أعلى من الذكور وهي أكثر شيوعا لدى الكهول من الشباب. وتتباين شدة المرض وشدة فقر دم انحلاي خفيف مع كمية قليلة من الأضداد إلى فقر دم انحلاي صاعق قد يكون مميتا يتميز بوجود كمية كبيرة من الأضداد. ويترافق المرض بأعراض سريرية تشتمل على ضخامة الكبد أحيانا وترفع حروري مع آلام بطنية لدى بعض المرضى ، ويحدث عادة حثار في الأوردة وبخاصة أوردة الساق العميقة .

الموجودات المخبرية

- إيجابية اختبار كومب المباشر في الأشكال الخفيفة، أما في الأشكال الشديدة فيكون كل من اختبار كومب المباشر وغير المباشر إيجابيا لل IgG، وكذلك ل C3.

- ينخفض مستوى الهيموغلوبين إلى مستوى 7 ملغ/100 مل، و يرتفع تركيز البليروبين، وينخفض مستوى الهبتوغلوبين. وتترافق الحالات الشديدة بظهور الميتهموبومين وبيلة هيموغلوبينية.

- يظهر فحص اللطاخة الدموية كريات صغيرة مكورة، وترتفع نسبة الشبكيات إلى حدود 30%، وقد يشاهد نقص في الصفائح.

العلاج

يعتمد العلاج على انقاص الأضداد وتخفيض تخرب الكريات من خلال إعطاء الستيروئيدات القشرية بتركيز كبيرة (البردينيزولون 1 ملغ/كغ/يوم)، والتي تثبط تشكل الأضداد وتعرفها من قبل خلايا الحملة الشبكية البطانية. و يجب استبعاد الأدوية المعروفة بإحداثها للانحلال المناعي. وفي الحالات الشديدة يعتمد إلى نقل الدم. أما استئصال الطحال فيلجأ إليه عندما لا يتحمل المرضى المعالجة بالستيروئيدات، وذلك لتجنب حدوث خثرات مميتة بسبب ارتفاع عدد الصفائح بعد العملية.

ب- الانحلال المناعي الذاتي المسبب بالأضداد الباردة

توجد الأضداد الباردة التي تكون فعالة في درجة حرارة منخفضة تتراوح بين 4 و 24 درجة مئوية في مصول معظم الأشخاص الأسوياء بتركيز بسيطة. إلا أن هذه الأضداد يمكن أن تسبب انحلالا دمويًا لدى ارتفاع تركيزها في درجات الحرارة المنخفضة يكون على علاقة بتراس الكريات إلى جانب انحلالها بتثبيت المتممة C3 في حالتين اثنتين:

■ الانحلال بالأضداد الباردة من نمط الغلوبولينات المناعية M (IgM) والموجهة نحو المستضد I₁ على سطح الكريات الحمر. وتحدث هذه الحالة تلقائيًا في

درجات الحرارة شديدة الانخفاض من جراء تراص الكريات وانحلالها وسد الأوعية الدموية في أجزاء الجسم المعرضة للحرارة المنخفضة مثل أصابع اليدين والقدمين والأنف والأذنين التي تصاب بالزراق مع حس النمل والحدرد. وتعالج تظاهرات هذا المرض باتخاذ الإجراءات التي تمنع التعرض للبرد وتدفئة المريض. وغالبا مايرافق الانحلال المزمن الأمراض اللمفية التكاثرية (اللمفومات) ، وهناك أنواع انتقالية ترافق الإصابة بالمفطورة الرئوية وفرط الوحيدات الحمجي والتي تعالج بمكافحة السبب وإعطاء الستيروئيدات.

■ الانحلال بالأضداد من نمط الغلوبولينات المناعية $G(IgG)$ والموجهة نحو المستضد P على سطح الكريات الحمر. وتعرف هذه الحالة بالبيلة هيموغلوبينية البردية الإنتيائية. وتثار الهجمات بالتعرض للبرد وتترافق ببيلة هيموغلوبينية إلى جانب ألم في الظهر والساقين والبطن، ويكون المرضى لا عرضيين في الفترات بين الهجمات. وبينما لا توجد علاجات نوعية للحالات الأولية، فإن الحالات الثانوية المرافقة للحصبة والنكاف تشفى بشفاء المرض.

2- فقر الدم الانحلالي المناعي بعدم توافق الزمر الدموية

يحدث انحلال الدم إما بسبب عدم توافق الزمر الدموية أثناء نقل الدم بين المعطي والأخذ، أو عدم توافق الزمر الدموية بين الأم والجنين (انحلال الدم عند الوليد).

أ- انحلال الدم المناعي أثناء نقل الدم: تنجم الفاقة الانحلالية بسبب عدم توافق بين زمرة المعطي وزمرة المتلقي بالنسبة للمجموعة ABO أو المجموعة Rh .


يؤدي عدم توافق زمرة المعطي والمتلقي بالنسبة للمجموعة ABO إلى انحلال دموي حاد داخل الأوعية يترافق مع بيلة هيموغلوبينية ونقص حاد في الهبتوغلوبين والهيموبكسين وترفع حروري مع آلام وقلق وضجر وتبيغ الوجه، إلى جانب تسرع التنفس وتسرع القلب والغثيان ثم تظهر موجودات القصور الكلوي.

أما عدم توافق زمرة المعطي والمتلقي بالنسبة للمجموعة Rh (معطي إيجابي ومتلقي سلبي) فيسبب انحلالاً دموياً خارج الأوعية يبدى تظاهرات سريرية أقل شدة من تلك الملاحظة في الانحلال داخل الأوعية، حيث يصاب الشخص بالحمى والفتور والصدمة و نادراً ما يترافق الانحلال ببيلة هيموغلوبينية أو قصور كلوي، وتشمل الموجودات المخبرية بارتفاع تركيز البيليروبين غير المباشر.

ب- انحلال الدم عند الوليد . يحدث انحلال الدم عند الوليد بسبب عبور الأضداد من دم الأم إلى دم الجنين وتحريض حداثات تراص كريات الجنين وانحلالها، حيث يولد الطفل مصاباً بفقر دم انحلالي مختلف الشدة، يمتد من اليرقان الخفيف، مروراً باليرقان الوخيم الذي يترافق بخلل عقلي، وحتى الموه الجنيني حيث يولد الطفل ميتاً . وتنجم هذه الحالة إما عن عدم توافق الجملة Rh أو عن عدم توافق الجملة ABO بين الأم و جنينها.

■ انحلال الدم عند الوليد بسبب عدم توافق الجملة Rh.

تضم المجموعة Rh عدداً من المستضدات (الأجسام المولدة للضد) على سطح الكريات الحمر، يعد المستضد D أكثرها شدة وأهمية. ويوصف الأشخاص الذين يملكون هذا المستضد بأنهم إيجابيو الريزوس، بخلاف الأشخاص الذين لا يملكون هذا المستضد ويوصفون بأنهم سالبو الريزوس. ولا يحتوي دم الأشخاص إيجابيو الريزوس أضداداً (أضداداً) موجهة نحو المستضد D، إلا أن هذه الأضداد يمكن أن تتشكل بعد التماس الأول لدم إيجابي الريزوس مع دم سالب الريزوس. وتعمل هذه الأضداد على التفاعل مع المستضدات الموافقة على سطح الكريات الحمر مغيرة خواص غشائها، بحيث يمكن لخلايا النسيج الشبكي البطاني التعرف عليها في الطحال وتخريبها.



الشكل 7-3: انحلال الدم المناعي لجنين إيجابي الريزوس لدى أم سلبية الريزوس

يحدث انحلال الدم عند الوليد بالتوصيف المذكور أعلاه عند حصول حمل لأم سلبية الريزوس بجنين إيجابي الريزوس، وعبور كريات الجنين إيجابية الريزوس إلى دم الأم التي تخضع خلايا الحمل المناعية لديها على إنتاج الأضداد الموافقة (الشكل 7-3). وتستطيع الأضداد المتشكلة في دم الأم العبور إلى دم الجنين محترضة حدوثات تراص، وتخرب كرياتة الحمر.

وفي الحال السوية لا يمكن لكريات الجنين العبور إلى دم الأم بسبب انفصال الدوران في المشيمة. لكن يمكن لهذه الكريات العبور إلى دم الأم وتحسيسه لدى تخرب أو إصابة الحاجز بين الدورانين، و يحصل غالباً أثناء الولادة أو قبلها بسبب المرض أو التهديد بالإسقاط.

وعادة لا يتأثر الحمل الأول لأم سلبية بجنين إيجابي الريزوس نظراً لقلّة كمية الأضداد المتشكلة في دم الأم والقادرة على العبور إلى دم الجنين. فتحسيس الجهاز المناعي للأم يتطلب نحو 40-120 يوماً قبل أن يتم إنتاج الأضداد بشكل ملحوظ، كما أن الأضداد الأولى المتشكلة تكون من نمط الغلوبولين المناعي M (IgM)، وهي كبيرة الجزيء وغير قادرة على عبور المشيمة. إلا أنه بمرور الوقت ينخفض معدل إنتاج الغلوبولين المناعي M ليحل محله الغلوبولين المناعي G (IgG) صغير الجزيء والقادر على عبور المشيمة. ولدى تكرار حمل الأم المنعّة

بجنين إيجابي الريزوس، فإن الأضداد من نمط الغلوبولين G سوف تعبر إلى دم الجنين وتعمل على إثارة حدثيات التكاثر الكريات وتخرها في الطحال، حيث يولد الطفل مصابا بفقر دم شديد يؤدي إلى الموت أحيانا.

■ تظاهرات المرض وتشخيصه.

يولد الطفل شاحبا مصابا بفقر دم مع ضخامة كبدية وطحالية، وقد يحدث تضخم القلب والوذمات، أما إذا ولد الطفل ميتا فيكون متورما وذا رأس كبير، وهو ما يعرف بموه الوليد.

ولا يصاب الوليد في الرحم باليرقان، إنما يظهر ذلك بعد يوم تقريبا من الولادة. فالجنين يتخلص من البليرويين الناتج عن تحطم الكريات الحمر بواسطة المشيمة، أما بعد الولادة فلا يستطيع كبد الوليد ربط البليرويين وطرحه بشكله المرتبط بسبب عدم قدرته على إنتاج الأنزيم الذي يتوسط هذه العملية. ويؤدي تراكم البليرويين الحر (غير المرتبط) إلى ترسبه في مختلف أنسجة الجسم، بما فيها خلايا الدماغ مسببا اضطرابات عصبية غير قابلة للتراجع، تتجلى بتخلف عقلي واضطرابات حركية. وتعرف هذه الحالة باليرقان النووي التي يمكن أن تكون مميتة في الحالات الشديدة. وإلى جانب انخفاض مستوى الهيموغلوبين وارتفاع مستوى البليرويين يبدي فحص اللطاخة الدموية أرومات الكريات الحمر السوية بأعداد كبيرة ولذلك يعرف هذا

المرض بداء أرومات الحمر الجنيني *Fetalis Erythroblastosis*.

■ تقييم شدة الإصابة والوقاية من المرض.

يتم تقدير شدة المرض لدى الأم الحامل قبل الولادة من خلال معايرة الأضداد لدى الأم وتقدير كميتها، حيث يشير ارتفاع معدل الأضداد إلى إصابة الوليد وترتبط شدة الانحلال بمستوى الأضداد، ويمكن تحري إمكانية إصابة الطفل بالمرض من خلال بزل السائل الأمنيوسي ومعايرة مستوى البليرويين الذي يشير ارتفاعه عن المستوى الطبيعي إلى أن الوليد سوف يصاب بالمرض.

وللوقاية من المرض تعطى الأم التي تبدي اختبارا إيجابيا لوجود الأضداد، خلال 48-72 ساعة الأولى التالية للولادة أضدادا موجهة نحو المستضد D تعمل على تغليفه، ويمنع تحسيس الجهاز المناعي لدى الأم. ويمكن لعدم توافق الزمرة الدموية الخاصة بالمجموعة ABO بين الأم وجنينها أن يلعب دور وقاية طبيعية إلى حد ما. فمثلا يمكن للراصات لدى أم زمرة (O-) أن تتفاعل مع المستضدات الموافقة في كريات جنين زمرة (A+) أو (B+)، وتعمل على تحريبها قبل أن تتاح لها الفرصة الكاملة لتحسيس جهاز المناعة لدى الأم، وبخلاف ذلك فإن التوافق التام في الزمرة ABO بين الأم وجنينها سوف يزيد من احتمال التحسس وشدة.

■ العلاج

تختلف الوسائل العلاجية باختلاف شدة الإصابة، فإذا كان الوليد يعاني من فقر دم فقط فكل ما يحتاجه هو نقل كريات دم مركزة خلال الأيام الأربعة الأولى من عمره. أما إذا كان الوليد مصابا باليرقان نتيجة ارتفاع مستوى البليرويين غير المرتبط، فيعتمد إلى العلاج الضوئي المتمثل بتعريض الطفل لضوء الشمس أو وضعه في حاضنة مجهزة بضوء مفلور، حيث يعمل الضوء على تحطيم البليرويين في الأوعية الشعرية للجلد. وقد تمتد فترة المعالجة إلى أسابيع أو أشهر حتى ينضج الكبد ويصبح قادرا على التخلص من البليرويين بنفسه. وقد يعتمد إلى تبديل دم الوليد عندما يكون مستوى البليرويين مرتفعا لدرجة تمكنه من تشكيل خطر على حياة الوليد وذلك بهدف التخلص من البليرويين الموجود في الدم. وتتم عملية تبديل الدم في شروط معينة وبتقنية خاصة يتم بموجبها نقل كمية من الدم تعادل ضعف حجم دم الوليد من نفس زمرة الوليد سلبية الريزوس. وتجري عملية التبديل عن طريق الحبل السري أو أوردة فروة الرأس على دفعات، حيث يسحب كمية من الدم مقدارها 25 مل، ثم تحقق كمية مماثلة لها حتى يتم نقل كامل كمية الدم المقررة. ويمكن تحريض المخاض وتوليد الجنين في فترة متأخرة من الحمل عندما تشير كل

الدلائل على أن الجنين مصاب بشدة، ومن ثم يعالج الطفل الخديج. أما إذا تعذر تحريض المخاض، فيعمد إلى نقل الدم إلى الجنين وهو داخل الرحم بهدف التغلب على فقر الدم، ويمكن من خلال تطبيق الطريقة الأخيرة إنقاذ نحو 25-50٪ من الأطفال الذين لم يكن لهم أمل بالحياة.

■ انحلال الدم عند الوليد بسبب عدم توافق الجملة ABO.

تحدث أمراض الدم الانحلالية لدى الوليد بسبب تنافر زمرة دم الجنين الخاصة بالجمموعة ABO مع زمرة الأم للمجموعة نفسها. وبالرغم من كون الانحلال بهذه الطريقة أكثر شيوعاً مقارنة بالانحلال الناجم عن تنافر الجملة Rh إلا أنه نادراً ما يكون شديداً ويمكن أن يهدد بأشكالها الخفيفة. ومن أكثر أشكال الانحلال شيوعاً تلك التي تحدث عندما تكون زمرة الأم (O) وزمرة جنينها (A) أو (B) حيث يكون احتمال إصابة الجنين في هذه الحالة هو حالة من بين خمسة حالات.

وفي الحالات النموذجية يكون الانحلال خفيفاً ويصاب الوليد باليرقان خلال اليوم الأول من عمره، حيث يظهر فحص الدم انخفاضاً خفيفاً في مستوى الهيموغلوبين وارتفاعاً بسيطاً في الشبكيات إلى جانب بعض الخلايا المكورة. ونادراً ما يعاني الوليد من فقر الدم، ولم يحدث إطلاقاً أن مات الجنين داخل الرحم نتيجة ذلك. وقد لا يصاب الجنين الأول إلا أن إصابة الأجنة التالية تكون متزايدة. ونادراً ما يحتاج الوليد إلى علاج ويعد نقل الدم العلاج الرئيسي عندما تكون الإصابة شديدة. ويجب أن لا يحتوي الدم المنقول على المستضد A أو B، حيث يأخذ دم تم التبرع به حديثاً زمرة (O)، وتزال منه المصورة وتغسل الكريات بمحلول فيزيولوجي ملحي ثم يضاف إليه مصورة دم زمرة (AB)، وينقل الدم إلى الوليد بعد إجراء اختبار التصلب مع دم الأم.

ثانيا: فقر الدم الانحلالي الميكانيكي

يحدث فقر الدم الانحلالي الميكانيكي نتيجة تعرض الكريات الحمر للرض والتمزق داخل الأوعية في ظروف رئيسية ثلاثة: الانحشارات الخارجية كما في البيلة الهيموغلوبينية الرضية، مرور الكريات من خلال فتحات ضيقة أو تلاطمها بأجسام غريبة في القلب واعتلالات الأوعية الدقيقة.

1- الانحشارات الخارجية : وتعرف هذه الحالة بالبيلة الهيموغلوبينية الرضية،

وتنجم عن تعرض الكريات الحمر للرض والتمزق أثناء عبورها في الأوعية الصغيرة التي تمر فوق بوارز عظمية أثناء مختلف الفعاليات الفيزيائية مثل المسير الطويل وممارسة الكارتيه ودق الطبول. ويتظاهر المرض بعلامات الانحلال داخل الأوعية والمترافقة بانخفاض الهيموغلوبين وبيلة هيموغلوبينية، دون أن يظهر فحص اللطاخة الدموية شذوذا في شكل الكريات أو حطام الكريات المنشقة. ولا تتطلب هذه الحالات علاجاً نوعياً.

2- الانحلال المرتبط بمسببات قلبية: يحدث الانحلال بسبب تفتت الكريات وتخربها

أثناء مرورها في القلب وتلاطمها بألياف الليفين المترسبة على الصمامات البديلة مثل الصمام الأهرري البديل، والصمام التاجي البديل. ويلاحظ كذلك نقص نصف عمر الكريات في تضيق الأهر المتكلس والجراحات الترقيعية للقلب.

ويتظاهر المرض بانخفاض مستوى الهيموغلوبين إلى نحو 5-7 غ/100، وانخفاض مستوى الهبتوغلوبين، وارتفاع مستوى أنزيم اللاكتات ديهيدروجيناز (LDH)، ويرافق المرض ببيلة هيموغلوبينية، ويمكن أن يؤدي فقدان الهيموغلوبين في البول إلى عوز الحديد. ويظهر فحص اللطاخة الدموية فئات الكريات المخربة (المنشقة)، وترتفع نسبة الشبكيات. وتعتمد المعالجة على تعويض عوز الحديد بإعطاء مركبات الحديد فمويًا، وتخفيض سرعة

الانحلال من خلال تخفيض الجهد المطبق على القلب بالحد من الإجهاد الفيزيائي، وفي حال فشل هذه الإجراءات يعتمد إلى ترميم التسرب حول الصمامات البديلة، أو استبدالها بصمامات خزيرية.

3-الاعتلالات الوعائية الدقيقة: يحدث الانحلال نتيجة ترسب الليفين في الأوعية الدقيقة، الأمر الذي يعرض الكريات لعائق فيزيائي يعمل على تقطيع أغشيتها وتخربها داخل الأوعية. ويحصل ترسب الليفين في جدران الأوعية في ثلاث حالات رئيسية:

- شذوذ جدران الأوعية المرافق لعدد من الاضطرابات: مثل فرط الضغط الشرياني الحبيث ورفض الغرس الكلبي من ذات الجنس والسرطانات المنتشرة، وخاصة السرطانات الغدية المفردة للمخاط. وتكون درجة الانحلال في هذه الاضطرابات خفيفة للغاية رغم ارتفاع عدد الفتات والكريات المحطمة في الدم المحيطي والنقص الشديد للصفائح عند بعض المرضى. وتتم معالجة الانحلال من خلال السيطرة على المرض الأساسي.
- فرغرية نقص الصفائح الخثارية والمتلازمة الانحلالية البوريمية. وهما متلازمتان خطرتان ومجهولتا السبب ويعد انحلال الدم من أهم ملاحظتهما البارزة.

-تصيب فرغرية نقص الصفائح الخثارية مختلف الأعمار وهي شائعة في المقام الأول لدى الشباب، وخاصة النساء. يؤدي تحرب الكريات إلى فقر دم انحلالي مترافق بانخفاض عمر الصفائح وعدده وبتظهور الكريات المنواة وارتفاع نسبة الشبكيات في الدم المحيطي. ويظهر فحص النقي فرط تكون الحمر وازدياد في عدد النوات. وقد يعاني بعض المرضى من نزوف خطيرة (رحمية أو هضمية وغيرها) وبصاف معظمهم بالحمى ويعانون من آلام في البطن

والمفاصل والغثيان، وقد يكون الطحال والكبد محسوسين. وبترقى المرض يصاب الدماغ والكليتان حيث يعد خللهما الوظيفي السبب الرئيس للوفاة لدى معظم المرضى. ويتجلى هذا الخلل ببيلة بروتينية دموية مع نقص كمية البول وباعراض عصبية متنوعة كالتخليط والحبسة ونقص الساحة البصرية، وفقدان الوعي حيث تنتهي بالسبات والموت.

-أما المتلازمة الانحلالية اليوريمية فتشاهد لدى الصغار عادة، وتشبه مظاهرها السريرية والمخبرية تلك المشاهدة في فرغرية نقص الصفائح الخثارية، باستثناء كون التظاهرات العصبية قليلة الحدوث. ويفيد في علاج هاتين المتلازمتين تبديل الدم والتحال إلى جانب تطبيق العلاج بالستيروئيدات القشرية والهيبارين واستئصال الطحال.

■ -التخثر المنتشر داخل الأوعية. تتميز هذه الحالة بازدياد فعالية آلية التخثر في الدم وتشكل خثرات متعددة في أوعية الجسم. ويؤدي احتجاز الكريات الحمر في شبكة الليفن للخثرات المتشكلة في الدوران المجهرى إلى تأذي الكريات وتخربها وأحداث فقر دم انحلاى يتميز بوجود كريات مجزأة عند نحو 30% من المرضى.

الفصل التاسع

فقر الدم العرضي (الثانوي)

يحدث فقر الدم العرضي كاختلاط مرافق للعديد من الأمراض المزمنة والالتهابات المدبدة، مثل القصور الكلوي، وأمراض الغدد الصم، وأمراض الكبد المزمنة، وأمراض الغراء، وكذلك بنتيجة الإصابة بالأمراض الخبيثة. وتختلف شدة فقر الدم الذي يكون عادة سوي الصباغ سوي الكريات حسب نوع المرض وشدته. وتعالج هذه الفاقات بمعالجة أسباب المرض بصورة رئيسية.

1- فقر الدم المرافق للقصور الكلوي: تترافق أمراض الكلية المزمنة بفقر دم مرتبط بقصور استجابة النقي أو بقصر عمر الكريات الحمر.

يرتبط نقص إنتاج الكريات الحمر بحالات القصور الكلوي المترافقة بتأذي وظيفة الكلية المنتجة لمكون الحمر (الأريتروبويتين). ويمكن أن يبط إنتاج النقي أيضا بتراكم المواد السامة التي تطرح عادة عن طريق الكليتين. وهناك علاقة بين شدة فقر الدم ونسبة البولة في الدم حيث يعد فقر الدم في اليوريميا Uremia عرضا ملازما للقصور الكلوي. ويكون فقر الدم عادة من النمط سوي الكريات سوي الصباغ وقد تلاحظ كريات مشوكة لدى ثلث المرضى. أما نقص عمر الكريات فيشكل المكون الانحلالي لفقر الدم في المرض الكلوي، كما هو الحال في فقر الدم الانحلالي المرافق لفرفرية نقص الصفيحات الخثارية والمتلازمة الانحلالية اليوريمية، والتي تترافق بتغيرات وصفية في شكل الكريات الحمر: إلى جانب ارتفاع نسبة الشبكيات. ومن الأسباب التي تزيد فقر الدم شدة في أمراض الكلية المزمنة نقص الحديد بسبب فقدان الدم وغسيل الكلية المتكرر، وكذلك الأدوية التي يتناولها المريض، ويعالج فقر الدم بعلاج المرض الكلوي.

2- فقر الدم المرافق للأحماج: تترافق الأحماج المزمنة أو الحادة، ولاسيما تلك التي تترافق باضطرابات جهازية بفقر دم خفيف أو معتدل الشدة ينتج عن عجز النقي في

تعويض قصر عمر الكريات إما بسبب نقص إنتاج مكون الحمر أو عدم استجابة النقي بشكل مناسب . ويتصف فقر الدم باضطراب استقلاب الحديد، حيث ينخفض حديد المصل ومستوى الترانسفيرين وسعة الرابطة الإجمالية ،فيما يلاحظ زيادة ترسبه في خلايا الجملة الشبكية البطانية ونقص مستواه في الأرومات الحديدية التي يقل عددها في النقي. كما يزداد نحاس المصل ويزداد تركيز البروتوبورفيرين الحر في الكريات الحمر نتيجة اضطراب استقلاب الحديد فيها. أما مستوى الهيموغلوبين فينخفض بشكل بسيط ونادرا ما يهبط إلى أقل من 9 غ/100 مل عندما يكون هناك عامل آخر مرافق للأحماج، مثل النزوف أو القصور الكلوي. ويظهر فحص اللطاخة الدموية كريات حمر سوية الحجم ناقصة الصباغ، ونادرا ما تكون صغيرة الحجم ناقصة الصباغ مع تغيرات طفيفة في الشكل والحجم. و لا تلاحظ عادة تغيرات ذات شأن في نسبة الشبكيات، وكذلك في مستوى بيليروبين المصل. أما فحص النقي فيظهر زيادة طفيفة في خلويته على علاقة بنقص إنتاج السلالة الحمراء وزيادة إنتاج السلالة البيضاء. وبينما ينخفض عدد الأرومات الحديدية ، يزداد ترسب الحديد في خلايا الجملة الشبكية البطانية للنقي. ولعلاج فقر الدم يجب أن توجه الإجراءات العلاجية نحو المرض الخمجي ومسبباته باستخدام المضادات الحيوية.

3- فقر الدم المرافق لأمراض الغراء: تترافق مختلف أمراض الغراء كالداء الرثياني وتصلب الجلد ، والذئبة الحمامية، والتهاب الشرايين المتعدد العقدي، بفقر دم سوي الصباغ متوسط الشدة يمتلك جميع مواصفات فقر الدم الخمجي. وقد تترافق بعض أمراض الغراء مثل الداء الرثياني بفقر دم بنقص الحديد ينجم عن نزوف هضمية مرتبطة بتعاطي الأدوية مثل الأسبرين والكورتيزون. وفي حالات أخرى يصادف فقر دم الخلايا منيع للذات، كما في الذئبة الحمامية أو ناجم عن عامل خارجي طبيعته غير معروفة كما في الداء الرثياني. ويترافق الداء الرثياني في حالات نادرة بفقر دم كيري الخلايا (عرطل) مرتبط بوجود أضداد موجهة نحو الخلايا الجدارية للمعدة. ويشاهد لدى بعض مرضى

الداء الرئوي ضخامة طحالية مع ضخامة عقد لمفاوية متعممة ، أما في الذئبة الحمامية فتترافق ضخامة الطحال لدى بعض المرضى بنقص الكريات البيض أو نقص الصفيحات الدموية.

4- فقر الدم المرافق للخباثة. تترافق معظم الأورام الخبيثة بفقر دم مسبب بآليات مختلفة. فقد يكون فقر الدم من النمط السوي الصباغ سوي الكريات ومرتبطة بالإصابة الحمجية للورم نفسه أو إصابة حمجية ثانوية ويمتلك جميع مواصفات فقر الدم الحمجي. وقد يكون فقر الدم ناتجا عن فقدان الدم المرافق لخباثات الجهاز الهضمي ويكون من النمط سوي الكريات سوي الصباغ، إذا كان التزيف حادا ومن النمط ناقص الصباغ صغير الكريات إذا كان التزيف مزمننا. وتترافق الأورام في حالات نادرة بفقر دم انحلالي ذاتي غير مرتبط بوجود الغلوبولينات المناعية أو فقر دم انحلالي مرتبط باعتلال الأوعية الدقيقة عندما يكون الورم واسع الانتشار. وبعد انتشار الورم إلى النقي من الأسباب الشائعة لفقر الدم الذي يكون عادة من النمط سوي الصباغ سوي الكريات ويمكن أن يكون كبري الخلايا مع زيادة متوسطة في نسبة الشبكيات . ولدى بعض المرضى يشاهد في الدم المحيطي أرومات الحمر وكريات ذات أشكال شاذة وخاصة عندما تشارك مع تصلب النقي الناجم عن الانتقالات الورمية .

5- فقر الدم المرافق لقصور الغدد الصم: تترافق بعض حالات قصور الغدد الصم مثل قصور الدرق وقصور الأبناس وداء أديسون وقصور النخامى بفقر دم متوسط الشدة يكون عادة من النمط سوي الكريات سوي الصباغ. ومن المحتمل أن يكون فقر الدم المرافق لقصور الدرق وقصور النخامى علاقة بنقص الحاجة للأكسجين بسبب انخفاض معدل الاستقلاب. وقد تترافق بعض حالات قصور الدرق بفقر دم وييل (كبير الكريات) بسبب وجود أضداد موجهة نحو الخلايا الجدارية إلى جانب الأضداد المضادة للدرق. وفي حالات أخرى قد يترافق قصور الدرق بفقر دم بنقص الحديد على علاقة

بالثروف وبخاصة الطمئية والرحمية. وتصحح فاقات الدم المرافقة للقصور الصماوي بإعطاء الهرمون الملانم.

6- فقر الدم المرافق لأمراض الكبد: تترافق الآفات الكبدية المزمنة، وخاصة تلك الناجمة عن تعاطي الكحول بفقر دم مختلف الشدة، يكون على علاقة بالتأثير المثبط المباشر للكحول على تكون الدم وباضطراب الاستقلاب المرافق للإصابة الكبدية. ويمكن أن يكون فقر الدم من النمط صغير الكريات ناقص الصباغ بسبب الثروف الشديدة من دوالي المري أو المعدة أو القرحة الأثنى عشرية لدى الكحوليين بسبب قلة الصفائح وعوز عوامل التخثر. وقد يحصل أحيانا فقر دم عرطل ناجم عن عوز حمض الفوليك بسبب نقص الوارد الغذائي. وفي بعض حالات تشمع الكبد تظهر علائم فرط الطحالية وفقر دم انحلاي لا يتأثر باستئصال الطحال ويترافق نقص عمر الكريات الحمر بوجود بعض الكريات الهدفية والكريات القموية وزيادة متوسطة في نسبة الشبكيات. ويصح فقر الدم الكبدي عادة لدى استعادة الكبد لوظيفته السوية.

7- فقر الدم المرافق للثروف الحادة: ينجم فقر الدم عن فقدان كمية كبيرة من الدم نتيجة لجرح أو آفة نزفية حادة. يكون فقر الدم من النمط سوي الحجم سوي الصباغ مع نسبة هيموغلوبين وهيماتوكريت طبيعية بادية الأمر. ويبدأ مستوى الهيموغلوبين والهيماتوكريت بالانخفاض بعد الساعات الثلاث الأولى ويكون على أشده بعد 48 - 72 ساعة. وإلى جانب ظهور الشبكيات وبعض الأرومات الحمر في الدم المحيطي يرتفع تعداد الكريات البيض وتعداد الصفائح. ويعالج فقر الدم بإيقاف التريّف وإعادة حجم الدم إلى ما كان عليه بنقل الدم. وتعطى مركبات الحديد لتعويض المخزون وتسريع تكون الدم.

الفصل العاشر

فقر الدم اللاتنسجي (اللاتكوي)

A plastic Anemia

يعرف فقر الدم الناجم عن عدم قدرة النقي على إنتاج الكريات الحمر أو نضجها والمرتبط بأذية الخلايا الجذعية المولدة لسلالة الكريات الحمر بفقر الدم اللاتنسجي (عدم تنسج الحمر الصرف) . وفي معظم الحالات يعد فقر الدم اللاتنسجي أحد مكونات فقر الدم اللاتنسجي الشامل الناجم عن أذية الخلايا الجذعية متعددة القدرات ، واضطراب كافة السلالات الدموية المولدة لكل من النقويات والتواءات إلى جانب السلالة الحمراء ، وما ينجم عنها من قلة شاملة في مجموع العناصر المكونة للدم (الحمر والبيض والصفائح) .

أولاً- فقر الدم اللاتنسجي الشامل

يعد باول أرليخ Paul Ehrlich (1888) أول من وصف فقر الدم اللاتنسجي لدى مريض مصاب بفقر دم شديد ومترافق مع حمى وقلة الكريات العدلات ونزف في دلالة على كل حالة يكون فيها المريض مصاباً بقلة كريات شاملة. ويعرف اليوم أن قلة الكريات الشاملة ذات معنى أشمل وأسباب أكثر تعدداً من فقر الدم اللاتنسجي ، حيث يمكن أن تصادف مع نقي سوي أو زائد الخلوية، وتعرف اليوم بفقر الدم المعند. وعليه فإن فقر الدم اللاتنسجي يقصد به تلك الحالات التي يكون فيها النقي فاقد أو ناقص الخلوية (النقي الدهني أو الفارغ)، بحيث ينجم عن ذلك قلة شاملة في عدد الكريات الحمر والبيض والصفائح .

يمكن تصنيف فقر الدم اللاتنسجي وفقاً للمسببات على النحو التالي:

- 1- فقر الدم اللاتنسجي الغامض: معظم أشكال فقر الدم اللاتنسجي غامضة Idiopathic مجهولة السبب (70٪ من الحالات في الولايات المتحدة وأوروبا) حيث

لا وجود لقصة التعرض للمواد الكيميائية أو تعاطي الأدوية أو الإصابة بالحُمات لدى المرضى.

2- فقر الدم اللاتنسجي البنيوي: يمكن لفقر الدم اللاتنسجي أن يكون بنيويًا Constitutional ولاديا أو جينيا في بعض أشكاله (متلازمة فانكوني).

3- فقر الدم اللاتنسجي المكتسب: ويصنف في مجموعتين حيث ينجم المرض في المجموعة الأولى عن التأثير السمي المباشر لعدد من العوامل:

أ- تعرض المريض لمواد كيميائية قد تكون معدنية مثل الزئبق والرصاص والذهب، أو عضوية مثل البنزين ومشتقاته التي تستخدم في حل الدهون وتنظيف الآلات الميكانيكية (مذيب ستودارد Stodard, s Solvent)، ومبيدات الحشرات والمركبات الفينولية.

ب- أسباب علاجية Iatrogenic فيزيائية كالأشعة التشخيصية والعلاجية والنظائر المشعة.

ث- أسباب علاجية دوائية، وتشكل 11-20٪ من الحالات، وترتبط بتناول وتعاطي طائفة واسعة من الأدوية من أهمها:

- الأدوية المضادة للأورام مثل مضادات الاستقلاب (مضادات حمض الفوليك

والبورين وميثيلات البريميدين)

والمواد الألكيلية (السكلوفوسفاميد) ومضادات الأنشطار (القلوانيات

النباتية مثل الفانكريستين).

- المضادات الجرثومية مثل الكلورامفينيكول والستربتومايسين والأكتينومايسين-D

ولأيزونيازيد والتتراسلين

- مضادات الروماتزم مثل الكولشيسين وأملاح الذهب والفينيل بوتازون

- مضادات الصرع وبخاصة التريديون والباراديون والميسانتوثين

- المهدرات مثل الكلوربرومازين والميبروبامات

-مضادات السكري مثل الكلوربروباميد والتولوتاميد إضافة لأدوية أخرى مثل الهيدرالازين وحمض الساليساليك.

ويعتمد تثبيط النقي في هذه الحالات على جرعة الدواء ومدة تناوله وأهلية الشخص للإصابة بالمرض .

أما المجموعة الثانية فتتضمن عددا من مسببات التي يتم بموجبها تثبيط النقي بآليات مناعية من أهمها:

■ التفاعلات المناعية المسببة بتناول الأدوية وبخاصة لدى تناول المريض للدواء على فترات متقطعة.

■ التفاعلات المناعية المرافقة للأحماج، وخاصة التهاب الكبد الالتهابي B و C والحمى مضخمة الخلايا Cytomegalovirus، والحصبة والتهاب البنكرياس.

ثانيا- عدم تنسج الحمر الصرف

ينجم فقر الدم في عدم تنسج الحمر الصرف عن قصور انتقائي في إنتاج ونضج السلالة الحمراء في النقي، بينما يكون تصنيع الكريات البيض والصفائح طبيعيا. ويعد عدم تنسج الحمر الصرف من الأمراض النادرة ويوجد في عدة أشكال، أهمها:

1- عدم تنسج الحمر الصرف الولادي (نوع بلاكفان -دايموند-Daimond Blakfan type)

يعرف هذا المرض بمتلازمة بلاكفان -دايموند، وهو فقر دم شديد يصيب الأطفال منذ ولادتهم وحتى عمر الستين، وينجم عن عدم تنسج نوعي غير معروف السبب مرتبط بتأذي الخلايا الجذعية المولدة لسلالة الحمر .

تبدأ الأعراض السريرية بالظهور تدريجيا خلال الشهرين الثاني والثالث بعد الولادة وتتجلى بشحوب مع نقص شهية وحمول وعدم استقرار. وقد تظهر شذوذات ولادية خلقية صغرى لدى 25% من المرضى. ويترافق المرض لدى بعض الأطفال بارتفاع

نسبة حمض الأنثرانيليك Anthranilic acid في البول مما يشير إلى خلل استقلاب الحمض الأميني التربتوفان.

وقد تهبط نسبة الهيموغلوبين حتى مستوى 3 غ/100 مل وتتراوح نسبة الهيموغلوبين الجنيني بين 5 و25%، ولا تشاهد على المريض أعراض يرقانية أو ضخامة في الطحال أو العقد اللمفاوية إلا إذا حصل تركزم للحديد في الجسم، حيث تحصل ضخامة كبدية.

يظهر فحص اللطاخة الدموية فقر دم سوي الصباغ سوي الكريات مع انخفاض نسبة الشبكيات، بينما تبقى نسبة الكريات البيض والصفائح ضمن الحدود السوية. أما فحص النقي فيظهر انخفاض ملحوظ في السلالات المولدة للحمر بكافة أطوارها وغالبا ما يتوقف نمو الكريات في مرحلة الأرومة السوية الأسنة.

يعتمد علاج المرضى على نقل الدم بشكل متكرر للحفاظ على الهيموغلوبين في مستوى ملائم وإعطاء الكورتيزون الذي يحدث تحسن سريري في بعض الحالات.

2- عدم تكون الحمر المكتسب (النوع المزمن الغامض)

وهي متلازمة نادرة من عدم تنسج الحمر الصرف غالبا ما تصيب البالغين في منتصف العمر. و يترافق هذا المرض في 50% من الحالات بورم التيموس وأحيانا بالوهن العضلي الوبيل. ويتصف المرضى عموما بوجود مشبطات من نمط الغلوبولينات G (IgG) التي تمتلك قدرة انتقائية سامة على أرومات الكريات الحمر.

يعتمد علاج المرضى كليا على نقل الكريات الحمر، ويحدث هوادة في المرض وتحسن لدى 50% من المصابون بورم التيموس بعد استئصاله. أما المرضى الذين لا يحملون أورام أو لم يستفيدوا من استئصالها فيمكن إطالة مدة هوادة المرض لديهم بإعطاء الستيرويدات القشرية ومثبطات المناعة مثل السكلوفوسفاميد.

3- عدم تكون الحمر المكتسب (النوع الحاد والعاير)

يرتبط هذا النوع من عدم تكون الحمر بمسببات مختلفة منها تناول بعض الأدوية مثل الكلورامفينيكول والدي فينيل هيدانتوين والأيزونيازيد وغيرها. وبخلاف فقر الدم اللاتنسحي المرتبط بتناول الأدوية فإن عدم تكون الحمر المرتبط بتناول الأدوية يزول بتوقف تناول الدواء. كما قد يحصل قصور في إنتاج الكريات الحمر نتيجة نقص الفيتامين B2 والمرافق لاضطراب استقلاب الحمض الأميني الثريثونان ، ويعالج أيضا بإعطاء الفيتامين B2. أما في قلة الأرومات الحمر العابر لدى الأطفال فتتجم الشبيط الخلطي لتكوين الحمر أو نقص الخلايا الجلدية. وترافق بعض الأنواع الأخرى العابرة الاصابة بالحمات أو انحلال الدم. أما في النوع الكلوي فيرتبط عدم تكون الحمر بنقص مكون الحمر أو تثبيط النقي بمواد سامة متراكمة نتيجة القصور الكلوي ويعالج هذا النوع بتصحيح الوظيفة الكلوية.



الفصل الحادي عشر

تليف النقي وتصلبه

Mylofibrosis and Mylosclerosis

و كثرة الحمر (احمرار الدم)

Polycytemia

أولا: تليف النقي وتصلبه Mylofibrosis and Mylosclerosis

1- الفيزيولوجيا المرضية

يعد تليف النقي أحد متلازمات تكاثر النقي والتي تضم إلى جانب تليف النقي كل من الأيبضاخ النقي المزمن وفرط الكريات الحقيقي وقلة الصفائح الأولى الشفي. وتشترك جميع هذه الاضطرابات بدرجات مختلفة من التكاثر غير قابل للضبط في سلالات الحمر والبيض والصفائح والأرومات الليفية ، إضافة لأمكانية تحول إحداها إلى الآخر وترافقها بالحوول النقواني ، وكذلك إمكانية تحولها جميعا إلى ايبضاخ نقي حاد غير متميز الخلايا.

يعرف المرض بتليف النقي والحوول النقواني مجهول السبب في إشارة إلى تلازم حدثيات التليف والحوول النقواني لدى المريض ، وكذلك للإشارة إلى مدى الالتباس و الغموض في سببية المرض.

يكون النقي في المراحل الأولية من المرض مفرط الخلوية في أغلب الحالات ، حيث تزداد فعالية النقويات والصفائح مع زيادة نسبة في التليف. ومع تقدم المرض يزداد ارتشاح النقي بنسيج شبكي ومغرائي ليحتل مختلف أحيازه. ويتوضع التليف بدلية في عظام الجذع ، في حين يكون نقي العظام الطويلة مفرط الخلوية ، ثم يمتد التليف ليشمل كامل النقي. وكلما تقدم المرض يزداد إنتاج الدم من خارج النقي ، وخاصة من الطحال والكبد . وفي المراحل المتأخرة يترسب الكالسيوم في النقي الأمر الذي يعرف بتصلب النقي.

2-الأعراض السريرية

يصيب المرض مختلف الأعمار، ويظهر عادة خلسة في السنين المتوسطة والكهولة. ويترافق المرض في شكله الحاد بتطور سريع لأعراض فقر الدم مع ضخامة طحالية بسيطة، وحمى بدون مسببات حمجية وألم عظمي شديد. أما في شكله المزمن فيشكو المريض إضافة لأعراض فقر الدم من أعراض تضخم الطحال واحتشائه، والتي تتمثل بحس امتلاء البطن المزعج، وخاصة بعد تناول الطعام، إضافة إلى ألم بسبب الاحتشاء والحكة التي تبدو كعرض واضح. ويمكن أن يصاب بعض المرضى باختلاطات تخثرية (تخثر أوردة الساق)، وتلاحظ ضخامة كبدية لدى بعض المرضى دون تضخم في العقد اللمفاوية وبدون عوارض الفرغرية.

3-الموجودات المخبرية

تظهر الفحوصات المخبرية الموجودات التالية:

-انخفاض في مستوى الهيموغلوبين وارتفاع مستوى حمض البول والفيثامين B12 (بسبب زيادة الترانس كوبالامين-I) وانخفاض مستوى حمض الفوليك في المصل.

-يظهر فحص لطاخة الدم المحيطي فقر دم معتدل الشدة من النمط سوي الكريات سوي الصباغ إلى جانب تغيرات بالغة في شكل الكريات الحمر وحجمها، إلى جانب كريات دمعية وأرومات الحمر وطلائع الخلايا النقية.

-يظهر فحص النقي ازدياد خلوية واضح في بداية المرض إلى جانب زيادة تليفه مع تقدم المرض. وغالبا ما يكون النقي جافا لذلك يتم تأكيد التشخيص ودرجة التليف بخزع العظم .

-يرتفع عادة تعداد الكريات البيض (15-30 ألف) وتشكل الأرومات النقية مانسبته 10%، منها ونادرا ماتلاحظ قلة الكريات البيض. وبخلاف الابيضاض النقوي المزمن يرتفع عيار الفسفوراز القلوية في الكريات البيض. ويمكن ملاحظة

ارتفاع الصفائح مع بداية المرض (أوتبقى ضمن الحدود السوية) ، ولكن مع تقدم المرض تصبح شاذة ويقل تعدادها.

4-العلاج

يهدف العلاج إلى اتخاذ عدد من التدابير التي تمنع الاختلاطات الخثرية أولا ومعالجة نقص حمض الفوليك وزيادة حمض البول إلى جانب إنقاص حجم الطحال ثانيا. يتم تخفيض حجم الطحال بالمعالجة الدوائية (Busulphan 4مغ/يوم) أو بالمعالجة الشعاعية أو الإستئصال الجراحي. وتفيد هذه الإجراءات في منع تجمع الدم في الطحال وحدوث فقر الدم إلى جانب التخلص من آلام الاحتشاء وآلام انضغاط الأعصاب الحوضية وعوارض الانزعاج الأخرى. ولا يلجأ إلى استئصال الطحال عندما يكون العضو الرئيس المنتج للدم خارج النقي. كما أن استئصال الطحال يرفع تعداد الصفائح، وتزداد خطورة التعرض لحوادث التخثر بما فيها احتشاء العضلة القلبية والصمة الرئوية، والتي تكون سبب الوفاة إلى جانب اليبضاض النقوي المزمن.

ثانيا: كثرة الحمر (احمرار الدم) Polycytemia

يعرف الازدياد المستمر في الحجم الكلي للكريات الحمر عن الحدود العليا السوية بالنسبة للعمر والجنس نفسه (30 ± 5 مل/كغ للرجل و 27 ± 5 مل/كغ للأنثى) بكثرة الحمر. ويعرف كثرة الحمر أيضا بارتفاع تركيز الهيموغلوبين عن الحدود العليا السوية بالنسبة للعمر والجنس نفسه (أعلى من 18 غ/100 مل لدى الذكور وأعلى من 16 غ/100 مل لدى الإناث). وتصنف كثرة الحمر في ثلاث مجموعات رئيسة، هي: كثرة الحمر الحقيقية أو البدئية، وكثرة الحمر الثانوية، وكثرة الحمر النسبية.

1- كثرة الحمر الحقيقية Polycytemia Vera

تعرف كثرة الحمر الحقيقية بفرط الكريات الحقيقية الذي يتميز بزيادة إنتاج الكريات الحمر والبيض والصفائح مجهول السبب ، مع أن الصفة السائدة في المرض هي ارتفاع تركيز الهيموغلوبين.

أ- الأعراض والتظاهرات السريرية

يكون المريض وافر الدم داكن اللون ، وتظهر عليه الأعراض بشكل متدرج بما يتناسب وازدياد حجم الدم وتقدم المرض.

وترتبط مختلف الأعراض عموماً بالاضطرابات الخثرية وبطء الجريان الدموي وارتفاع لزوجة الدم واحتقان الأعضاء. حيث تظهر على المريض اضطرابات عصبية تتمثل بالصداع والطنين وامتلاء الرأس والدوخة وضعف التركيز . وقد يشكو المريض من ضعف إحدى الساقين وعدم القدرة على النطق وفقدان الوعي نتيجة حدوث نزف أو خثرة في أحد الأوعية الدماغية. ويلاحظ لدى المريض اضطرابات دورانية تتجلى بارتفاع الضغط الشرياني لدى نصف المرضى إلى جانب الزلة التنفسية وخناق الصدر عند الإجهاد. ويتسبب بطء الجريان الدموي في اضطرابات وعائية محيطية كالخثرات الدموية في الأوردة العميقة والسطحية وآلام في الأطراف والعرج المتقطع والدوالي. ويصاب نحو 10% من المرضى بقرحة عفجية إلى جانب آلام هضمية متنوعة. ويلاحظ تضخم الطحال لدى بعض المرضى. وقد يتسبب امتلاء الأوعية الشبكية باضطرابات بصرية وحدوث الخثرات والتزوف، ويعاني المرضى من الحكمة التي تزداد بعد الاستحمام بالمياه الساخنة إلى جانب آلام مفصلية نتيجة ارتفاع مستوى حمض البول الذي يمكن أن يترسب في الكلى على شكل حصي.

ب- الموجودات المخبرية

تظهر الفحوصات المخبرية الموجودات التالية:

-ارتفاع تركيز الهيموغلوبين إلى مستوى يتراوح بين 18 و25 غ/100 مل .
ويرتفع حجم الكريات المكدسة (الهيماتوكريت) إلى نحو 55-75 % إلى جانب
زيادة الحجم الكلي للكريات الحمر وتعدادها (6-9 مليون/ملم³).
-يرتفع تعداد الكريات البيض (12-25 ألف/ملم³)، وتعداد الصفائح
(450 ألف/ملم³) لدى نحو نصف المرضى.
تنخفض سرعة ثفل الدم بسبب ارتفاع اللزوجة.

يرتفع تركيز حمض البول في الدم وكذلك مستوى الفيتامين B12، ويزداد عيار
انزيم الفسفataز القلوية في الكريات البيض.
يظهر فحص النقي زيادة مطلقة في الخلايا ونقص محتواه من الحديد.

ث-العلاج

تهدف المعالجة إلى تخفيض حجم الكريات الحمر، وذلك بإجراء الفصادة التي تكون
مفيدة أيضا في التخلص من الصداع والاختلاطات الدماغية. وتستخدم المعالجة الدوائية
بهدف تثبيط النقي بمضادات الإنقسام الخلوي (السكرولفسفاميد) والعلاج الشعاعي
بالفسفور المشع. وتطبق كذلك الوقاية من الحوادث الخثرية بإعطاء مضادات تجمع
الصفائح، ويعالج فرط حمض البول بإعطاء مركب Allupurinol، وتتم السيطرة
على الحكمة بإعطاء مضادات الهستامين.

2- كثرة الحمر الثانوية

تعد كثرة الحمر الثانوية أحد أشكال احمرار الدم الذي يتصف بازدياد نشاط السلالة
المولدة للحمر مع بقاء نشاط السلالة المولدة للبيض والسلالة المولدة للصفائح ضمن
الحدود السوية.

يحدث احمرار الدم الثانوي نتيجة نقص الأكسجة التسيحية أو نتيجة لأزدياد إفراز مكون
الحمر erythropoitin .

تلاحظ كثرة الحمر الثانوية الفيزيولوجية في حالات نقص الأكسجة لدى العيش في المناطق المرتفعة (داء المرتفعات). أما كثرة الحمر الثانوية المرضية فتلاحظ في آفات الرئة المزمنة وأمراض القلب الولادية، وكذلك لدى وجود هيموغلوبينات شاذة ذات إلفة مرتفعة للأكسجين إلى جانب نقص 2-3DPG ووجد الهيموغلوبينات غير الفعالة وظيفيا (الهيموغلوبين الكبريتي، الهيموغلوبين المؤكسد، الكربوكسي هيموغلوبين). أما ازدياد إفراز مكون الحمر فيلاحظ في أمراض الكلية مثل تضيق الشريان الكلوي وأورام الكلية إلى جانب بعض أورام الكبد والرحم والمبيض، وكذلك بعض الاضطرابات الغدية مثل داء كوشينغ.

يبدى المريض كافة أعراض وعلامات كثرة الحمر الحقيقية باستثناء ضخامة الطحال مضافا إليها أعراض المرض المسبب لأحمرار الدم.

أما الموجودات المخبرية فتتمثل بارتفاع مستوى الهيموغلوبين والهيماتوكريت وتعداد الكريات الحمر مع بقاء تعداد الكريات البيض والصفائح ضمن الحدود السوية. ويتميز هذا النمط من أمراض الدم بارتفاع مستوى مكون الحمر في المصل والبول. أما العلاج فيجب أن يتوجه إلى المرض المسبب ويلجأ أحيانا إلى الفصادة كعلاج ملطف.

3- كثرة الحمر النسبية

تعرف كثرة الحمر النسبية بالحالة التي تترافق بارتفاع تركيز الهيموغلوبين والهيماتوكريت وتعداد الكريات الحمر نتيجة ضياع السوائل من الجسم (كما في الحروق والإقياءات والإسهالات المعندة والعلاج بالمدرات البولية) أو عدم تناول السوائل (كما في حالات الإغماء وآفات البلعوم)، وتحدث كثرة الحمر النسبية بسبب الكرب، حيث وصفت هذه الحالة لدى العديد من الأشخاص المصابين بأمراض عصبية ونفسية، مترافقة مع توتر وقلق وفرط ضغط الدم.

الباب الرابع الكريات البيض

الفصل الأول

الخصائص العامة للكريات البيض


أولاً: خصائص الكريات البيض

الكريات البيض خلايا منوأة ، عديمة اللون تنقل في الدم من أماكن تكونها في نقي العظم والأعضاء المكونة لللف إلى مختلف مناطق الجسم التي تكون بحاجة لها، حيث تقوم بوظيفتها في حماية الجسم من مختلف العوامل الممرضة والغازية .

وبخلاف الكريات الحمراء الكريات البيض خلايا كاملة مزودة بكافة العضيات الخلوية والأنزيمات التي تمد الكرية بالطاقة اللازمة لأداء وظائفها الدفاعية. فهي تمتلك جميع الأنزيمات التي تتوسط إنتاج وتحويل الطاقة وفق المسارات الاستقلابية الرئيسية الثلاث: التحلل السكري (Embden Meyerhof) والأكسدة الهوائية غير المباشرة (حلقة كريبس)، والأكسدة المباشرة (مسلك السكاكر الخماسية - Warberg Dicken) ، إضافة إلى مسالك ادخار الغليكوجين والتحلل الغليكوجيني.


وتمتلك الكريات البيض كافة المقدرة على الحركة الأميبية Amiboid motion، حيث تستطيع بعض الكريات التحرك بسرعة 40 ميكرومتر في الدقيقة . وبفضل ذلك تستطيع العبور من خلال ثقب الأوعية الدموية والتحرك عبر النسيج، بالرغم من كون الثقب أصغر من حجم الخلية بفضل تضيق الجزء المتزلق عبر الثقب وتعرف هذه الظاهرة بالإنسلا Diapedesis. وتحرك معظم الكريات باتجاه النسيج الملتهب أو المصابة بخاصية الانجذاب الكيميائي chemotaxis (الشكل 1-4). وهي حركة موجهة للكريات البيض تحرضها حوالي اثني عشرة مادة من ضمنها وجود الجراثيم والديفانات وبعض منتجات النسيج الملتهب، ومنتجات معقد المتممة K

complement complex والكثير من منتجات تجلط المصورة في المنطقة الملتهبة والعديد من المواد الأخرى.



الشكل 1-4: الانجذاب الكيميائي

و يعتمد الانجذاب الكيميائي على مدروج تركيز المادة المحرزة مما يسبب حركة موجهة للكريات نحو المصدر . ويكون الانجذاب فعالا حتى مسافة 100 ميكرو متر من المنطقة المصابة ، مع العلم أن النسيج لا تبعد أكثر من 30-50 ميكرون عن الشعيرات، مما يمنح الإشارات الكيميائية القدرة على تحريك مجموعة كبيرة من الكريات إلى تلك المنطقة. وتقوم الكريات البيض ببلعمة الجراثيم والحماة والأجسام الغريبة بشكل انتقائي بعد التعرف عليها من خلال أغشيتها الخشنة، أو نتيجة غياب الغلالة البروتينية الصائنة التي تميز البنى والخلايا السوية في الجسم (الشكل 2-4)، ويمكن أن تتم هذه العملية عن طريق الأضداد الملتصقة بسطوح الأجسام الغريبة التي تنتجها الخلايا اللمفية (المناعية)، ويتم ذلك بتوسط جملّة المتممة، وهو ما يعرف بالطهارة Apsonization.



الشكل 2-4: البلعمة

وإثر بلعمة الأجسام الغريبة تجري عملية تفكيكها وتخریبها تحت تأثير العديد من الأنزيمات الحالة والمواد المبيدة للجراثيم التي تحتويها الجسيمات الحالة والجسيمات فوق المؤكسدة والحيويات الستوبلاسمية للكريات البيض. فالجسيمات الحالة تحتوي على العديد من الأنزيمات المتخصصة بمضغ البروتينات الغريبة والبروتينات الجرثومية (بروتياز)، والمواد الشحمية المغلفة لها (الليپاز والموراميلاز أو الليزوزيم). وتحتوي الجسيمات فوق المؤكسدة على عوامل مؤكسدة قاتلة للجراثيم مثل فوق أكسيد الأكسجين o_2 superoxide والماء الأكسجيني وأيونات الهيدروكسيل والهيبو كلوريت، والتي تستطيع إتلاف قائمة كبيرة من الجراثيم.

وهكذا تشكل الكريات البيض الجهاز الدفاعي الذي يمنح الجسم القدرة على مقاومة جميع أنماط الكائنات الحية والذيفانات، التي تمثل لأحداث أذية النسيج والأعضاء، وهو ما يعرف بالمناعة immunity. ويتم تأمين مناعة الجسم إما من خلال إجراءات عامة غير نوعية تتمثل في بلعمة الجراثيم والكائنات الغازية، وكذلك تدمير الخلايا الغريبة والسرطانية والمخموجة وهو ما يعرف بالمناعة المتأصلة Innate immunity، أو من خلال إنشاء مناعة قوية نوعية ضد عوامل غازية خاصة مثل الجراثيم الميئة والحماة والذيفانات والنسج الغريبة مرتبطة بتشكيل الأضداد (مناعة الخلايا البائية)، أو تفعيل عدد كبير من الخلايا اللمفاوية (مناعة الخلايا التائية) وهو ما يعرف بالمناعة المكتسبة Acquired immunity.

ثانياً: أنماط الكريات البيض

يوجد في الدم خمسة أنواع من الكريات البيض ، صُنفت بحسب المواصفات الشكلية في مجموعتين. تعرف المجموعة الأولى بالكريات البيض المحببة Granulocytes التي تتصف بوجود الحبيبات في السيتوبلازما ، وتصنف بدورها في ثلاثة أنواع بحسب تلوّنها بصبغة رومانوفسكي (زرقاء الميتيلين ولإيوزين) وهي: العدلات Neutrophils ، والحمضات Eosinophils ، والأسّسات Basophils. أما المجموعة الثانية فتعرف باللا محببات K Agranucytes وهي نخالية من الحبيبات السيتوبلاسمية وتضم الوحيدات Monocytes ، واللمفاويات Lymphocytes. وفيما تنحصر الوظيفة الرئيسية للكريات البيض المحببة والوحيدات في بلعمة الجراثيم والكائنات الغازية الأخرى، تؤمن الكريات البيض اللمفاوية مناعة الجسم النوعية ضد مختلف العوامل الممرضة عبر إنتاجها للأضداد (مناعة خلطية) أو عن طريق تنشيط الخلايا اللمفاوية التي تدمر العوامل الغريبة (مناعة الخلايا التائية).

ثالثاً: تعداد الكريات البيض

يتعرض العدد الكلي للكريات البيض في دم الأشخاص الأسوياء وبخلاف الكريات الحمر إلى تقلبات على علاقة بالسن والتوقيت اليومي والحالة الوظيفية للجسم. فعدد الكريات يكون مرتفع عادة لدى حديثي الولادة (10-17 ألف/ملم³) ويتناقص تدريجياً لدى الرضع (7-17 ألف/ملم³)، والأطفال (5-15 ألف/ملم³) ليستقر لدى الكهول في حدود (4-10 آلاف/ملم³). و يخضع عدد الكريات البيض لتغيرات يومية طفيفة حيث ينخفض في الصباح ويبلغ قيمة أعظمية في فترة بعد الظهر . أما التغيرات الفيزيولوجية فتتمثل بزيادة عدد الكريات بعد التمارين الرياضية والجهد العضلي والكروب (الانفعال) وتناول الطعام ، وخاصة الوجبات البروتينية ، ويزداد أثناء الحمل ، وأثناء الولادة، وفقدان الماء الشديد .

الفصل الثاني

تطور الكريات البيض وخصائصها البنيوية والوظيفية


أولاً: تكون الكريات البيض

يتم تكون الكريات البيض انطلاقاً من سلالتين من الخلايا الجذعية الملتزمة Committed stem cells المشتقة بدورها من الخلية الجذعية متعددة القدرات Pluripotent Stem cell وهما: الخلايا الجذعية النقية Myeloid stem cells والخلايا الجذعية للمفاوية Lymphoid Stem cells. ويشترك من الخلايا الجذعية النقية التجمع الخلوي المولد لسلسلة المحببات والوحيدات (CFu-GM)، إلى جانب التجمع الخلوي المولد لسلسلة الحمر (CFu-E) والتجمع الخلوي المولد للنواءات (CFu-Meg) والتجمع الخلوي المولد للأساسيات (CFu-Bs) والتجمع الخلوي المولد للحامضيات (CFu-Eo). أما الخلايا الجذعية للمفاوية فتشتق منها الكريات البيض للمفاوية. ويتم تطور الكريات البيض النقية وتتمايزها إلى خلايا ناضجة في نقي العظم. أما الخلايا الجذعية للمفاوية فيغادر قسم منها إلى التيموس حيث تتمايز إلى خلايا لمفاوية تائية T-cell، فيما يتمايز القسم الآخر في نقي العظم إلى خلايا بائية B-cell. وتتوزع اللمفاويات المتمايزة في الأعضاء المكونة للدمف (العقد اللمفاوية والطحال والثوتة واللوزتين ومختلف التشكلات اللمفاوية في المعى والجهاز التنفسي ونقي العظم وأماكن أخرى)، ويعبر قسم منها نحو الدم المحيطي.

1- تطور المحببات


يتم تطور سلالة الكريات البيض المحببة في نقي العظم حيث يحصل انقسام ونضج متتالي للخلايا الجذعية المولدة للمحببات متحولة إلى خلايا ناضجة (معتدلة، حمضة وأسنة) مروراً بالمراحل التالية:

أ- الأرومة النقية **Myloblast** : يبلغ قطر الكرية نحو 15-20 ميكرونا ، تنصف بـ سيتوبلازما عديمة الحبيبات النوعية قليلة الحجم وذات لون أزرق قاتم مع وجود بعض الحبيبات اللازوردية. أما النواة فهي دائرية أو بيضوية كبيرة الحجم تتضمن كروماتين ناعم بلون أحمر أرجواني وتحتوي على نويتين أو ثلاث نويات (الشكل 3-4).




الشكل 3-4: الأرومة النقية

ب- سليفة النقية **Promylocyte** : يبلغ قطر الكرية نحو 15-22 ميكرونا ، تمتلك سيتوبلازما زرقاء شاحبة أكثر غزارة من سابقتها، وتتميز بوجود ثلاثة أنواع من الحبيبات : حبيبات غزيرة كبيرة الحجم بلون أزرق قاتم وعدد قليل من الحبيبات اللازوردية إلى جانب حبيبات نوعية في بداية تشكلها. أما النواة فهي دائرية أو بيضوية تشغل نحو نصف حجم الكرية أو أكثر ، وهي ذات كروماتين ناعم ، ولكن أكثر كثافة مقارنة مع الخلية السابقة، ويمكن أن تحتوي نويتين أو ثلاث، غير أنها لا تكون واضحة في أغلب الأحيان (الشكل 4-4).




الشكل 4-3: السليفة النقية

ب- النقوية **Mylocyte**: يبلغ قطر الكرية نحو 18-21 ميكرونا ، تكون الستوبلازما بلون زهري (محببة للحمض) مع بعض المساحات بلون أزرق (محببة للأسس) وتحتوي الستوبلازما على بعض الحبيبات غير النوعية إضافة إلى الحبيبات النوعية الخاصة بكل نوع من أنواع المحبيبات. فالخلية التي ستتحول إلى معتدلة تظهر فيها حبيبات غزيرة بلون كستنائي أو بيج والخلية التي ستتحول إلى حمضة تظهر فيها حبيبات كبيرة الحجم بلون برتقالي، أما الخلية التي ستتحول إلى أسسة فتظهر في ستوبلازماها حبيبات متفاوتة الحجم بلون أزرق ضارب إلى السواد. أما النواة فهي عديدة النويات بيضوية الشكل وذات كروماتين كثيف (الشكل 4-5).




الشكل 4-5: النقوية

ت- خلية النقوية **Metamylocyte**: يبلغ قطر الكرية نحو 10-15 ميكرونا، تكون السيروبلازما محبة للحمض بشكل مشابه لسيروبلازما الخلية الناضجة وتحتوي الستوبلازما على الحبيبات النوعية الخاصة بكل نوع من أنواع الكريات المحببة بشكل واضح . أما النواة فهي عديدة النويات وذات كروماتين متكتل و شكل متطاوّل أو معقوف يشبه الكلية بدون ظهور الفصوص (الشكل 4-6).



الشكل 4-6: خلية النقوية


ث- الخلية على شكل نعل الفرس **Band cell** : يبلغ قطر الكرية 9-15 ميكرونا ، تمتلك نواة بشكل نعل الفرس وكروماتين متكتل ومتجمع بشدة. أما السيتوبلازما فتشبه مثيلتها في الكريات الناضجة، وتظهر فيها الحبيبات النوعية بوضوح كبير (الشكل 7-4).



الشكل 7-4: الخلية (نعل الفرس)

2. العدلات الناضجة Neutrophils

أ- المواصفات الشكلية والكيميائية الحيوية: يبلغ قطر الكرية نحو 10-14 ميكرونا، تكون السيتوبلازما بلون زهري فاتح، وتحتوي حبيبات معتدلة نوعية قطرها 0.1 ميكرون، متوزعة بشكل متجانس وذات لون كستنائي فاتح أو وردي، إضافة لحبيبات غير نوعية (لازوردية) بلون أحمر. تحتوي الحبيبات النوعية وغير النوعية على أنزيمات الفسفيتاز القلوية والدهون الفسفورية التي تتلون بالأسود بصبغة أسود السودان، وتتضمن الحبيبات النوعية عددا من الأنزيمات مثل الليزوزيم واللاكتوفيرين. أما الحبيبات اللانوعية فتحتوي أنزيمات عديدة أيضا مثل البيروكسيداز والفسفيتاز الحمضية والاستيراز النوعية. وتحتوي السيتوبلازما حبيبات الغليكوجين. وتكون النواة مفصصة حيث يتراوح عدد الفصوص بين 2-5 فصوص في الكرية الناضجة، و 5-10 فصوص في الكريات الكهلة مفرطة التفصص، وهي ذات كروماتين متكتل بلون بنفسجي (الشكل 8-4). وفي بعض الحالات المميزة للنمط الوراثي الأنثوي تحتوي الكريات (سبعة من كل خمسمائة كرية) على بروزات دائرية بقطر 1.5-2 ميكرون مرتبطة بأحد فصوص النواة بواسطة جسور كروماتينية وتعرف بالعصى الطولية.



الشكل 8-4: العدلات الناضجة

ب- حركية ووظائف العدلات تغادر المعتدلات النقي إلى الدم بعملية الانسلاخ من خلال الأوعية الشعرية بعد مضي 14 يوما من دخولها في عملية الانقسام والنضج. ويكون زمن وجود هذه الكريات في الدم قصيرا نسبيا (8-10 ساعات)، وتهاجر بعد ذلك إلى النسيج لتتخرب بعد نحو 4-5 أيام.

وتعد العدلات من أهم عناصر المناعة الخلوية غير النوعية، فهي تشكل خط الدفاع الأول الذي يحمي الجسم من العناصر الغريبة معتمدة بذلك على خاصية الجذب الكيميائي والطهارة والبلعمة والقتل. فهي تجذب إلى مكان الإصابة بوساطة عامل الجذب الكيميائي للعدلات، وتسهل عمليات الطهارة البلعمة من خلال ارتباط أحد نواتج شلال المتممة (C3b)، والقسم الثابت من الضد على مع مستقبلات نوعية في غشاء الكرية. وبعد إحاطة الجرثوم بفجوة بلعية تحتوي مكونات الحبيبات النوعية وغير النوعية، يجري قتل الجرثوم إما بفعل عمل الأنزيمات الهاضمة (البروتياز والليزوزيمات) أو بفعل تأثير المواد المؤكسدة (فوق أكسيد الأكسجين، الماء الأكسجيني، الهيبوكلوريت)، أو بفعل ربط الاكتوفيرين لعنصر الحديد الضروري لنموه.

وبعد قيام هذه الكريات بعملها فإنها تتخرب وتسبب الأنزيمات الناجمة عن تخرب هذه الكريات استرخاء النسيج، وتشكل الخراجات القيحية المكونة بشكل أساسي من الكريات العذلة وبقاياها.


ت- الدلالات المرضية لتغير نسبة العدلات: تبلغ نسبة العدلات في الدم المحيطي نحو 56% من مجمل الكريات البيض ومانسبته 93-97% من مجمل الكريات المحببة. ترتفع نسبة العدلات في مختلف الأحماج والالتهابات الحادة، وفي الأمراض الدموية مثل انحلال الدم والتزوف الشديدة والإبيضاضات النقوية، ولآفات الناتجة عن تحرب النسيج مثل الحروق واحتشاء العضلة القلبية والأورام الخبيثة. ويزداد عدد العدلات في الأمراض الاستقلابية مثل السبات السكري والقصور الكلوي، وكذلك لدى تناول بعض الأدوية مثل الأدرينالين والستيروئيدات القشرية.

أما انخفاض العدلات فيلحظ في بعض الأمراض الخمجية الفيروسية، مثل الحمى التيفية، والحمى المالطية، والحصبية والنكاف، والتهاب الكبد، وكذلك بعض انتانات الطفيليات مثل الملاريا واللايشمانيا. وينخفض عدد العدلات في بعض أمراض الدم، مثل ندرة العدلات، وتليف النقي، وفقر الدم اللاتنسجي، وفرط نشاط الطحال، وإبيضاض الدم الحاد. وتلاحظ كذلك قلة العدلات في بعض الأمراض الغدية، مثل داء أديسون، وفرط الدرق، إضافة للتعرض للإشعاعات والكحولية وتناول الأدوية المضادة للأورام، والبتزين، وقلة العدلات الأساسية مجهولة السبب.

3- الحمضات Eosinophils

أ- المواصفات الشكلية والكيميائية الحيوية: يبلغ قطر الكرية نحو 12-13 ميكرونا، تكون الستوبلازما بلون زهري، وتحتوي حبيبات كبيرة منتظمة الحجم قطرها 1 ميكرون، وذات لون برتقالي ضارب إلى السواد. وتحتوي هذه الحبيبات على بروتين أساسي (قلوي) غني بالأرجينين، يجتذب الأصبغة الحمراء الحمضية مثل الأيوزين إضافة، إلى عدد من الأنزيمات أهمها البيروكسيداز والفسفتاز الحمضية. وتختلف هذه الحبيبات عن حبيبات العدلة بعدم وجود أنزيم الليزوزيم وأنزيم الفسفتاز القلوية. و تحتوي الستوبلازما إضافة إلى الغليكوجين على المستامين والبراديكنين

والسروتونين (5-هيدروكسي تربتامين) وعامل جذب كيميائي أيزيني. أما النواة فهي ثنائية الفصوص وذات كروماتين متكتل (الشكل 9-4).



الشكل 9-4: الحمضة

ب- حركية ووظيفة الحمضات تجول الحمضات الناضجة في الدم لمدة 3-6 ساعات بعد مغادرتها النقي، ثم تنسل إلى النسيج، وخاصة الرئتين والجلد والأنبوب الهضمي والرحم، حيث تعيش فترة أطول من العدلات. وخلافا للعدلات فإن الحمضات أكثر انجذابا إلى النسيج المصابة بالتهابات مزمنة مقارنة مع المناطق الالتهابية الحادة. وتتحرك الحمضات نحو مكان الإصابة بتأثير عوامل جذب كيميائية للحمضات حيث تقوم ببلعمة عدد كبير من الجراثيم بحسب الحوادث السابقة التي أشرنا إليها عند الحديث عن وظيفة العدلات. وبالرغم من أن فعاليتها المضادة للجراثيم أقل بكثير من فعالية العدلات إلا أنها تستطيع الارتباط بالطفيليات (المنشقات والشعرينيات أو دودة لحم الخنزير) أو يرفاقها، وتعمل على قتلها من خلال تحرير المركبات فوق المؤكسدة والأنزيمات الحالة وعديد ببتيد مبيد لليرقات بشدة يعرف بالبروتين الأساسي الرئيس (MBP) Major basic protein.

وتتملك الحمضات مقدرة كبيرة على محاصرة الحوادث التحسسية والحد من حدوثها. فالاستجابات التحسسية الناجمة عن تفاعل الأضداد المحسنة (IgE) مع الكريات البيض الأساسية والخلايا البدينة Mast cells، تترافق بتحرر عدد من المركبات والوسائط الكيميائية مثل الهستامين Histamine والهيبارين Heparin ومادة

التأق بطيئة التفاعل Slow- reaction substance of
Platelet anaphylaxis(SRSA) والعوامل المفعلة للصفائح
activating factors(PAF) إضافة لعامل الجذب الكيميائي للحمضات
(ECFA) وعامل الجذب الكيميائي للعدلات (NCFA) . وتحدث هذه المواد
إضافة إلى جذب الحمضات والعدلات إلى موضع التفاعل، الظواهر المرافقة لمختلف
أنماط الاستجابات التحسسية في مختلف النسيج (التأق ، الربو ، الشرى ، حمى الكلا،
مثل توسع الأوعية الدموية الموضعية وزيادة نفوذية الشعريات وضيق السوائل إلى
النسيج وأذية النسيج بفعل البروتياز ، وتقلص العضلات الملساء . وتقوم الحمضات
المنجذبة إلى منطقة التفاعل التحسسي بتعديل فعل الهيبارين من خلال ربطه مع
البروتين القلوي المتحرر من حبيباتها. وتقوم الحمضات ببلعمة حبيبات الخلايا البدينة
وتعيق عملية تركيبها وتحررها من هذه الخلايا. وتقوم بتفكيك الهستامين بوساطة
أنزيم الهستاميناز، وكذلك تثبيط تحرره من خلال تحرير
البروستاغلاندينات(PGE1,PGE2) مساهمة في ذلك في الحد من الاستجابات
المؤذية لهذه المواد.

ت- الدلالات المرضية لتغير نسبة الحمضات:


تبلغ نسبة الحمضات في الدم المحيطي نحو 2-3% وتحرض مختلف الاستجابات
التحسسية ونقص الأكسجين زيادة إنتاجها في النقي وتحررها إلى الدم في طريقها إلى
النسيج ، حيث يكون عددها أكبر بكثير من عددها في الدم. وتخزن كذلك بعض
الهرمونات مثل الأدرينالين والستيرويدات هجرة هذه الكريات من الدم إلى النسيج
مسببة نقص عددها في الدم المحيطي.

ويلاحظ زيادة نسبة الحمضات في الإصابات الطفيلية(المنشقات والشعرينيات)
والأمراض التحسسية (الربو والشرى وحمى الكلاوتعاطي الأنسولين) وكذلك في
الأمراض الجلدية(الجرب ، الأكزما)، والأمراض الخبيثة(داء هودجكن ، ابيضاض

نقوي مزمن، السرطانات الحشوية)، إضافة إلى التعرض المزمن للإشعاعات والتدخين وبعض المركبات الكيميائية، وكثرة الحمضات العائلية مجهولة السبب. أما نقص الحمضات فيلاحظ في فرط نشاط الكظر (داء كوشينغ)، أو لدى تناول الستيرويدات لأسباب علاجية، وإثر العمليات الجراحية، وأثناء الصدمات والكروب Stress والحروق والانتانات الشديدة.

4- الأسسات Basophils:

أ- الصفات الشكلية والكيميائية الحيوية: يبلغ قطر الكرية نحو 10-14 ميكرونا، تحتوي الستوبلازما على حبيبات بلون بنفسجي غامق ضارب إلى السواد غير منتظمة الحجم بعضها صغير وبعضها كبير تغطي الستوبلازما والنواة. وتحتوي هذه الحبيبات على سكاكر مخاطية متعددة حمضية التفاعل من ضمنها الهيبارين وهو ما يفسر إفتحها الشديدة للملونات الأساسية (أزرق الميتيلين). وتحتوي الحبيبات على المستامين والروتونين وعوامل جذب الحمضات (ECFA) والعدلات (NCFA) ومادة التاق بطيئة التفاعل (SRSA) والعوامل المنشطة للصفائح (PAF). وبينما تكون الستوبلازما غنية بالمدرحات الغليكوجينية، تغيب فعالية الفوسفاتاز القلوية والحمضية في الحبيبات. وتكون النواة غير واضحة وذات فصين غالبا، أو متعددة الفصوص وذات كروماتين كثيف ومتكتل (الشكل 10-4).



الشكل 10-4: الأسسة

يقدر زمن وجود الكريات الأسسة الناضجة في الدم إثر مغادرتها نقي العظم بحوالي 12 ساعة، ومن ثم تنتقل إلى النسيج، وهي تشبه من النواحي الوظيفية الخلايا البدينة

المتوضعة في النسيج إلا أنها تختلف عنها من حيث المنشأ والصفات المظهرية. فالخلية البدنية ذات قد أكبر (يبلغ قطرها نحو 15-20 ميكرون)، وتمتلك نواة دائرية غير مفصصة، وتحتوي ستوبلاستماها على عدد كبير من الحبيبات التي تتلون بالأحمر أو البنفسجي بواسطة أزرق التولويدين.

ب- حركية ووظيفة الأسس

تسهم الكريات البيض الأساسية إلى جانب الخلايا البدنية في إحداث الاستجابات التحسسية المسببة بالتفاعل بين المستضدات (المستأرجات) المختلفة مع الأضداد (الرواجن) من نمط الغلوبولينات المناعية (IgE) المثبتة على سطوح هذه الخلايا. ويحرض التفاعل بين الضد والمستضد تفاعل المتممة الذي يعمل على إطلاق الحبيبات بمكوناتها المختلفة المسؤولة عن الظواهر المختلفة المرافقة للاستجابات التحسسية.

ت- الدلالات المرضية لتغير نسبة الأسس

تبلغ نسبة الأسس في لطاخة الدم المحيطي نحو 0.5% (50 كرية / ملم³)، ويلاحظ ازدياد هذه النسبة إثر تناول الوجبات الغنية بالدهون. وتسهم المواد المتحررة من حبيباتها، وخاصة الهيبارين في تفكك الدهون في المصورة بحيث تصبح الأخيرة أكثر شفافية، ويزداد فيها تركيز الحموض الدسمة. وترتفع نسبة الأسس في الأمراض التحسسية وبعض الأمراض الغدية (الداء السكري وقصور الغدة الدرقية) وإثر تناول الأستروجينات وعوز الحديد، إضافة للإبيضاض النقوي المزمن والإبيضاض بالأسس. أما انخفاض نسبة الأسس فيصادف في فرط نشاط الدرق وإثر تناول الستيرويدات.


تستطيع كل من الأرومات والسليفات والنقويات الإنقسام والتكاثر والنمو تحت تأثير العوامل المحرزة لنمو الوحيدات والمحبيات (GM-CSF)، والعامل المحرض لنمو المحبيات (G-CSF)، والأنتروكينينات، وتسمى بجمعية المحبيات

التكاثرية **proliferating granulocyte pool**. ويتوقف الإنقسام الخلوي بدءاً من طور خلية النخوة وما يليها، حيث تنطلق حدثيات نخج الكريات على شكل تبدلات كيميائية حيوية وشكلية تطاول كلا من السيتوبلازما والنواة تحت تأثير عدد من عوامل النمو، وتعرف الكريات الخليفة والخلايا على شكل نعل الفرس والكريات الناضجة بجمعية النضج **Maturation pool**.

ثانياً- تطور الوحيدات


تنمو الوحيدات وتطور في نقي العظم انطلاقاً من السلالة المولدة للوحيدات (-CFU M) مروراً بالمراحل التالية:

1. أرومة الوحيدة **Monoblast** : يبلغ قطر الكرية نحو 14-20 ميكرونا، تكون السيتوبلازما قليلة خالية عادة من الحبيبات وبلون أزرق شاحب، أو أزرق رمادي. تبدو النواة دائرية أو بيضوية وقد يشاهد فيها الخصاص بسيط، وهي ذات كروماتين ناعم ومبعثر، وتحتوي نوية أو نويتين كبيرتا الحجم عادة (الشكل 11-4).



الشكل 11-4: أرومة الوحيدة

2. سليفة الوحيدة **Promonocyte** : يبلغ قطر الكرية نحو 14-18 ميكرونا، وهي ذات سيتوبلازما متوسطة الكمية بلون أزرق رمادي، وقد تحتوي حبيبات لازوردية ناعمة. تبدو النواة غير منتظمة الشكل ملتفة أو مطوية وذات كروماتين أكثر تكتلاً من الخلية السابقة، وقد يشاهد فيها نوية واحدة (الشكل 12-4).




الشكل 12-4: سليقة الوحيدة

3. الوحيدة Monocyte:

أ-الصفات الشكلية والكيميائية الحيوية

يبلغ قطر الكرية نحو 15-25 ميكرونا، وهي ذات سيتوبلازما بلون رمادي شاحب (ليلكي)، وتحتوي حبيبات لازوردية ناعمة جدا تتوزع بشكل غير منتظم وتشبه الغبار. تحتوي الحبيبات على أنزيمات الأستيراز غير النوعية والفسفataز الحامضية والبيروكسيداز مع غياب لفعالية الفسفataز القلوية. أما المندخرات الغليكوجينية والدهون الفسفورية فتوجد بكميات قليلة. وتتضمن السيتوبلازما كتلا سمراء أو بيضاء لدى الأشخاص المصابين بالمalaria (البرداء). تكون النواة بيضوية أو شريطية، أو بشكل حرف S، أو بشكل الكلية أو حبة الفاصولياء، أو بشكل الكف، وذات كروماتين غير متكتل يظهر عادة بلون وردي (الشكل 13-4).



الشكل 13-4: الوحيدة

ب-حركية ووظائف الوحيدات

تغادر الوحيدات الناضجة النقي إلى الدم حيث تبقى لفترات زمنية مختلفة تتراوح بين بضع ساعات وستة أيام ، ثم تغادر الدم إلى النسيج حيث تتحول إلى خلايا بلعمية كبيرة Macrophages ، تمتلك مقدرة بلعمية كبيرة كابتلاع عدد كبير من الجراثيم (100 جرثومة) أو كريات حمر كاملة، أو طفيليات الملاريا. وهي تشكل أهم مكونات الحملة الشبكية البطانية وتتواجد في كل من الكبد (خلايا كوبفر Kupffer cells) ، والرئات والطحال ، ونقي العظم، والعقد اللمفاوية. أما البلاعم المتوضعة في الجلد والنسيج الضامة فتعرف بالخلايا الناصجة Histocytes ، وتستطيع الخلايا الناصجة الانقسام والتكاثر في موضعها لدى حدوث إصابة التهابية وتحيط بالعوامل الغريبة وتعمل على تفكيكها، وخاصة بعد تفعيلها من قبل اللمفاويات التائية المنشطة. وتلعب الوحيدات إلى جانب وظيفتها البلعمية المتمثلة بابتلاع الجراثيم والحماة والفقور وأشلاء الخلايا المتموتة (كريات بيض وحمر) بدور مناعي مهم من خلال عرض المكونات الضدية للأجسام الغريبة التي تدخل إلى الجسم وتقديمه للخلايا اللمفاوية التائية والبائية. و تقوم البلاعم النسيجية بإفراز العامل المحرض لنمو سلالة المحبيات والوحيدات (GM-CSF) والعامل المحرض لنمو المحبيات (G-CSF) والأنتروكين (IL1) الذي ينشط تكاثر اللمفاويات وعامل نخر الورم (TNF) . وتعرض جميع هذه العوامل إنتاج المحبيات والوحيدات من نقي العظم أثناء الإصابات الالتهابية. كما تسهم الوحيدات في تركيب بعض أجزاء المتممة والأنتروفرون وإفرازها.

ت-الدلالات المرضية لتغير نسبة الوحيدات

تبلغ نسبة الوحيدات نحو 4-8% من مجمل الكريات البيض في الحالة السوية، وترتفع نسبة الوحيدات في الدم المحيط في الأحماج المزمنة، مثل التدرن والتهاب الشغاف، والحمى التيفية والحمى المالطية، والملاريا واللايشمانيا الحشوية، والتشمع وأمراض


الغراء. كما يصادف ارتفاع نسبتها في الأمراض الخبيثة، مثل داء هودجكن وورم النقي المتعدد، وتليف النقي والسرطانات الحشوية، إضافة لايضاض الدم بالوحيدات وقلة العدلات الحادة والمزمنة. أما نقص الوحيدات فيلاحظ في فقر الدم اللاتنسجي، وبعض أمراض المناعة الذاتية وبعض أنواع ابيضاضات الدم وكذلك إثر المعالجة بالأشعة والستيرويدات .

ثالثا- تطور اللمفاويات

يتم إنتاج الخلايا اللمفاوية و تطورها في مختلف الأعضاء المكونة للمف (العقد اللمفاوية وال тимوس والطحال واللوزتين، ومختلف التوضعات اللمفية في نقي العظم والمعي وأماكن أخرى)، انطلاقا من الخلايا الجذعية اللمفاوية (LSC). فالخلايا الجذعية اللمفاوية التي تشتق من الخلية الجذعية متعددة القدرات (PSC) تهاجر نقي العظم إلى الأعضاء المكونة للمف حيث تتطور في التيموس إلى خلايا لمفاوية تائية-T Lymphocytes تكون مسؤولة بشكل أساسي عن المناعة بتوسط الخلايا (مناعة الخلايا التائية) . أما اللمفاويات البائية B- Lymphocytes المسؤولة عن إنتاج الأضداد (المناعة الخلطية) فتتطور من الخلايا الجذعية اللمفية بعد معالجتها في نقي العظم. وتتصف اللمفاويات البائية واللمفاويات التائية بالقدرة على التحول إلى أرومات مناعية Immunoblast لدى تعرضها للتحريض بالأضداد أو بعض منشطات الانقسام. وتمتلك الخلايا الأخيرة القدرة على الانقسام والتطور إلى خلايا ناضجة منتجة للأضداد تعرف بالخلايا المصورة Plasma cells أو خلايا تائية مفعلة. ويتم نمو الخلايا اللمفاوية وتطورها عبر خط نضج معلوم يمر بالمراحل التالية:


1. الأرومة اللمفاوية Lymphoblast: يبلغ قطر الكرية نحو 15-20 ميكرونا، السيتوبلازما عديمة الحبيبات بلون أزرق قاتم مع تناقص شدة اللون في المنطقة المحيطة بالنواة. تأخذ النواة شكلا دائريا أو بيضويا، وهي ذات كروماتين مبعثر، وتحتوي نوية واحدة أو نويتين (الشكل 14-4). وتكون نسبة حجم النواة إلى

الستوبلازما 4:1، وتشاهد الأرومات فقط في الأعضاء المكونة للمف ولا تشاهد في الدم المحيطي.



الشكل 14-4: الأرومة اللمفاوية


2. سليفة اللمفاوية **Prolymphocyte**: يبلغ قطر الكرية نحو 15-18 ميكرونا، تكون الستوبلازما بلون أزرق قاتم أو أزرق متوسط الشدة، ويمكن أن تحتوي حبيبات لازوردية قليلة وصغيرة. تكون النواة بيضوية، وقد تحتوي على نوية واحدة أحيانا وهي ذات كروماتين متكتل قليلا (لشكل 15-4). وتكون نسبة حجم النواة إلى حجم الستوبلازما بين 1:4 و 1:3.



الشكل 15-4: سليفة اللمفاوية


3. اللمفاوية الناضجة **Mature Lymphocyte**: توجد اللمفاوية الناضجة بشكلين:

أ- اللمفاوية الكبيرة **Large Lymphocyte** : يبلغ قطر الخلية نحو 9-17 ميكرونا، تكون السيتوبلازما بلون أزرق سماوي، وقد تحتوي أحيانا بعض الحبيبات اللازوردية بلون أرجواني أو بنفسجي (الشكل 16-4). النواة دائرية أو بيضوية الشكل تنحسر على أحد جوانب الخلية ويكون الكروماتين متكتلا وبلون بنفسجي غامق ، وتكون نسبة النواة إلى السيتوبلازما نحو 2:1



الشكل 16-4: اللمفاوية الكبيرة

ب- اللمفاوية الصغيرة **Small Lymphocyte** : يبلغ قطر الخلية نحو 6-9 ميكرونا، تبدو السيتوبلازما بشكل حلقة رقيقة حول النواة وبلون أزرق سماوي فاتح (الشكل 17-4). تكون النواة دائرية مركزية والكروماتين فيها متكتل بشدة وبلون بنفسجي غامق، وتكون نسبة النواة إلى السيتوبلازما ما بين 4:1 و 3:1.



الشكل 17-4: اللمفاوية الصغيرة

لا تحتوي اللمفاويات أنزيمات البيروكسيدياز والفسفاتاز القلوية والأستيراز النوعية، بينما توجد الفسففاتاز القلوية والأستيراز غير النوعية بكميات قليلة. ولا تتضمن اللمفاويات مدخرات غليكوجينية، أو شحوم فسفورية في الحالة السوية.

ث- حركية ووظائف لللمفاويات

تتمتاز اللمفاويات بقدرتها على الانتقال من الدم إلى اللمف والنسج، ومن ثم العودة ثانية إلى الدم عن طريق القناة اللمفية الصدرية، وتتمتاز بمقدرتها على التحول مجدداً إلى خلايا أرومة بوجود مكونات ضدية أو منشطات مناسبة. وبخلاف الكريات البيض الأخرى تعيش هذه الكريات لفترة طويلة (أكثر من 20 سنة) ويمكن لبعضها أن يستمر طوال حياة الإنسان.

أن حديثات نضج اللمفاويات الثانية وتمايزها في التيموس تجري في وقت مبكر قبل الولادة، وتستمر عدة أشهر بعدها. ويعتقد أن عملية التمايز تتم بتوسط عوامل هرمونية تعرف بالهرمون التوتيمي **Tymic hormone**. ويعتقد بأن هذا الهرمون يتوسط عمليات المعالجة البدئية للخلايا اللمفاوية الجذعية في التيموس وتحولها إلى خلايا ناضجة. كما ويعتقد أنه يشارك أيضاً في عملية تفعيل اللمفاويات الثانية بعد مغادرتها التيموس إلى النسج اللمفاوية، وكذلك تحريض تكاثر هذه الخلايا. أما تمايز الخلايا البائية ونضجها فيتم من خلال معاملتها البدئية في الكبد في منتصف الحياة الجنينية وفي النقي في نهاية الحياة الجنينية وما بعد الولادة.

تشكل اللمفاويات التائية المسؤولة عن المناعة الخلوية ما نسبته 75% من مجمل الكريات اللمفاوية فيما تشكل الخلايا البائية المسؤولة عن المناعة الخلطية ما نسبته 25% من مجمل عدد هذه الكريات. وتمتلك الخلايا التائية واسمات عديدة تسمح بتمييزها عن الخلايا البائية، يعد وجود مستقبلات خاصة لكريات دم الخروف وتعرف بـ **CD2** من أهمها. وتقسم اللمفاويات التائية باستخدام أضداد وحيدة النسيلة (**Anti CD4**، **Anti CD8**) إلى ثلاث مجموعات كبيرة: اللمفاويات التائية المساعدة **helper cell**، والخلايا القاتلة أو السامة **cytotoxic cells**، والخلايا الكابتة **suppressor cells**. أما اللمفاويات البائية فيتم تمييزها عن اللمفاويات التائية بوجود واسمات خاصة، أهمها وجود الغلوبولينات المناعية من النمط **(IgS)s** سطحها والتي تعمل كمستقبل للعديد من المكونات الضدية.

وتقوم معظم المستضدات بتفعيل كل من اللمفاويات البائية واللمفاويات التائية، و
تستطيع بعض أنواع اللمفاويات التائية المفعلة (الخلايا التائية المساعدة) إثارة الجهاز
المناعي من خلال إنتاج سلسلة من البروتينات الوسيطة، والتي تعرف
باللمفومكينات (الإنترلوكينات)، والتي تؤثر بدورها على تكاثر ونمو وتمايز الخلايا
الجذعية اللمفاوية والأرومات اللمفاوية وكذلك تحريض الخلايا البائية لتشكيل الخلايا
المصورية، وتفعيل جملة البلاعم وغيرها من الاستجابات المناعية.

تبلغ نسبة اللمفاويات في لطاخة الدم المحيطي نحو 20-40% لدى الكهول فيما
ترتفع لدى الولدان والأطفال حتى سن الثانية عشرة إلى نحو 40-60% في الحالة
السوية.

ث- الدلالات المرضية لتغير نسبة اللمفاويات


يلاحظ ارتفاع نسبة اللمفاويات في الانتانات الحادة بالحمات (النكاف، الحصبة
التهاب الكبد)، والانتانات الجرثومية الحادة (السعال الديكي) والمزمنة (التدرن، الحمى
المالطية). ويصادف ارتفاع نسبة اللمفاويات في الأمراض الدموية الخبيثة (الايبيضاض
اللمفاوي المزمن، واللمفومات الخبيثة، إلى جانب أمراض المناعة الذاتية، وفرط نشاط
الدرق، والتدخين، وتعاطي البنسيلين وداء وحيدات النوى الخمجي، وداء المقوسات.
أما انخفاض نسبة هذه الكريات فيلاحظ في أمراض نقص المناعة الخلقي أو
المكتسب (الايدز)، وبعض الأمراض الدموية (هودجكن، فقر الدم اللاتنسجي).
وكذلك بعد التعرض للأشعة، والمعالجة بالستيرويدات، والأدوية السامة للخلايا، إضافة
للقصور الكلوي المزمن وإثر الحروق والرضوض.

الفصل الثالث

الأشكال غير السوية للكريات البيض الناضجة

تتضمن الأشكال غير السوية للكريات الناضجة وبخاصة المحبة ، والتي يمكن مشاهدتها في لطاخات الدم المحيطي الملونة بملونات رامانوفسكي (غميز، رايت) الشذوذات الشكلية التالية:


1- الحبيبات السامة **Toxic granules** : وهي حبيبات لازوردية كبيرة الحجم غير منتظمة بلون أزرق غامق أو أسود (الشكل 18-4). وهي ذات فعالية بيروكسيدازية واضحة وتترافق بترسب بروتين الجسيمات الريبية المسبب بالمسقلبات السامة . يمكن أن تشاهد الحبيبات السامة في الخلايا على شكل نعل الفرس و الكريات العدلة المفصصة ، أو وحيدات النوى في الأحماج الشديدة، والحروق والأمراض الخبيثة (الايضااضات)، و في التسممات الدوائية.



الشكل 18-4: الحبيبات السامة


2- أجسام دول **Döhle bodies**: وهي مناطق بلون أزرق أليف للأسس ومجردة من الحبيبات تتوضع عادة في محيط الستوبلازما (الشكل 19-4). تترافق هذه المشتملات مع وجود بقايا RNA في الشبكة السيتوبلاسمية الداخلية. تشاهد هذه الأجسام عادة في العدلات ، ويمكن مشاهدتها في الوحيدات أو اللمفاويات في الأحماج الفيروسية والحروق والتسممات الدوائية. و يمكن أن تشاهد هذه الأجسام أثناء

الإصابة باضطراب May- Hegglin الوراثي في العدلات والحمضات
والوحيدات. الذي يترافق مع صفيحات ضخمة (عرطلة) وقلة الصفيحات



الشكل 19-4: أجسام دول


3- فرط التفصص Hyper segmentation : وهي الحالة التي تتمثل بوجود خمسة فصوص أو أكثر في نواة الكريات البيض العدلة (الشكل 20-4)، وتصادف هذه الحالة بشكل خاص في عوز الفيتامين B12 المترافق مع وجود كريات حمراء كبيرة الحجم. ويشاهد فرط تفصص العدلات الكاذب في الكريات الكهلة.




الشكل 20-4: فرط التفصص

4- اضطراب Pelger Huët : وهو مرض وراثي يترافق بوجود كريات عدلة غير مفصصة لدى متماثلي اللواقح ، أو قليلة التفصص (فصين فقط) لدى متخالفي

الوواقع (الشكل 21-4)، وقد يلاحظ مثل هذا الشذوذ في بعض ايضاضات الدم والإثانات.




A



B


الشكل 21-4: عدلات قليلة التلصص A وعديمة التلصص B

5- متلازمة **Chèdiak-Higashi**: وهي متلازمة وراثية نادرة، تصادف لدى الأطفال والبالغين في مقتبل العمر. وتتميز هذه المتلازمة بوجود حبيبات كبيرة إيجابية البيروكسيداز مترافقة مع وجود جسيمات حالة غير سوية في العدلات والكريات البيض الأخرى، مثل الوحيدات واللمفاويات (الشكل 22-4). وتظهر العدلات ضعفا في الانجذاب الكيميائي وتأخرا في إبادة الجراثيم. ويعاني الأشخاص المصابون بهذا المرض من كثرة حدوث الأحماج، والتي يعتقد أنها على علاقة بعدم فعالية العدلات المضادة للجراثيم.




الشكل 22-4: حبيبات إيجابية البيروكسيداز في العدلات

6- مشتملات **Alder-reilly**: وهي عبارة عن حبيبات بلون أحمر أرجواني تشبه الحبيبات السامة كبيرة الحجم، ويحيط بكل منها هالة نيرة (الشكل 23-4). وهي تنجم عن ترسب السكاكر المتعددة المخاطية، وتشاهد في الكريات البيض العذلة والحمضة والأسنة، ويمكن مشاهدتها أحيانا في الوحيدات واللمفاويات. وتصادف هذه المشتملات في بعض الأنماط الوراثية لداء عديدات السكاريد المخاطية **Mucopolysaccharidosis**.




الشكل 23-4: مشتملات **Alder-reilly**

- 7- اللمفاويات ذات النواتين **Binucleated lymphocytes**: تشاهد اللمفاويات ذات النواتين في الأحماج الفيروسية. ويعد ارتفاع نسبة هذه الكريات عن 5٪ من مؤشرات الابيضاض اللمفاوي أو الغرن اللمفي **Lymphosarcoma**.
 8- اللمفاويات ذات الفجوات **Vacuolated lymphocytes**: يعد وجود الفجوات في الكريات البيض اللمفاوية من علامات تنكس الخلية (الشكل 25-4). وتصادف اللمفاويات الفجوية بكثرة في بعض الأمراض مثل ورم بوركيث اللمفاوي، وداء **Niemann-Pik**، ومتلازمة هورلر **Hurler syndrome**. وتصادف الفجوات ضمن الكريات اللمفاوية في الأحماج الفيروسية والإشعاعات والمعالجة الكيميائية.




الشكل 25-4: اللمفاويات الفجوية

- 9- **Smudge cells**: عبارة عن بقايا نووية للكريات اللمفية المخربة (الشكل 26-4)، تصادف عادة بنسبة قليلة في اللطاخات السوية نتيجة خطأ في تحضير اللطاخات الدموية مرتبط بتطبيق ضغط زائد على القطرة الدموية. كما ويمكن أن تصادف بنسبة كبيرة في كثرة اللمفاويات، وخاصة الابيضاض اللمفاوي المزمن.



الشكل 26-4: البقايا النووية للكريات البيض

10- أجسام أور **Auer rods**: تظهر أجسام أور في سيتوبلازما الأرومة النقوية Meloblast والسليفة النقوية Promelocyte على شكل عصيات متطاولة دقيقة تشبه حزمة الحطب وبلون أحمر (الشكل 27-4)، وهي تشاهد في الالبيضايات النقوية الحادة.



الشكل 27-4: أجسام أور

الباب الخامس

اعتلالات الكريات البيض

الفصل الأول

الاعتلالات الكيفية في الكريات البيض

تشمل الاعتلالات الكيفية عددا من الاضطرابات في وظائف الكريات البيض، مثل الحركة والانجذاب الكيميائي والقتل .

أولا: اضطرابات الحركة والانجذاب الكيميائي

تصنف اضطرابات الحركة والانجذاب ضمن الشذوذات النوعية، فيمكن لخلل حركة الكريات البيض أن يصادف في بعض الأمراض، مثل التهاب الشريان الرئوي، وتشمع الكبد، والأورام الحبيبية المزمنة (CGD)، إضافة للمرضى الذين يتناولون الستيروئيدات. ويصادف اختلال الحركة والانجذاب الكيميائي في اعتلال شدياق- هيغاشي، والانتانات، والمرضى الذين يتميزون بوجود نسبة مرتفعة من الغلوبولينات المناعية E (IgE).

ثانيا: اضطرابات القتل

ترتبط اضطرابات القتل بعدم قدرة العدلات والوحيدات على قتل الجراثيم المتلعة بسبب خلل في منظومات إنتاج المركبات شديدة الأكسدة ذات التأثير المبيد للجراثيم. ويشمل هذا الاضطراب الورم الحبيبي المزمن وعوز الميلوبيروكسيداز، واعتلالات وظيفية أخرى في الكريات العدة.

1- الورم الحبيبي المزمن: يعد هذا المرض من أكثر الاعتلالات التي تتميز بمقدرة العدلات والوحيدات على ابتلاع الجراثيم، ولكن لا تستطيع حلها وقتلها. ويعد هذا المرض من الأمراض الوراثية النادرة، والذي لا يستطيع فيه الكريات قتل بعض

الميكروبات المبتلعة ، مثل الميكروبات إيجابية الكتلارز ، والجراثيم سلبية غرام ، ومختلف الفطريات وخاصة الفطريات الرشاشية *Aspergilli* . ففي هذه الحالة لا يتم إنتاج وتحرر كميات كافية من فوق أكسيد الهيدروجين والماء الأكسجيني والجلدور الحرة في الحويصلات البلعمية .

يرتبط الورم الحبيبي المزمن لدى معظم المرضى بخلل مورثي محمول على الصبغي الجنسي X . ولكن يمكن للمرض أن ينتقل في عائلة واحدة من بين كل أربع عائلات بوساطة مورثات جسمية . ولكن بخلاف الخلل المورثي الجنسي يحمل الأبوان في الحالة الأخيرة كريات سوية وظيفيا . ويمكن لبعض حالات الورم الحبيبي المزمن أن تترافق بعوز حاد في أنزيم الغلوكوز -6- فسفات ديهيدروجيناز .


2- عوز أنزيم الميلوبيروكسيداز: عوز الميلوبيروكسيداز مرض وراثي ينقل بوساطة مورثات جسمية ، ويتصف بغياب أنزيم الميلوبيروكسيداز في الكريات البيض العذلة والوحيدات وتواجدها في الحمضات . وتتوسط هذه الأنزيم في الحالة السوية تدمير الجراثيم بوساطة الماء الأكسجيني والهيبيوكلوريت . ولا تكون هذه الاضطرابات الوظيفية شديدة ، ولا تترافق عادة بأحماج خطيرة . ويصادف عوز الأنزيم الولادي لدى مرضى الابيضاض الحاد والمزمن ، ومتلازمات عدم تنسج النقي ، إضافة إلى داء هودجكن والسرطانات .

3- الاعتلالات الوظيفية الأخرى في العدلات: لقد تم إظهار أكثر من 15 خلا وراثيا و30 اعتلالا في وظيفة العدلات ، من بينها عوز اللاكتوفيرين . وهو من الأمراض النادرة التي تتصف بقلة الحبيبات النوعية في العدلات ، وخلو الحبيبات المتبقية من بروتين اللاكتوفيرين . ويلاحظ هذا الخلل في الالتهابات القيفية ، وخاصة الخراجات الجلدية العميقة .

4- اعتلال الوحيدات - البلاءم: ترافق الاعتلالات النوعية في الوحيدات - البلاءم أمراض اختزان الشحوم . وهي أمراض وراثية نادرة تميل فيها البلاءم إلى تكديس


بعض المركبات الشحمية والاحتشاد في النسيج الشبكية البطانية، وهي تشمل اعتلال Gaucher، واعتلال Niemann-Pick.

أ-اعتلال **Gaucher**: وهو مرض وراثي كثير المصادفة لدى الأطفال، وتختلف تظاهراته من شخص إلى آخر. ففي الحالات الخفيفة يمكن للمرض أن يعيشوا حياة عادية، أما في الإصابات الشديدة فيموت المرضى مبكرا. يتصف المرض بعوز أنزيم بيتا غلوكوسيريبروزيداز **Beta-glucocerebrosidas**، التي تتوسط في الحالة السوية شطر الغلوكوز من الشحم السفينغوميليني الغلوكوزيل سيراميد **Glucosylseramide**. ونتيجة عوز هذه الأنزيم يتراكم هذا السيربروزيد في البلاعم والتي تعرف في هذه الحالة بخلايا **Gaucher**. وتتميز هذه الخلايا بكبر حجمها وبوجود نواة إلى ثلاث نوى وسيتوبلازما متجمدة (الشكل 1-5). وتتجمع هذه الخلايا في نقي العظم والطحال، وأعضاء الجملة الشبكية البطانية الأخرى. ويسبب ارتشاح النقي هذه الكريات هبوطا في إنتاج الكريات الحمر والكريات البيض.



الشكل 1-5: خلية Gaucher

ب- اعتلال **Niemann-Pick**: وهو يشبه مرض **Gaucher** من حيث كونه مرضاً وراثياً مرتبطاً بخلل استقلاب الشحوم، وهو مرض مميت يصيب الرضع والأطفال الذين يتوفون في عمر الخمس سنوات تقريباً. يتصف هذا المرض بعوز الأنزيم التي تتوسط نزع فسفوريل الكولين من الشحوم الفسفورية السفينغوميلينية. وبسبب غياب الأنزيم يتراكم السفينغوميلين في البلاعم النسيجية والتي تعرف بخلايا **Pick** والتي تشبه خلية **Gaucher** مع سيتوبلازما رغوية المظهر (الشكل 2-5).



الشكل 2-5: خلية **Pick**

الفصل الثاني

الاعتلالات الكمية في الكريات البيض (أمراض الكريات البيض غير الخبيثة)

أولاً: التغيرات الكمية في تعداد الكريا البيض

تتضمن الاضطرابات الكمية للكريات البيض ازدياد أو تناقص عددها الكلي عن المعدل السوي.

يعرف ازدياد عدد الكريات البيض إلى ما فوق المعدل السوي بكثرة البيض **Leucocytosis** ، ويمكن لكثرة البيض أن تكون فيزيولوجية (تبدلات فسيولوجية، وجبة بروتينية، التمارين، الحمل، الكرب، الطفولة، الولادة)، أو مرضية. ومن أكثر الأسباب الشائعة لكثرة البيض الأحماج والتزوف، والحروق والرضوض، واحتشاء عضلة القلب، والأورام الخبيثة وانحلال الدم، إضافة إلى الأمراض الغرائية الوعائية، وبعض أمراض الاستقلاب (النقرس، السبات السكري)، وكذلك تعاطي بعض المواد الدوائية (الديجيتال، الأدرينالين، الستيروئيدات)، وبعض المواد الكيميائية والسموم. وقد ترتبط كثرة البيض بارتفاع عدد نمط أو أكثر من أنماط الكريات البيض وتعرف هذه الحالات بكثرة العدلات **Neutrophilia**، أو كثرة الحمضات **Eosinophilia**، أو كثرة الأسس **Basophilia**، أو كثرة الوحيدات **Monocytosis**، والتي تعرضنا لأهم مسبباتها.

أما تناقص عدد الكريات البيض إلى ما دون المعدل السوي، فيعرف بقلة الكريات البيض **Leucopenia**، وغالبا ما يظهر ذلك نتيجة لسوء التغذية أو نتيجة لتأثير العقاقير التي تكبت نقي العظم. ويتجلى هذا النقص بصورة خاصة في عدد المحببات وعلى رأسها العدلات **Neutropenia**، وكذلك الحمضات **Eosinopenia**، أو الأسس **Basopenia**، وبدرجات أقل في عدد

الوحيدات Monocytopenia ولقد أشرنا أيضا إلى أهم مسببات قلة كل نمط من أنماط هذه الكريات.

وتصنف الاضطرابات الكمية في عدد الكريات البيض من الناحية المرضية في مجموعتين: أمراض الكريات البيض غير الخبيثة وأمراض الكريات البيض الخبيثة .

ثانيا: أمراض الكريات البيض غير الخبيثة

تتضمن أمراض الكريات البيض غير الخبيثة الاعتلالات التالية:

1- ندرة الخبيثات Agranulocytosis وقلّة

العدلات Neutropenia.

يقصد بندرة المحببات النقص الشديد في عدد المعتدلات أو غيابها الكلي من الدم المحيطي، أما قلة العدلات فيشير إلى نقص عددها عن الحد الأدنى السوي (2000/ملم³)

ويعد ندرة المحببات من الأمراض النادرة، والتي تتصف بآفات حمجية في الفم و البلعوم والشرح والجلد.

وترتبط آلية ندرة المحببات أو قلة العدلات، إما بشذوذ في إنتاج المحببات على علاقة بغياب العناصر النقية، أو اضطراب في النضج (تطاول زمن النضج وتناقص انقسام الخلايا)، ويمكن أن ترتبط ندرة المحببات بآلية محيطية تنجم عن فرط تخرب المحببات بآلية مناعية .

أ- الأسباب

- تناول الأدوية السامة للنقي: مثل مضادات الغدة الدرقية والمدرات والفينيل بوتازون ومضادات الانقسام الخلوي، والمضادات الحيوية، ومركبات السلفا، ومضادات الهستامين، والتدرن والصرع والملاريا والداء السكري، والبتزين، والأميدروبيرين.
- التعرض للإشعاعات العلاجية أو التشخيصية.

- الإصابة بالأحماج الفيروسية والجرثومية والطفيلية، مثل الحمى التيفية، والتهاب الكبد الهمجي، والأنفلونزا، والملاريا، وداء البروسيل.
- فرط نشاط الطحال أو ارتشاح النقي بالأورام
- عدم القدرة على إنتاج الكريات البيض المحببة كما في فقر الدم اللاتنسجي وفقر الدم العرطل وندرة المحببات الوراثي وقلة العدلات مجهول السبب وقلة العدلات الدوري (كل 3 أسابيع)
- نقص المحببات بسبب تشكل أضداد منيعة للذات تعمل على تخريب الكريات المحببة.

ب- الأعراض

تتناسب شدة الأعراض مع درجة نقص العدلات فهي شديدة وخطيرة عندما يكون عدد العدلات دون 500/ملم³، ومتوسطة معتدلة الشدة إذا كان عدد الكريات بين 500-1000/ملم³، وندرة لدى كون عدد العدلات أكثر من 1000/ملم³.

تبدأ الأعراض فجأة بشكل تقرحات مؤلمة في الفم والبلعوم مع ضخامة العقد اللمفاوية الناحية، والتي تترافق بترفع حروري وصداع وآلام بطنية. ويمكن أن تصيب هذه الالتهابات نسجا أخرى، وأكثرها خطورة خمج الدم. وتكون الجراثيم المحدثة لهذه الالتهابات سلبية الغرام في ندرة المحببات الحاد وإيجابية الغرام في ندرة المحببات المزمن.

وتعتمد المعالجة على معرفة السبب واستبعاده ومكافحة الأحماج بالمضادات الحيوية التي لا تؤثر على الكريات المحببة، وتفادي الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية.

2- كثرة الوحيدات الهمجي Infactios Mononucleonis

كثرة الوحيدات الهمجية (داء وحيدات النوى الهمجي) مرض حاد تسببه حمى Epstein-Barr Virus (EBV)، ويعرف أيضا بالحمى


الغدية Glandular Fever. وتصيب الحمى اللمفاويات البائية التي تحرض بدورها تفاعل مناعي شديد تتوسطه اللمفاويات التائية، والتي تفعل وتهاجم الكريات اللمفاوية المصابة بالحمى وتمنع التكاثر الخبيث لللمفاويات البائية.

أ- الأعراض

يحدث المرض في كافة الأعمار وخاصة الشباب ويصيب الذكور أكثر من الإناث. وتظهر الأعراض بعد فترة حضانة تتراوح بين 5-7 أسابيع، حيث يشكو المريض من ترفع حروري مع التهاب البلعوم و وجود غشاء كاذب في 50% من الحالات. و يترافق المرض بتضخم العقد اللمفاوية في المنطقة الرقبية مع ضخامة كبدية وطحالية في بعض الحالات. ومع تقدم الإصابة تظهر أعراض الإصابة العصبية المتمثلة بصداع وتصلب الرقبة مع آلام شديدة، وقد يحدث التهاب التامور أو عضلة القلب أو العصب البصري أو النسيج الرئوي. ومن مظاهر المرض الأخرى الرعاف والألم المفصلي والطفح الجلدي والحلال الدم نتيجة وجود أضداد مناعية باردة .

ب- الموجودات المخبرية

- قد تنقص الكريات البيض في بداية المرض، أما بعد ذلك فيرتفع تعداد الكريات البيض (10000-30000) مع زيادة نسبة اللمفاويات التي قد تصل إلى 90% مع نقص في نسبة العدلات.
- تظهر اللطاخة الدموية وجود لمفاويات غير نموذجية وتشكل 50-90% من الكريات البيض، وتنصف اللمفاويات الشاذة بـ كبر حجمها وبوجود نواة ذات كروماتين ناعم، وستوبلازما بلون أزرق غامق شديدة الكثافة في محيط الخلية، وتشبه هذه اللمفاويات الوحيدات (الشكل 3-5).



الشكل 3-5: كثرة الوحيدات الغمجية

- يظهر مصل المريض تفاعل بول - بونيل إيجابي Paul-Bunnet) وجود أضداد (نمط IgM) قادرة على رص الكريات الحمر لدم الخروف خلال الأسبوع الأول من المرض وحتى ستة أسابيع. ويظهر المصل كذلك إيجابية اختبار MNI) امتزاز الأضداد بالكريات الحمر للحصان المعالجة بالفورمول).

ولاستدعي الإصابة بهذا المرض معالجة نوعية حيث يمكن للمريض الشفاء بشكل عفوي واكتساب مناعة دائمة، ويكتفى في هذه الحالة بإعطاء المسكنات

والمظهرات. أما في الحالات الشديدة التي تترافق بإصابات الكبد والأعراض
العصبية فيعطى المريض الستيروئيدات



الفصل الثالث

الاعتلالات الكمية في الكريات البيض

أمراض الكريات البيض الخبيثة

(ابيضاضات الدم Leukemias)

ابيضاض الدم leukemia مرض مجهول السبب يتصف بزيادة مطلقة في الكريات البيض أو أروماها بنتيجة التكاثر غير المنتظم. وعادة ماتحتشد هذه الكريات في الدم، وتحصل الوفيات بابيضاض الدم والتي تبلغ نسبتها نحو 4٪ من مجموع الوفيات بالأمراض الخبيثة، بسبب المضاعفات الناتجة عن ارتشاح النقي والنسج.

أولاً: أسباب ابيضاض الدم

بالرغم من كون إمرضية ابيضاضات الدم لاتزال مجهولة السبب والآلية، إلا أنه تتوفر بعض الدلائل على تورط عدد من العوامل التي تزيد خطر الإصابة أو تؤهب لحدوثها، والتي سيقف في إطار العديد من النظريات التي حاولت تعليل المرض، من أهمها:

1- النظرية الخمجية Infective Theory : ترجح النظرية الخمجية دور الخمج بأحد الحمات إلى جانب تركيب مورثي مؤهب للإصابة، إضافة إلى شروط مهئية أخرى كالحالة الغذائية وفعالية الغدد الصم . فلقد تبين أن الحمى HTLV متورطة في حدوث ابيضاض حاد باللمفاويات T ، كما ويمكن للحمى EBV أن تسبب في إحداث لمفوما بوركيت Burkitt .

2- النظرية التنشئية Neoplastic Theory : تنطلق هذه النظرية من الإجماع في الرأي على أن ابيضاض الدم مرض خبيث ناتج عن تكاثر غير منتظم للكريات البيض، ويشبه في السيرورة والإنذار الأورام الخبيثة، وهو غير قابل للهدأة بشكل تلقائي.

3- نظرية التشعيع Irradiation Theory : يعد التعرض للأشعة وفقا لهذه

النظرية عاملا مؤهبا للمرض من خلال التغيرات التي تحدثها في صبغيات الخلايا وتثبيت الجهاز المناعي. وتنطلق هذه النظرية من حقيقة كون ابيضاضات الدم أكثر مصادفة لدى الأشخاص الذين يتعرضون للإشعاع لفترة طويلة، كأطباء الأشعة، والمرضى الذين يتعرضون للأشعة بهدف التشخيص أو العلاج ، إضافة إلى الناجين من الكارثة النووية في هيروشيما وتشينوبل.

4- النظرية الوراثية ومتلازمات نقص المناعة: تؤسس هذه النظرية على ارتفاع نسبة الإصابة بالمرض بين أفراد العائلة الواحدة ،ولدى التوائم المتشابهة. وترتفع نسبة الإصابة في بعض الشذوات الصبغية مثل المنغولية، وصبغي فيلادلفيا ، إضافة إلى ذلك غالبا ما يكون النمط المورثي شاذا في الابيضاضات الحادة ،ولكن لم تسجل تغيرات صبغية ثابتة. وترتفع نسبة الإصابة في متلازمات نقص المناعة، كمتلازمة داون وفانكوني.

5- التعرض للمواد الكيميائية: قد يسبب التعرض لبعض المواد الكيميائية ابيضاض الدم ، فلقد لوحظ ارتفاع نسبة الإصابة لدى عمال المطابع المعرضين لمادة البيترين وهي المادة الواسعة الاستخدام أيضا في صناعة الأحذية والكاوتشوك ، وسجلت نسبة مرتفعة للمرض لدى صانعي ومستخدمي المبيدات الحشرية الكلورية والفسفورية.

5- الأدوية والعوامل الهرمونية: هناك العديد من الدلائل التي تشير إلى تورط بعض الأدوية، وخاصة الأدوية المولكلة والمضادة للانقسام، والتي تؤهب للإبيضاض، من خلال التغيرات الصبغية التي تحدثها ونقص المناعة المرتبط بذلك. وأظهرت التجارب على الحيوانات المخبرية تورط الهرمونات الستيرويدية، بما فيها الأستروجينات والأندروجينات في رفع نسبة الإصابة ، ولكن لم يؤكد دور هذه الهرمونات في إحداث ابيضاض الدم عند الإنسان.

وتصنف ابيضاضات الدم عموما في مجموعتين كبيرتين، هما: الالبيضايات الحادة والالبيضايات المزمنة.

ثانيا: الالبيضايات الحادة

تتميز الالبيضايات الحادة بتكاثر خبيث لطلائع خلايا دموية غير متميزة أو قليلة التمايز ، وعاجزة عن متابعة نضجها، وتأخذ هذه الخلايا شكل أرومات لمفاوية أو نقوية أو أرومات حمراء، تغزو النقي والدم في أغلب الأحيان وتترافق بنقص إنتاج العناصر الدموية السوية.

ولقد صنف الالبيضايات الحادة في مجموعتين كبيرتين هما : الالبيضايات الحادة بالأرومة اللمفاوية (ALL) Acute Lymphoblastic Leukemia، والالبيضايات الحادة بالأرومات النقوية (AML) Acute Myloplastic Leukemia

ثالثا: الأعراض السريرية

تشابه الالبيضايات الحادة من الناحية السريرية، حيث يتطور المرض بصورة تدريجية أو بشكل تحت حاد، وغالبا مايكون المرض قد وصل إلى حالة عاصفة لدى مراجعة المريض لطبيبه. وتتصف الحالة السريرية بالتعب والتزوف، وفقر الدم وارتفاع حرارة الجسم (38-38.5م)، والتهاب الفم والبلعوم والمفاصل والطرق التنفسية . ويترافق المرض بأعراض أقل مصادفة كالإسهال والأقياء، والآلام البطنية الحادة، والطفح الجلدي ، إضافة إلى تظاهرات عديدة مرتبطة بارتشاح الجهاز العصبي كالصداع، وشلل بعض الأعصاب القحفية. وتختلف شدة الأعراض باختلاف درجة ارتشاح النقي بالأرومات ، حيث تكون واضحة عندما تتراوح نسبة الأرومات في النقي بين 10 و40%.

يصادف المرض في مختلف الأعمار ، ولكن غالبا مايحدث النوع اللمفاوي في السن المبكرة (4-6 سنوات) في حين يغلب في سن الأربعين النمط النقوي. أما الالبيضايات

بالوحدات فيحدث في السن المتوسطة ،ولايشكل سوى 10% من الحالات، ويترافق بتقرحات الأغشية المخاطية للفم والجهاز الهضمي، والمهبل وضخامة اللثة، أما الالبيضاخ اللمفاوي فيتميز بضخامة العقد اللمفاوية.

رابعاً: اختبارات التشخيص التفريقي لالبيضاخات الدم الحادة

يعتمد في تشخيص وتمييز ابيضاخات الدم الحادة على عدة دراسات واختبارات من أهمها:

1. الدراسات الشكلية للخلايا: تعد الدراسة الشكلية لخلايا اللطاخة الدموية المحيطية واللطاخة النقية ذات أهمية بالغة في توجيه التشخيص ، فهي تفيد في تحديد نسبة الأرومات الالبيضاخية وصفاتها الشكلية المختلفة (حجم وشكل النواة والكروماتين والنويات وصفات الهيولى وتلوونها والحبيبات الموجودة فيها) . وبحسب هذه الدراسة يتم التمييز بين الأرومات اللمفاوية والأرومات النقية بالصفات المجهرية التالية:

الأرومة اللمفاوية	الأرومة النقية
الهيولى قليلة بلون أزرق غامق	الهيولى بلون أزرق ،اكثر غزارة
كروماتين النواة كثيف نسبيا	الكروماتين أقل كثافة
تحتوي النواة نوية أو نوويتين	تحتوي النواة 2-5 نويات
لا تحتوي الهيولى أجسام Aure	تحتوي الهيولى أجسام Aure
لا تحتوي الهيولى حبيبات	تحتوي الهيولى حبيبات لانوعية

2. الدراسات الكيميائية الخلوية: وتهدف لتأكيد التشخيص المقترح بالدراسة الشكلية . وهي ذات أهمية كبيرة في وضع التشخيص الصحيح للحالات التي يصعب فيها التمييز بين الأرومات اللمفاوية والأرومات النقية من خلال الصفات الشكلية. وتتضمن هذه الدراسة مجموعة من الاختبارات أهمها:

أ- اختبار أنزيم الميلوبيروكسيداز الذي يكون إيجابيا في الابيضاضات النقوية ، وسلبيا في الابيضاضات اللمفاوية.

ب- اختبار الشحوم الفسفورية بواسطة أسود السودان ، حيث يكون التفاعل إيجابيا في الابيضاض النقي الحاد (الأرومة النقوية والسليفة النقوية وخليفة النقوية والخلية على شكل نعل الفرس، إضافة إلى الحمضات والعدلات والوحيدات) وسلبيا في الابيضاض اللمفاوي الحاد (مختلف سلالة اللمفاويات) ، إضافة للنواءات و الصفيحات والكريات الحمر.

ت- اختبار الاستيراز : يظهر اختبار الاستيراز النوعية التي تعرف بالكلوراسيتات استيراز (NASDCA) تفاعلا إيجابيا في بعض الابيضاضات النقوية (النقوية، سليفة النقوية وخليفة النقوية، الخلايا على شكل نعل الفرس والعدلات المفصصة) وسلبيا في أرومة الوحيدة. أما الاستيراز غير النوعية المعروفة بالفا-نفتيل استيراز فتظهر تفاعلا إيجابيا في الوحيدات والناسجات وأرومة النواءات وأرومة الحمر وتفاعلا سلبيا في الوحيدات لدى حضانها في محلول فلوريد الصوديوم.

ث- اختبار ملون شيف الحمضي الدوري **Periodic Acid Schiff Stain (PAS)** : يعد تفاعل PAS من أهم الاختبارات

الكيميائية النسيجية للكشف عن الكربوهيدرات، حيث تدل إيجابية التفاعل على وجود الغليكوجين ودكستريانات الغلوكوز والبروتينات السكرية والبروتينات المخاطية. ويكون التفاعل شديد الإيجابية في العدلات (باستثناء الإشكال الأرومة) والنواءات (في الأمراض الخبيثة) ، إضافة للكريات الحمر في الابيضاض الإحمراري (M6). ، وتظهر الأرومات اللمفاوية في نحو 30-40% من الابيضاضات تفاعلا إيجابيا، فيما يكون التفاعل سلبيا في الأرومات النقوية وأرومة الوحيدة.

3. الدراسة المناعية: وتعتمد استخدام الأضداد وحيدة النسيلة كواسمات مناعية لسطح أغشية الخلايا الالبيضاوية، فهي تفيّد بشكل خاص في تصنيف الالبيضايات اللمفاوية إلى ابيضايات على حساب اللمفاويات T وأخرى على حساب اللمفاويات B (الجدول 1-5). فواسمات الخلايا B (CD10,CD19-CD22) تميز مختلف حالات الالبيضاى اللمفاوي الحاد و50٪ من مرضى الالبيضاى النقي المزمن. أما الواسمة CD21 فتتفاعل مع خلايا مرضى الالبيضاى اللمفاوي المزمن بالخلايا B ولمفومات الخلايا B وابيضايات الخلايا B، باستثناء الالبيضاى اللمفاوي الحاد والالبيضاى اللمفاوي المزمن بالخلايا T والالبيضاى النقي الحاد. وتستخدم واسمات سطح الغشاء أيضا في تمييز الخلايا المصورة وبعض خلايا نقي العظم وبعض الخلايا B الخبيثة، إضافة إلى أن بعض الواسمات الأخرى مثل CD11b,CD11c,CD13,CD14 تميز المحببات والوحيدات.

نمط الخلايا الأسم الشائع مستقبل

CD1a	T6, Leu 6	T
CD2	T11, Leu 5	T
CD3	T3, Leu 4	T
CD4	T4, Leu 3	T
CD5	T1, Leu 1	T
CD7	Leu 9	T
CD8	T8, Leu 2	T
CD10	CALLA	B
CD11b	Leu 15	M/G
CD11c	Leu M5	M/G precursors
CD13	MY 7	G/M (most G, some M)
CD14	MY 4, Leu M3	M, some G
CD19	B4, Leu 12	B
CD20	B1, Leu 16	B
CD21	B2	B
CD22	Leu 14	B
CD25	IL-2R1, IL-2R	T
CD33	MY 9	G
CD41	J15	Megakaryocytes and platelets
CD42b	AN51	Megakaryocytes and platelets
CD45	HLE, LCA, T200	Various cells
	la, HLA-DR	Various cells

الجدول 1-5: تمييز الخلايا الالبيضاوية بواسطة واسمات السطح

4. الاختبارات الكيميائية الحيوية: ومن أهمها معايرة أنزيم الليزوزيم في المصل والبول، إذ يشير ارتفاع تركيزه إلى ابيضاض نقوي حاد بالوحيدات. أما أنزيم الترمينيل دي أوكسي نوكليو تيديل ترانس فيراز (TDT) فيرتفع تركيزه في الالبيضايات اللمفاوية، وخاصة من النوع T والمجهولة، وينخفض في الالبيضايات النقية.
5. دراسة النمط الصبغي: تتضمن هذه الدراسة التعرف على بعض الشذوذات النوعية في صبغيات الخلايا الالبيضاوية، بما فيها تلك التي تتمثل بنقل المادة الصبغية من صبغي إلى آخر، وهو ما يعرف بالإنزفاء Translocation، حيث تعد هذه

الدراسة ذات أهمية بالغة في تشخيص مختلف أنماط الخباثات بما فيها ابيضاضات الدم. فالنمط الصبغي karyotype الشاذ سجل لدى نحو 50% من مرض ابيضاض الدم. ويبين الجدول (2-5) بعض الأمثلة عن إزفاء الصبغيات والتبدلات الجينية النوعية في بعض الخباثات الدموية.

المرض	الإزفاء
CML, ALL, AML	t(9,22)
AML(FAB M2)	t(8,21)
AML(FAB M3)	t(15,17)
ALL(FAB لمفوما بوركييت، M3)	t(8,14) t(8,22) t(2,8)
النقيوم المتعدد، CLL	t(11,14)
اللمفوما	t(14,18)
الايبيضاض باللمفاويات T	t(8,14) t(10,14)

الجدول 2-5: العلاقات بين بعض أشكال الإزفاء وبعض أنماط ابيضاضات


فعلى سبيل المثال سجل إزفاء بين الصبغي 8 والصبغي 21 لدى نحو 10% من مرض ابيضاض النقيوم الحاد (M2). ويلاحظ الإزفاء بين الصبغي 15 و17 في خلايا نقي العظم لدى نحو 40% من مرض ابيضاض النقيوم الحاد (M3). ولقد سجلت أنماط صبغية شاذة لدى نحو 50% من مرضى ابيضاض اللمفاوي منها t(9,22) في ابيضاض اللمفاوي الحاد و t(11,14) في ابيضاض اللمفاوي المزمن والنقيوم المتعدد و t(8,14) في ابيضاض بالخلايا T.

خامسا: التصنيف الفرنسي الأمريكي البريطاني (FAB) للابيضاضات الحادة
يعتمد التصنيف الفرنسي الأمريكي البريطاني الصفات الشكلية للخلايا في تصنيف
الابيضاضات الحادة اللمفاوية والنقوية .

1. تصنيف الابيضاضات اللمفاوية الحادة

تصنف الابيضاضات اللمفاوية الحادة في ثلاث مجموعات هي:

أ- L1 : يتصف هذا النمط من الابيضاض اللمفاوي الحاد بكون أكثر من 90%
من الأرومات اللمفاوية صغيرة الحجم (10-15 ميكرون)، وذات هيولى زرقاء
قليلة بشكل حلقة حول النواة التي تتميز بكونها كبيرة الحجم ومنتظمة الشكل
وذات كروماتين متجانس وتحتوي نويات قليلة الوضوح (الشكل 4-5).
ويصادف هذا النمط عادة لدى الأطفال بشكل خاص.



الشكل 4-5: ابيضاض لمفاوي حاد L1


ب- L2 : يتصف هذا النمط بكون الخلايا أكبر ومتفاوتة الحجم وذات نواة
بيضوية أو دائرية غير منتظمة، وتتضمن نويات واضحة. أما الهيولى فهي غزيرة

بلون أزرق، وقد تحتوي بعض الفجوات (الشكل 5-5). ويصادف هذا النمط لدى الكهول بشكل خاص.



الشكل 5-5: ابيضاض لمفاوي حاد L2 (لطاخة النقي)

ت- L3: يتميز هذا النمط بأرومات كبيرة الحجم (15-20 ميكرون) ذات نوى دائرية أو بيضوية محيطها منتظم ومركطة بشكل ناعم مع نويات واضحة. أما الهبول فهي زرقاء غامضة وتحتوي عدة فجوات (الشكل 6-5).



الشكل 5-6: ابيضاض للمفاوي حاد L3 (لطاخة النقي)

2. تصنيف الابيضاضات النقية (غير اللمفاوية) الحادة


صنفت الابيضاضات الحادة غير اللمفاوية في ست مجموعات (M1-M6)

- أ- الابيضاض النقوي الحاد (FAB M1): يحدث هذا النمط من الابيضاض في الأشهر الأولى من الحياة، ويظهر بحالته النمطية في متوسط العمر (46 سنة). وتكون نسبة الإصابة لدى الذكور والإناث متساوية، ويتراوح زمن البقاء على قيد الحياة بعد تشخيص المرض بين 1/2 - 3 أشهر.

يعاني المريض من الحمى والتعب وتظاهرات نزفية مع نمشات وفرفرية وتقرح الأغشية المخاطية، إضافة إلى آلام في العظام وبخاصة في القص والأضلاع. ويعاني المرضى أحياناً من ضخامة طحالية وضخامة كبدية، واعتلال في العقد اللمفاوية. ورافق المرض بكتل ورمية في العظام أو النسيج اللينة تتضمن أرومات نقوية. وتتميز هذه الأورام بارتفاع محتوى الميلويبروكسيداز التي تضيفي اللون الأخضر على النسيج المقطوعة، الأمر الذي دعا إلى تسمية هذا النمط من الأورام بالخضروم Chloroma.


أما الموجودات المخبرية فتتمثل بقلة الصفيحات وفقر دم في 85% من الحالات ، وارتفاع تعداد الكريات البيض لدى أكثر من ثلث المرضى ، حيث يصل عادة إلى نحو 100 ألف كرية/ملم³.

أما لطاخة الدم المحيطي وكذلك لطاخة النقي فتظهران سيادة الأرومات النقوية التي تنصف بنواة دائرية أو بيضوية وكروماتين ناعم ومبعثر وتتضمن عدة نويات (3-5). وتكون الهيولى غزيرة بلون أزرق وتتضمن حبيبات غير نوعية وأجسام أور (الشكل 7-5) ولا يلاحظ كريات أكثر نضجاً من الأرومة النقوية ولذلك يعرف هذا النمط بالايبيضاض النقوي الحاد غير المتميز.



الشكل 7-5 : الايبيضاض النقوي الحاد (FAB M1)

ب- الايبيضاض النقوي الحاد (FAB M2) : يحدث هذا النمط من الايبيضاض في متوسط العمر (48 سنة) و سن الكهولة ، حيث يسجل نحو 40% من الإصابات في سن الستين أو بعد ذلك. وتبلغ نسبة إصابة الذكور والإناث 1:6، أما زمن البقاء على قيد الحياة بعد تشخيص المرض فيبلغ 8/2-1 شهرا. تعد التظاهرات الترفية إثر الكدمات الخفيفة والرعاف ونزيف اللثة والنمشات من أعراض المرض المميزة، أما الضخامة الكبدية والطحالية واعتلال العقد اللمفاوية فهي نادرة.



الشكل 8-5: ابيضاض نقوي حاد M2 (لطاخة النقي)


وتتمثل الموجودات المخبرية بفقر الدم وقلة الصفيحات في معظم الحالات. وتكون كثرة البيض شائعة حيث يصل تعداد الكريات البيض لدى بعض المرضى إلى نحو 300 ألف /ملم³.

تشكل الأرومات النقية وسليفة النقية نحو 50% في لطاخة الدم (الشكل 8-5)، ويلاحظ نحو 10-20% من الكريات في مرحلة ما بعد السليفة. وتكون الهيولى أساسية تتضمن عدة حبيبات غير نوعية، أما جسيمات أور فهي كثيرة المصادفة وتكون غالبا مفردة.

ت- الالبيضاى النقوى الحاد بسليفة النقية (FAB M3): يحدث هذا النمط من الالبيضاى عادة فى عمر 38 سنة وتكون نسبة إصابة الذكور إلى الإناث 1:2، أما زمن البقاء على قيد الحياة بعد التشخيص فيبلغ نحو 16 شهرا.

تتمثل أعراض المرض بالتعب والتظاهرات الزفية والكدمات والنمشات، والبيلة الدموية، أما الضخامة الكبدية والطحالية واعتلال العقد اللمفاوية فهي نادرة.

أما الموجودات المخبرية فتتمثل بفقر دم وقلة صفيحات في معظم الحالات ،ويتراوح تعداد الكريات البيض بين كثرة البيض وقلة البيض الأكثر مصادفة . ويظهر فحص اللطاخة الدموية أن الخلايا النمط الخلوي السائد هو سليفة النقوية غير السوية (الشكل 5-9) ،والتي تتضمن أجسام أور على شكل حزمة الحطب. و يترافق المرض أيضا مع التخثر المنتشر ضمن الأوعية (DIC)




الشكل 5-9 : الالبيضاى النقوى الحاد سليفة النقوية (FAB M3)

ث- الالبيضاى النقوى الوحيد الحاد (FAB M4) : يعرف هذا لنمط من الالبيضاى بالالبيضاى بالوحيدات غمط نيجيلي Naegeli Typ. وتكون نسبة الإصابة بهذا المرض مرتفعة لدى الكهول فوق سن الخمسين ونادرة لدى الأطفال والشباب. ويبلغ معدل إصابة الذكور إلى الإناث 1:4 ، أما متوسط البقاء على قيد الحياة فيصل نحو 8 أشهر.

تكون أعراض المرض أقل شدة بالمقارنة مع أعراض الأنماط الأخرى. فالتعب والحمى والتظاهرات النزفية والتهاب البلعوم شائعة الحدوث، أما الضخامة الكبدية والطحالية

فتلاحظ لدى ثلث المرضى. ويعاني المرضى من كثرة البيض المفرطة وخطر ركود الكريات leucostasis ، وخاصة في الدماغ والرئتين ومايرافق ذلك من صداع مبرح وأذيات بصرية وقصور تنفسي.


أما الموجودات المخبرية فتتمثل بفقر دم وقلة صفيحات وتباين عدد الكريات البيض بين قلة البيض وكثرتها (100 ألف/ملم³)، ويقارب عدد الوحيدات في الدم المحيطي 5 آلاف/ملم³. أما لطاخة الدم المحيطي فتظهر سيادة النقويات المبكرة فيما تشكل الوحيدات مانسبته 20٪ من الكريات . وتتميز الأرومة بنواة مشرشرة ومنحخصة كما في الوحيدات، وتتضمن نحو 3-5 نويات، ويمكن أحيانا ملاحظة أجسام أور في الهبول (الشكل 10-5). ويلاحظ زيادة في نسبة السليفة النقوية، وتشاهد عدلات قليلة أو عديمة الحبيباتوقلة واضحة في عدد الصفيحات. ويمكن للمرض أن يترفق بالتخثر المنتشر ضمن الأوعية.



الشكل 10-5: الالبيضاض النقوي الحاد بالوحيدات (FAB M4)

ج- الالبيضاض الحاد بالوحيدات (FAB M5): الالبيضاض الحاد بالوحيدات مرض نادر لا تزيد نسبة عن 15٪ من مجمل الالبيضاضات. ويعرف بمحطان من الالبيضاض الحاد بالوحيدات : النمط M5A الأكثر شيوعا لدى الشباب (16 سنة)، والنمط M5B شائع الانتشار في متوسط العمر (49 سنة). وتبلغ نسبة إصابة الذكور إلى الإناث في النمط الأول 1:0.7 وفي النمط الثاني 1:1.8، أما فترة الحياة بعد تشخيص المرض فتتراوح بين 5 و8 أشهر.


يعاني المريض من التعب والصداع وانخفاض الوزن ونزيف من الفم أو الأنف. ويظهر الفحص السريري فرط تنسج لثوي كما هو الحال في الابيضاض بالوحيدات النقوية ، إضافة إلى شحوب وطفح جلدي ، أما الضخامة الكبدية والطحالية فهي نادرة . تتمثل الموجودات المخبرية بفقر دم وقلة صفيحات كما في الابيضاضات الأخرى. ويتراوح تعداد الكريات البيض بين 15 و 100 ألف/ملم³. أما فحص لطاخة الدم المحيطي فيظهر نسبة مرتفعة من الأشكال الأرومة ، فيما تشكل الوحيدات وسليفة الوحيدات ما نسبته 25-75٪ من محمل الكريات (الشكل 11-5).



الشكل 11-5: الابيضاض الحاد بالوحيدات (FAB M5)

ج- الابيضاض الإحمراري (FAB M6): يتميز هذا النمط من الابيضاض بتكاثر كل من المحييات والكريات الحمر . تحدث الإصابة عادة في سن 54 حيث يكون أكثر من نصف المرض فوق سن الخمسين. أما معدل نسبة إصابة الذكور - الإناث فيبلغ 1:4، وتحدث الوفاة عادة بعد 11 شهرا من تشخيص المرض.

يعاني المرضى من عوارض نزفية وضخامة طحالية وكبدية ، إلى جانب شيوع اعتلال العقد اللمفاوية. ويظهر فحص اللطاخة الدموية المحيطية والنقوية تواجد الأرومات الحمر والأرومات النقوية . وتتميز الأرومات الحمر بمحيط غير منتظم وبارتفاع نسبة حجم النواة إلى حجم الهيولى. (الشكل 12-5). وتظهر بعض الأرومات بقعا زرقاء اللون مميزة للأرومات الحمر. أما الأرومات النقوية فتحتوي أجسام أور، وتظهر اللطاخة وجود السليفة النقوية وسليفة الوحيدة وكذلك الوحيدة.



الشكل 12-5: الالبيضاى الأحرارى (FAB M6)

سادسا: ابيضاض الدم المزمن Chronic leukemia


ابيضاضات الدم المزمنة أمراض خبيثة بطيئة السير والتطور وتتصف بازدياد عدد الكريات البيض مع تمايز أكثر وضوحا نحو خلايا نقوية أو لمفاوية . ويعد الالبيضاى اللمفاوى المزمن والالبيضاى النقوى المزمن وابيضاض الوحيدات المزمن أكثر هذه الأمراض شيوعا.

1- الایبضاض اللمفاوي المزمن Chronic lymphocytic leukemia

الایبضاض اللمفاوي المزمن مرض نحيث مجهول السبب بطيء السير والتطور، ويعد أحد الأمراض التكاثرية اللمفاوية التي تتصف بتكاثر وتراكم خلايا لمفاوية ناضجة تغزو النقي والدم المحيطي ومختلف الأعضاء اللمفاوية. يندر هذا النمط من الایبضاض قبل سن العشرين وهو شائع بعد سن الخمسين. يصيب المرض الذكور والإناث ويتراوح زمن البقاء على قيد الحياة بين 4 و10 سنوات بعد تشخيص المرض .

تعد الإصابة بالأحماج المترافقة بنقص المناعة ، وخاصة نقص غاما غلوبولين الدم السبب الرئيس للوفاة . ويشاهد اعتلال مناعي ذاتي يؤدي إلى فقر دم انحلالي ذاتي لدى نحو ثلث المرضى .

يتصف نحو 90% من الایبضاض اللمفاوي المزمن بتكاثر مفرط للخلايا البائية ، ويمكن أن يحدث تكاثر نحيث لللمفاويات النائية. وتنشأ كافة المظاهر السريرية نتيجة ارتشاح النقي الطحال والكبد والعقد اللمفاوية وكذلك الدم المحيطي بهذه الخلايا غير الوظيفية (الشكل 13-5).



الشكل 13-5: الالتهاب الليمفاوي المزمن

أ- أطوار الالتهاب الليمفاوي المزمن

يمر المرض بخمسة أطوار، هي:

-الطور صفر: يتصف هذا الطور بكثرة الليمفاويات في النقي (30-40 %) والدم المحيطي (10 آلاف/ملم³) مع غياب الأعراض السريرية. ويعيش المرضى عادة نحو 150 شهرا.

-الطور 1: يتصف هذا الطور بكثرة الليمفاويات مع ضخامة العقد الليمفاوية في أكثر من مكان ، ويكون زمن البقاء على قيد الحياة نحو 101 شهرا.

-الطور 2: يتصف هذا الطور بكثرة الليمفاويات مع ضخامة طحالية أو كبدية أو كلاهما ، ويعيش المرضى عادة نحو 71 شهرا.

-الطور 3: يتميز هذا الطور بكثرة الليمفاويات مع فقر دم (الخضاب أقل من 10 غ/100مل) ويبلغ متوسط البقاء على قيد الحياة 19 شهرا.


-الطور 4: تتميز هذه المرحلة بكثرة الليمفاويات مع قلة الصفيحات (أقل من 100 ألف/ملم³) ويعيش المرضى عادة نحو 19 شهرا.

ب- الأعراض والتظاهرات السريرية

قد يكون المرض صامتا يسير بشكل خفي دون أعراض واضحة لدى نحو 25 % من المرضى ويكتشف عادة بالصدفة أثناء تعداد الكريات البيض. تتمثل أعراض المرض الشائعة بالفتور والترفع الحروري والتعرق الليلي، إضافة إلى التعب وانخفاض الوزن. أما التظاهرات السريرية فتتمثل بضخامة العقد اللمفاوية السطحية والعميقة، والضخامة الطحالية (50% من الحالات) والكبدية (10% من الحالات) والحكة الناجمة عن ارتشاح الجلد بالخلايا الالبيضاوية.

ت- الموجودات المخبرية


- يرتفع تعداد الكريات البيض (30-200 ألف/ملم³) غير أن كثرة البيض تكون أقل مما هي عليه في الالبيضاخ النقوي المزمن.
- يظهر فحص اللطاخة الدموية زيادة مطلقة في اللمفاويات الناضجة، حيث تشكل اللمفاويات الصغيرة ما نسبته 80-90 % من الكريات البيض. ويمكن أن تظهر بعض الأرومات اللمفاوية الكبيرة وكذلك Smudg cells (الشكل 14-5). ويشاهد نقص في صباغ الكريات الحمر وانخفاض الصفيحات مع تقدم المرض.



الشكل 14-5: الالبيضاخ اللمفاوي المزمن

- تظهر لطاخة النقي ارتشاحا بخلايا لمفاوية ناضجة (الشكل 15-5) ويكون الارتشاح باللمفاويات الصغيرة ذا إنذار أفضل من الارتشاح باللمفاويات

الكبيرة. أما النوات وسلاسل الكريات الحمر والمحببة، فتكون عادة طبيعية في بداية المرض ثم تبدأ بالتناقص مع تقدم المرض.



الشكل 15-5: ابيضاض لمفاوي مزمن (لطافة النقي)


- يظهر الرحلان الكهربائي للمصل انخفاض غاما غلوبولين الدم . ويكون اختبار كومب إيجابي لدى حدوث فقر دم انحلاي منيع للذات.

2- ابيضاض الدم بالخلايا الشعرية


بعد الابيضاض بالخلايا الشعرية أحد أنواع الابيضاض اللمفاوي المزمن ، يتصف بازدياد اللمفاويات التي تتميز بوجود استطالات شعرية على محيطها ونويات كبيرة واضحة. تبدي الخلايا الشعرية ، وهي من نوع الخلايا التائية تفاعلا إيجابيا شديدا للفوسفاتاز الحامضية، ويمكن تمييزها بالواسمات المناعية -CD19-CD20-CD22-CD24-CD25.

حدث المرض في متوسط العمر ، وهو أكثر مصادفة لدى الذكور منه لدى الإناث. وتتمثل أعراض المرض بضعف عام، ونقص الوزن، والإصابات الخمجية، إلى جانب

الضخامة الطحالية والضخامة الكبدية في 50٪ من الحالات ، فيما تكون ضخامة العقد اللمفاوية نادرة. ويظهر فحص لطاخة الدم المحيطي خلايا لمفاوية شعرية (الشكل 5-116، الشكل 5-17)، وفقر دم كيري، ونقص في العدلات والوحيدات.



الشكل 5-16: ابيضاض بالخلايا الشعرية



الشكل 5-17: ابيضاض بالخلايا الشعرية (ملون أزرق التولودين)

3- ابيضاض المزمن بالوحيدات Chronic monocytic leukemia

يعد الابيضاض الوحيدي المزمن الأقل شيوعا بين الابيضاضات المزمنة ، حيث يشكل ما نسبته 10-15٪ من مجمل هذه الابيضاضات. يكون المرض نادرا لدى الشباب ويحدث عادة بعد منتصف العمر. ويتراوح زمن البقاء على قيد الحياة بين 6 شهور وخمس سنوات بعد تشخيص المرض. تكون أعراض المرض متدرجة ومخادعة ، ويتم اكتشاف معظم الحالات لدى استقصاء فقر الدم. وتتمثل الأعراض السريرية عادة بتضخم العقد اللمفاوية وتضخم الطحال. يظهر العديد من المرضى قلة الكريات البيض. ويتراوح عدد الكريات البيض بين 3 و 70 ألف /ملم³. وتظهر لطاخة الدم المحيطي وحيدات شاذة كبيرة الحجم ذات نواة بيضوية منتظمة أو غير منتظمة وتتضمن أجساما هيولية كاذبة. ويمكن ملاحظة انخفاض عدد الصفيحات.

4. لا ابيضاض النقوي المزمن Chronic Myelogenous Leukemia

الايبيضاض النقوي المزمن مرض خبيث مجهول السبب ، ويعد أحد الأمراض التكاثرية النقوية والتي تضم إلى جانب الابيضاض النقوي المزمن كلا من كثرة الحمر الحقيقية، وتليف النقي الغامض ، وكثرة الصفيحات الأساسية. يتضمن الابيضاض النقوي المزمن خمسة أنماط، هي:


- الابيضاض النقوي المزمن _ النمط الشائع CML - common type
- الابيضاض النقوي المزمن _ النمط الشبابي Juvenile CML
- الابيضاض المزمن بالعدلات Chronic neutropilic Leukemia
- الابيضاض المزمن بالوحيدات النقوية Chronic myelomonocytic Leukemia
- الابيضاض النقوي المزمن اللاعظمي Atypical CML

يشكل الابيضاض النقوي المزمن مانسبته 20-25% من ابيضاضات الدم ويعود 95% من الإصابات إلى النمط الشائع فيما لا تتجاوز نسبة الأنماط الأخرى 5% . تحدث الإصابة بالنمط الشائع في سن 30-50 سنة وتكون نسبة الإصابة لدى الذكور أعلى منها لدى الإناث.

أ- الأمراض

يعد الابيضاض النقوي المزمن من الأمراض التكاثرية النقوية التي تتصف عموماً بتكاثر مرضي لكل من سلسلة الخلايا الحمر والنقيويات والوحيدات إضافة لأم النواءات. ويتصف نحو 90% من مرضى الابيضاض النقوي المزمن بوجود صبغي فيلادلفيا في سلالات الخلايا النقوية والحمر والنواءات . ويعد صبغي فيلادلفيا عيباً في الصبغي 22 بنتيجة الإزفاء بين الصبغي 22 والصبغي 9(22:9) T في نحو 92% من الحالات (الشكل 18-5).

ولا يعد الأزفاء (9:22) صفة نوعية للابيضاض النقوي المزمن، فهو يتواجد لدى نحو 3-5% من الأطفال والكهول المصابين بالايبيضاض النقوي الحاد (FBM1) ولدى 5% من الأطفال ونحو 10-25% من الكهول المصابين بالايبيضاض اللمفاوي الحاد من النمط L1 و L2.



الشكل 18-5: صبغي فيلادلفيا في الالبيضاخ النقوي المزمن ، يتمثل الإزفاء T(9:22) بنقل جزء من الذراع الطويلة للصبغي 22 إلى الذراع الطويلة في الصبغي 9 وانتقال طليعة المورثة الورمية c-abl من نهاية الصبغي 9 واندماجها في نهاية الصبغي 22.

ب- التظاهرات السريرية والأعراض

يمكن توصيف الحالة السريرية للالبيضاخ النقوي المزمن في ثلاثة أطوار متتالية ، هي الطور المزمن chronic ، والطور العابر (المتسارع) accelerated ، و طور النوبة الأرومية blast crisis.


يمتد الطور المزمن نحو 2-5 سنوات ، ويتجلى بعدد من الأعراض التي تتضمن التعب المتزايد والفتور ، والحمى والقهم ، مع انخفاض في الوزن وألم عظمي وتعرق ليلي. ويظهر الفحص السريري عادة ضخامة طحالية ، ويكون احتشاء الطحال شائعاً بسبب احتشاء الكريات البيض في الطحال إلى جانب الدم ونقي العظم ، ويسبب احتشاء الطحال ألم ناحي.

وتكون الأورام خارج النقوية (باستثناء الطحال والكبد) غير شائعة في هذا الطور.
وتتصف الأورام خارج النقوية باللون الأخضر بسبب وجود انزيم الميلوبيروكسيداز
النقوي، وتعرف بالورم الأخضر أو الخضروم chloromas .
أما الطور العابر المتسارع فيمتد نحو 6-18 شهرا ويتصف بازدياد حجم الطحال،
وازدیاد تعداد الكريات البيض في الدم المحيطي، وزيادة مفاجئة في عدد الأسس، إلى
جانب فقر دم غامض وقلة الصفيحات.

ويتحول المرض لدى ثلاثة أرباع المرضى إلى طور النوبة الأرومية. ويمتد هذا الطور
نحو 3-4 أشهر ويتصف بظهور الخلايا الأرومية البدائية إلى جانب كافة التظاهرات
السريرية والدموية المميزة للابيضاض الحاد. وفي المراحل المتأخرة من المرض يظهر
الزيف الحاد المرتبط بانخفاض عدد الصفيحات واعتلال وظائفها إلى جانب انخفاض
البنا ترمبوغلوبولين beta thromboglobulin داخل الصفيحات والعامل
الصفيحي الرابع (PF4).


ت- الموجودات المخبرية

- كثرة الكريات البيض حيث يتراوح عدد الكريات البيض بين 50 و 300 ألف/ملم³.
- فقر دم معتدل الشدة حيث ينخفض الحضاب إلى نحو 8-9 غ/100 مل أو أقل.
- يزداد عدد الصفيحات لدى نحو 40% من المرضى، ويكون انخفاض الصفيحات أمرا نادرا
- يظهر فحص لطاخة الدم المحيطي ارتفاع نسبة الحبيبات الناضجة وظهور الحبيبات بمختلف مراحل تطورها (الشكل 19-5 ، الشكل 20-5)، حيث تبلغ نسبة



الشكل 19-5: الالبيضاخ النقي المزمن

الأرومة النقية 5٪ وسليفة النقية 10٪ والنقية 15٪ والنقية المتأخرة 20٪، ويمكن أن ترتفع نسبة الحمضات والأسسبات وتشاهد الكريات الحمر المنسوات وتظهر الكريات الحمر تفاوتاً في الشكل والتنقيط القاعدي. ولدى دخول المرض في طور النوبة الأرومية تشابه الصورة الدموية مع الالبيضاخ النقي الحاد وبخاصة المرحلة FABM2.



الشكل 20-5 : الإبيضاض النقوي المزمن، معظم الكريات البيض ناضجة (شكل نعل الفرس وعدلات مفصصة)
ويلاحظ ازدياد عدد الصفائح

- يظهر فحص لطاخة النقي فرط خلوية مع سيادة فرط تنسج الحبيبات، وارتفاع نسبة النقويات في المراحل المتوسطة وترتفع نسبة نقيائي/حمراني إلى نحو 1:25، ويمكن للنقي أن يصبح متليفا في المراحل المتأخرة من المرض.

يعتمد العلاج التقليدي للإبيضاض المزمن على استخدام الأدوية السامة للخلايا، وهي الهيدروكسي يوريا hydroxyurea أو البوسولفان busulfan و الانتريفرون ألفا Interferon alpha إضافة إلى التشعيع. وبعد غرس النقي من متبرع متماثل ال HLA العلاج الشافي الوحيد للمرضى دون سن الأربعين.

الفصل الرابع

أمراض الخلايا المصورية

أولاً: النقيوم المتعدد Multiple myeloma


النقيوم المتعدد (الورم النقوي المتعدد) بنقيوم الخلايا المصورية plasma cell myeloma أو داء كهلر Kahler,s disease، وهو مرض نخبيث مجهول السبب يتصف بتكاثر نخبيث للخلايا المصورية بيتا، التي تحتاح النقي أو المناطق الأخرى من الجسم بما في ذلك الدم المحيطي (ابيضاض الدم بالخلايا المصورية). وتقوم الخلايا المصورية الخبيثة بإفراز غلوبولينات مناعية وحيدة النسيلة شاذة إلى جانب بعض العوامل الهرمونية التي يأتي على رأسها العامل المنشط لناقضات (كاسرات) العظم. وينجم عن فرط إفراز الغلوبولينات المناعية الشاذة فرط في لزوجة الدم وتناقص في الغلوبولينات السوية، وحدوث بيلة بروتينية خاصة تتكون من السلاسل الخفيفة للغلوبولينات الشاذة وتعرف ببيلة بنس-جونز Pence Jones. وينجم عن احتياح النقي بالخلايا المرضية تناقص في الكريات البيض والحمر والصفائح وإعاقة وظائفها.

1-الأعراض والتظاهرات السريرية

يشكل النقيوم المتعدد مانسبته 1٪ من كافة الأمراض الخبيثة، ونحو 10٪ من مجموع الأمراض الدموية الخبيثة. يحدث المرض ما بين سن الأربعين والسبعين، وتبلغ نسبة الإصابة لدى الذكور 61٪، ويتوفى المرضى عادة بعد 1-3 سنوات من تشخيص المرض، ويكون سبب الوفاة في معظم الحالات الإصابات الخمجية والقصور الكلوي. أما أعراض المرض التي تختلف حسب درجة انتشار المرض ومضاعفاته فيمكن توصيفها بالتظاهرات السريرية التالية:

- آلام عظمية لدى نحو ثلثي المرضى بسبب وجود مناطق انحلالية في عدد من العظام تؤهب لكسور عفوية (الشكل 21-5) وارتفاع تركيز كالسيوم الدم،

ويؤدي تدهم الفقرات إلى انضغاط النخاع الشوكي، ويترافق ذلك بشلل نصفي، أما شلل الأعصاب القحفية فيحصل نتيجة الارتشاح بالخلايا الورمية.



الشكل 21-5: صور شعاعية تظهر الآفات الانحلالية لدى مريض النقيوم المتعدد

- قصور كلوي مزمن: يحدث القصور الكلوي بسبب ترسب بروتينات بنس - جونز في النبيات الكلوية وتلفها ، إضافة إلى تأذي الكلية بسبب ارتفاع تركيز البولة الدموية وتركيز الكالسيوم إلى جانب الدور الهام للأحماض الكلوية في إحداث القصور الكلوي.
- فقر الدم والزوف والإنتانات: يوهب قصور النقي المرتشح بالخلايا الخبيثة لفقر دم يتحلى بشحوب المريض . أما التظاهرات الترفية فتكون على علاقة بقللة الصفائح وخلل عوامل التخثر المسبب بالأضداد وحيدة النسيلة الشاذة، و تظهر على شكل فرغريات في الجلد والأغشية المخاطية، ونزوف هضمية أو بولية، يكون أخطرها نزف الجهاز العصبي. أما الأحماض التي تصيب بالدرجة الأولى القصبات والرئة، فتكون على علاقة بنقص الغلوبولينات المناعية السوية ، وقلة الكريات البيض الخبيثة .
- ركودة الجريان الدموي بسبب ارتفاع اللزوجة المسبب بالغلوبولينات المناعية، وخاصة النمط M . وتتسبب اللزوجة المرتفعة في استرخاء القلب نتيجة

مضاعفة الجهد المطبق على العضلة القلبية ، وقد يحدث فقدان البصر نتيجة ركودة الجريان في الأوعية الدقيقة و انسدادها .


- يترافق المرض بأعراض هضمية، كالغثيان والاقياء والإمساك إلى جانب آلام بطنية والوسن والإغماء أحيانا ، نتيجة فرط تركيز الكالسيوم .

2-الموجودات المخبرية

يعتمد في تشخيص المرض عامة على اثنين من التغيرات الثلاثة الرئيسية المتمثلة بارتفاع النقي بخلايا مصورية غير طبيعية ، ووجود بروتينات شاذة في المصل أو البول ، إضافة إلى التغيرات الشعاعية على شكل مناطق عظمية منحلة في العظام المسطحة خاصة . ويلعب تحديد مستوى البولة في الدم ، وكذلك مستوى الهيموغلوبين الدور الأهم في تقدير مرحلة المرض ومستوى الإنذار . ويكون الإنذار جيدا عندما يكون مستوى البولة أقل من 40 مع 100 مل ومستوى الهيموغلوبين أعلى من 10 غ/100 مل، أما إذا تجاوز مستوى البولة 80 مع 100 مل ، و انخفض مستوى الهيموغلوبين عن 7.5 غ/100 مل فيكون الإنذار سيئا .

ويمكن إجمال نتائج الاختبارات التشخيصية بالموجودات المخبرية التالية:


- ارتفاع كبير في سرعة التثفل يصل حدود 100 أو أكثر في الساعة الأولى .
- ارتفاع تركيز البروتينات الكلية إلى حدود 100 غ/ أو أكثر .
- يظهر الرحلان الكهربائي ذروة حادة من البروتينات تتوضع في المنطقة غاما (الشكل 21-5) أما معايرة الغلوبولينات المناعية (الرحلان الكهربائي المناعي) ، فتظهر ارتفاعا ملحوظا في نمط الغلوبولين المصاب ونوع السلسلة الخفيفة التي تدخل في تركيبه (λ , κ) ، والذي يكون لدى معظم المرضى من النمط IgG ، ونسبة أقل من النمط IgA ، فيما تكون نسبة النمط IgD نادرة .




الشكل 5-21: الرحلان الكهربائي لبروتينات مصل الشخص السوي A والشخص المصاب بالنقيوم المتعدد B والمصاب بداء ولفستروم C.

- يظهر فحص البول بيلة هروثينية مؤلفة من السلاسل الخفيفة للغلوبولينات المناعية.

- يظهر فحص اللطاخة الدموية كريات حمراء سوية الحجم سوية الصباغ، والتي تكون متراصة على شكل النضائد (الشكل 5-23) وفي حالات نادرة تشاهد الخلايا المصورة في لطاخة الدم المحيطي (الشكل 5-24).




الشكل 5-23: تراص الكريات على شكل نضائد




الشكل 24 - 5: لطاخة دم محيطي في النقيوم المتعدد نمط IgA

- يتم تأكيد التشخيص بفحص لطاخة النقي التي تظهر ارتشاحاً بخلايا مصورية مرضية بنسب متفاوتة. وتبدو الخلايا المصورة بحجوم مختلفة وهيولى وافرة بلون أزرق غامق. تكون النواة محيطية ذات كروماتين ناعم غير متكتل، وتتضمن عدة نويات (الشكل 25-5 ، الشكل 26-5)




الشكل 25-5: ارتشاح النقي بالخلايا المصورة في النقيوم المتعدد



الشكل 26-5: ارتشاح النقي بالخلايا المصورة في النقيوم المتعدد

وفي حالة النقيوم من النمط IgA تكون أطراف هبولى الخلية حمراء وغير محددة وتعرف الخلية المصورة بالخلية اللهبية (الشكل 27-5)




الشكل 27-5: الخلايا اللهبية

ثانياً: فرط الغلوبولينات الكبري البدني Primary Macroglobulinemia

يعرف فرط الغلوبولينات الكبري البدني بداء ولدنستروم Waldenstrom,s disease. وهو أحد الأمراض التكاثرية المصورة -اللمفية، والتي تتصف بارتفاع تركيز الغلوبولينات الكبرية من النمط IgM، ذات الوزن الجزيئي المرتفع (أكثر من 900000).

يحدث المرض لدى الكهول قرابة سن الستين عادة، وتكون نسبة إصابة الذكور أعلى من الإناث، ويبلغ متوسط البقاء على قيد الحياة نحو 3 سنوات بعد تشخيص المرض. تتضمن أعراض المرض الوهن والتعب والتزرف مع غياب الآلام العظمية عادة والتغيرات العظمية المشاهدة في النقيوم المتعدد. يشكو المريض من ضخامة عقد لمفاوية إلى جانب الكبد والطحال كما يعاني من التزوف المتكررة، وخاصة من اللثة والأنف، إلى جانب فقر دم قد يكون انحلالي. وقد يعاني ثلث المرضى من اضطرابات عصبية، وقد يحدث قصور قلب نتيجة فرط اللزوجة الدموية مع تغيرات في الشبكية وضعف الرؤية. ويظهر فحص النقي والغدد اللمفاوية ارتشاحا بخلايا مصورية ولمفية (الشكل 28-5)



الشكل 28-5 ارتشاح النقي بخلايا مصورية ولمفية في داء ولدنستروم

أما فحص الدم الذي يتصف بلزوجة مرتفعة فيبين كريات حمراء متراصة على شكل نضائد مع تفاعل كومب إيجابي وانخفاض في تركيز الهيموغلوبين، وارتفاع في تركيز البليروبين بينما يكون تعداد الكريات البيض طبيعياً مع زيادة مطلقة في نسبة اللمفاويات. أما تعداد الصفائح فيبقى ضمن الحدود السوية مع ميل نزفي على علاقة باضطراب تلازن الصفائح، وتطول زمن البروترومين وانخفاض تركيز العامل الثامن.

ويظهر الرحلان الكهربائي للمصل ارتفاع تركيز الغلوبولينات المناعية من النمط IgM (19S) (الشكل 21-5). ويمكن إظهار الغلوبولينات القوية cryoglobulins في مصل المرضى والتي تكون في معظم الحالات من النمط IgM أو IgG.



الباب السادس

الجهاز اللمفي والأورام اللمفاوية


الفصل الأول

الجهاز اللمفاوي

أولاً: معطيات تشريحية

يشكل الجهاز اللمفي جملة تصريفية إضافية، يتم من خلالها نزوح السائل الخلالي إلى الأوعية الدموية. فبينما يتم إعادة امتصاص معظم السائل الراشح من الشعيرات الشريانية من قبل الشعيرات الوريدية، يدخل نحو عشر هذا السائل الشعيرات اللمفية ويعود إلى الدم عبر الجهاز اللمفي بدلا من الجهاز الوريدي. فجميع الأنسجة في الجسم باستثناء القليل منها (مثل الطبقات السطحية من الجلد والجملة العصبية المركزية) تمتلك شبكة دقيقة من الشعيرات اللمفية ذات النهاية المغلقة. وتتألف جدران الشعيرات اللمفية من طبقة ظهارية وحيدة مرتبطة بخلايا النسيج الضامة بواسطة خيوط إرساء (الشكل 1-6). وتسمح الثقوب، بين الخلايا البطانية، بعبور السائل الخلالي إلى داخل الشعيرات اللمفية مع البروتينات والمركبات الأخرى ذات الوزن الجزيئي الكبير والتي لا يمكن إعادة امتصاصها، إلى الشعيرات الوريدية. ويعيق انغلاق الثقوب بواسطة الدسامات الدقيقة التي تشكلها الحواف الحرة للخلايا البطانية المترابكة الحركة العاكسة للسائل. ويتحرك اللمف باتجاه واحد ليصب في الأوعية اللمفية الجامعة التي تصب بدورها في الأوعية اللمفية المحيطية، لتنتهي في الأوعية اللمفية الرئيسية المتمثلة في القناة اللمفية الصدرية، والقناة اللمفية اليمنى. وتقوم القناة اللمفية الصدرية بجمع اللمف من القسم السفلي للجسم، ولاسيما الساقين والقسم الأسفل من الصدر والرأس والذراع اليسرى، فيما يصب في القناة اليمنى لمف الجانب الأيمن من الرأس والرقبة والصدر إضافة للذراع اليمنى (الشكل 2-6). وبينما تصب القناة الصدرية في الجهاز الوريدي عند

موصل الوريد الوداجي الباطن الأيسر مع الوريد تحت الترقوة ، تصب قناة اللمف اليميني في الجهاز الوريدي عند موصل الوريد تحت الترقوة الأيمن مع الوريد الوداجي الباطن.



الشكل 1-6: بنية الشعيرات اللمفية (أ) والوعاء اللمفي الجامع (ب)

ويساعد في حركة اللمف باتجاه واحد، إلى جانب النهاية المغلقة للشعيرات اللمفية ، وجود الدسامات في جدران الأوعية اللمفية. ويساعد في حركة اللمف تقلص العضلات (غالباً ماتعرف العضلات بالقلوب اللمفية) ، إضافة إلى تقلص العضلات الملساء في جدران الأوعية اللمفية الكبيرة التي تعمل كمضخة لمفية تلقائية.

ثانياً: اللمف

يشكل اللمف ذلك الجزء من السوائل الخلالية الذي يتم تصريفه إلى الأوعية الدموية عن طريق الأوعية اللمفية. واللمف سائل شفاف لزج يمتلك تفاعلاً قلوياً،

ويكون محتواه من الكهارل مشابهاً لمحتوى السوائل الخلالية من حيث الكم والنوع. أما محتوي اللمف من المواد العضوية وبخاصة البروتينات والشحوم فيختلف وفقاً لخصوصية العمليات الاستقلابية للأعضاء التي يصدر منها ودرجة نشاطها.



الشكل 2-6: الجهاز اللمفي

فاللمف الذي يجمع من الأمعاء عن طريق الأوعية اللمفية المعوية يكون غنياً بالمواد الدسمة، في حين يكون اللمف الذي يجمع من الكبد غنياً بالبروتينات. ويحتوي اللمف على العديد من الأنزيمات ذات المصادر النسيجي أو المصوري، إضافة إلى مولد الليفين وجميع عوامل تخثر الدم، التي تسمح بتشكيل جلطات صفراء رخوة. ويتميز اللمف بوجود كثيف للكريات البيض اللمفاوية، التي يعود مصدرها إلى النسيج والتشكلات اللمفاوية التي تقع في مسارات الأوعية اللمفية (الشكل 2-6).

ثالثاً: النسيج اللمفاوية

تصنف النسيج اللمفاوية في مجموعتين: مركزية أو أولية ينتمي إليها التشكلات اللمفاوية في كل من نقي العظم وال тимوس (الغدة الصعترية)، ومحيطة أو ثانوية تتضمن العقد اللمفاوية والطحال ولوحات peyer في المعى الدقيق .
وتحمل النسيج اللمفاوية حبكة النسيج الضام الشبكي (الشكل 3-6)، الذي يضم في عيون شبكته عدة أنماط خلوية حرة الحركة، مثل البلاعم والخلايا اللمفاوية البائية والتائية إلى جانب الخلايا المصورة والخلايا الدهنية.



الشكل 3-6: النسيج الضام الشبكي

ويمكن للنسيج اللمفاوي أن يكون مبعثراً في الأعضاء أو يأخذ شكل جزر مختلفة الحجم ، كما هو في نقي العظم ولوحات peyer في مخاطية الأمعاء واللوزات والغدة الصعترية، أو يتوضع على شكل أعضاء متميزة مستقلة كما في العقد اللمفاوية والطحال.

1- العقيدات البلغمية

تعرف العقيدات البلغمية بالجر بيئات البلغمية أو الجر بيئات المغلقة ، وهي عقيدات صغيرة مستديرة الشكل تتواجد معزولة مفردة أو مجتمعة، يتراوح قطرها بين 1-2 ملم . تحاط المنطقة المحيطة للعقيدات بمحفظة قليلة الثخن والكثافة مدعمة بألياف شبكية،

يتناقص عددها تدريجياً من المحيط إلى الوسط بحيث تصبح نادرة في المركز المنتش (المولد) . ويحيط بالعقيدات جيب بلغمي صغير يكون على صلة بالأوعية اللمفية الصادرة . ولا تشاهد في العقيدات أوعية لمفية وادرة وترويتها شبكة وعائية صغيرة يتضمن المركز المنتش خلايا شبكية وأرومات لمفاوية ويحيط بالمركز خلايا لمفاوية وسليفاها . وتنتقل الخلايا اللمفاوية إلى الشبكة اللمفية وتترك عيون المحفظة الرقيقة لتصل إلى النسيج الضامة المجاورة . وتشاهد هذه التشكلات اللمفاوية في مختلف أنحاء الجسم ، وخاصة في مخاطية المعى ، وتعرف باسم لوحات باير *peyer* .

2- العقد اللمفاوية

العقد اللمفاوية أعضاء صغيرة يتراوح عددها بين 500 و 1000 عقدة تتوضع في مسار الأوعية اللمفاوية ، وتأخذ أشكالاً كروية أو بيضوية وحجوم مختلفة تتراوح بين بضعة مليمترات وأكثر من سنتيمتر . وتتوضع هذه العقد في مناطق محددة من الجسم أكثرها شهرة العقد الرقمية والأبطية والبطنية والأربية .

ويبين الشكل (4-6) البنية العامة للعقدة اللمفية ، حيث تحاط العقدة بمحفظة ضامة ، تنقطع في مستوى السرة وترسل نحو الداخل حجبا دعامية . ويلاحظ شبكة واسعة من الألياف الشبكية التي ترتبط بالمحفظة وامتداداتها ، وتخترق الجيب الهامشي الواقع تحت المحفظة فتقسمه إلى حجرات متعددة . وتتضمن العقدة على منطقة قشرية وأخرى لبية . تتصف المنطقة القشرية بوجود العقيدات (الجريبات) اللمفية ، التي تشبه العقيدات اللمفية إلى حد كبير . فهي تشكلات دائرية تتضمن مركزاً مولداً وهالة محيطية تشتمل على الخلايا اللمفية وطلائعها إلى جانب الخلايا البلعمية . وتتداخل الهالات المحيطية للعقيدات ، وتمتد نحو مركز العقدة لتشكل الحبال اللبية . أما بقية اللب الذي يتوضع مركزه قرب السرة ، فيكون أقل كثافة من القشر حيث النسيج الشبكي أكثر وضوحاً ، والخلايا اللمفية قليلة العدد .

لمفاويات
 لمفاوية ثانية
 لمفاوية بائية
 خلية بلعمية
 رجاء لمفي وارد
 مركز منش
 تريبيق أو حاجز
 الياف شبكية
 محفظة
 شريان
 وريد
 دسام
 رجاء لمفي صادر

الشكل 4-6: بنية العقدة اللففية


التي يمكن أن تهاجم أي جسم غريب وتفككه بعملية البلعمة. ويغادر اللمف العقد اللمفاوية عبر الأوعية اللمفية الصادرة المزودة أيضا بدسامات في منطقة السرة. وتلعب العقد اللمفاوية دورا هاما في إمداد اللمف ومن ثم الجسم بالخلايا اللمفاوية من خلال تكاثرها في المركز المولد، وتعوض بذلك الخلايا اللمفية التالفة. كما تعمل أيضا العقد اللمفاوية على تخليص اللمف من المواد والأجسام الغريبة والخلايا السرطانية التي يحملها أثناء مروره بالقرب من الخلايا الشبكية، ويتعزز هذا الدور الدفاعي بإنتاج الأضداد.

رابعاً: تشكل اللمف

يرتبط تشكل اللمف بحركة السوائل بين الشعريات الدموية و الفضوات الخلالية، التي تتم وفق آليتين اثنتين، هما الارتشاح وعودة الامتصاص. وتتمثل عملية الارتشاح بحركة السوائل النهائية إلى خارج الشعريات عند النهاية الشريانية، بينما تتمثل عملية عودة الامتصاص بحركة السوائل نحو الشعريات الدموية عند النهاية الوريدية. وتتعلق عمليات الارتشاح وعودة الامتصاص بعدد من العوامل التي تعرف بقوى ستارلينغ وهي:

- 1- الضغط الهيدروستاتيكي للشعريات : وهو يسبب حركة السوائل إلى خارج الشعريات.
- 2- الضغط الجرمي (الغرواني) للمصورة الدموية: ويسبب حركة السوائل إلى داخل الشعريات.
- 3- الضغط الجرمي للسائل الخلالي: ويعمل على تناضح السوائل إلى خارج الشعريات.
- 4- الضغط الهيدروستاتيكي للسائل الخلالي: وهو يؤمن دفع السوائل إلى داخل الشعريات عندما يكون إيجابيا ونحو الخارج عندما يكون سلبيا.

ويظهر تحليل دور مختلف قوى ستارلينغ، حدوث عدم توازن ضئيل بين عمليات الارتشاح وعودة الامتصاص. فمحصلة القوى التي تدفع السوائل إلى خارج النهاية الشريانية التي تعرف بضغط الارتشاح الصافي، تعادل ضعف محصلة القوى المحركة للسوائل إلى داخل النهاية الوريدية، والتي تعرف بضغط عودة الامتصاص. وبالرغم من ذلك يعمل ضغط عودة الامتصاص على امتصاص ما نسبته 90% من السوائل المرشحة في النهاية الشريانية، وهو الأمر المرتبط بكون الشعريات الوريدية أكثر عدداً ونفوذية من الشعريات الشريانية. أما فائض السوائل المرشحة فيتم تصريفها وإعادة مجدها إلى الدم عن طريق الأوعية اللمفية (الشكل 5-6). وعلى هذا النحو يتم ارتشاح نحو 20 لتراً من السوائل باتجاه الأفضية الخلالية من كافة شعريات الجسم، وبمعدل 14 مل/د، وفي الوقت نفسه يعاد امتصاص نحو 18 لتراً في اليوم وبمعدل 12.5 مل/د، في حين تبلغ سرعة تشكل اللمف نحو 2 لتر في اليوم وبمعدل 1.4 مل/د.



الشكل 5-6: تمثيل تخطيطي لعملية جريان السوائل عبر الأفضية الخلالية وتشكل اللمف

الفصل الثاني الأورام اللمفاوية

تنشأ الأورام اللمفاوية على حساب تكاثر غمط أو أكثر من العناصر الخلوية للنسج اللمفاوية المكونة من الخلايا اللمفاوية البائية والثائية إلى جانب خلايا النسيج الشبكي البطاني (الخلايا الشبكية والخلايا الناسجة والبلاعم).

تصيب الأورام الخبيثة مختلف مكونات الجهاز اللمفاوي المتمثلة بالعقد اللمفاوية والليمفوس والطحال والتشكلات اللمفاوية المنتشرة في الأحشاء كافة. وتقسم الأمراض الخبيثة للجهاز اللمفاوي في مجموعتين كبيرتين يختلفان بالخصائص التشريحية والمرضية والأعراض السريرية إضافة إلى طريقة التطور والعلاج، وهما لمفوما هودجكين Hodgkin Lymphoma، ولمفومات لا هودجكين non Hodgkin Lymphomas.

أولاً: لمفوما هودجكين

لمفوما هودجكين مرض خبيث مجهول السبب وصف لأول مرة من قبل توماس هودجكين في عام 1832. يتصف المرض بتكاثر الخلايا اللمفاوية والناسجة في مجموعة من العقد اللمفاوية ومن ثم ينتشر إلى مجموعات مجاورة، وقد يمتد إلى أعضاء غير لمفاوية. ويتميز المرض بوجود خلايا شبكية غير نموذجية تعرف بخلايا ريد-سترنبرغ Reed-Sternberg. وهي خلايا كبيرة الحجم ذات هيولى غزيرة ومحيط غير منتظم. النواة مضاعفة أو متعددة الفصوص وذات كروماتين ناعم، يتضمن كل من فصوصها نوية زرقاء واضحة (الشكل 6-6).

1. الأعراض السريرية

يصيب المرض كافة الأعمار إلا أن معظم الإصابات تلاحظ في سن الشباب (25-35) وفي بداية سن الكهولة.

يشكو المريض من ضخامة عقد لمفاوية سطحية وغير مؤلمة في منطقة أو أكثر من الجسم، وتكون العقد مرنة أو مطاطية القوام، وغير ملتصقة إلى بعضها أو إلى الجلد . ويشكو المرضى من ألم في العقد إثر تناول المشروبات الكحولية وأعراض الانضغاط على الأجهزة . و يترافق المرض مع ترفع حروري غير منتظم وحكة معممة مزعجة إلى جانب تصبغ في الجلد والأغشية المخاطية وتعرق ونقص الوزن أحيانا. ومع تقدم المرض تظهر أعراض فقر الدم والزروف، بالإضافة إلى الإصابات الإنتانية الفطرية والجرثومية بسبب النقص في المناعة، و يترافق المرض في أغلب الحالات بإصابة درنية.

ويمر المرض من الناحية السريرية في أربع مراحل وفق آن آربر:

المرحلة الأولى: يتوضع المرض في العقد اللمفاوية لمنطقة تشريحية واحدة أو منطقتين متجاورتين على جانب واحد من الحجاب الحاجز.

المرحلة الثانية: يمتد المرض إلى أكثر من عقدة لمفاوية في منطقتين تشريحتين متجاورتين أو غير متجاورتين وعلى طرف واحد من الحجاب الحاجز. ويمكن أن يشمل المرض عضوا غير لمفاوي في منطقة تشريحية واحدة على نفس الجانب من الحجاب الحاجز.

المرحلة الثالثة: يمتد المرض على جانبي الحجاب الحاجز، ويبقى محصورا في العقد اللمفاوية والطحال.


المرحلة الرابعة: يمتد المرض إلى جانب العقد اللمفاوية والكبد والطحال إلى نسيج وأعضاء أخرى، مثل الرئة وغشاء الجنب والجلد والكليتين والجهاز الهضمي .

وتتضمن هذه المراحل الأربعة طورين اثنين هما الطور A والطور B في دلالة إلى غياب أو وجود عدد من الأعراض خلال الشهور الستة الأخيرة من المرض ،وهي الترفع الحروري المديد، والتعرق الليلي، ونقص وزن الجسم، إلى جانب الحكة والوهن العام.

2. الموجودات المخبرية

تظهر الاختبارات التشخيصية الموجودات المخبرية التالية:

- ارتفاع سرعة تئفل الدم
- ارتفاع تعداد الكريات البيض مع ارتفاع في نسبة الحمضات في 50% من الحالات.
- ارتفاع عيار الفسفراز القلوية ومستوى كلس المصل
- يتم تأكيد التشخيص بدراسة نسيجية لخزعة العقد اللمفاوية التي تظهر خلايا Reed -Sternberg المميزة للمرض.



الشكل 6-6: خلية Reed -Sternberg

- وتفيد دراسة الخزعة في تحديد أربعة أنماط نسيجية تختلف فيما بينها بالوصفات التشريحية المرضية ودرجة الإنذار، وهي:
- السيطرة اللمفاوية: يرتشح النسيج اللمفاوي بالخلايا اللمفاوية والتي يمكن أن تغطي خلايا Reed -Sternberg
- التصلب العقيدي: يلاحظ وجود حزم من نسيج مغزلي تقسم نسيج العقدة إلى عقد ، ويلاحظ ارتشاح النسيج بالخلايا اللمفاوية والنسيجية والمصورية والحمضة إلى جانب خلايا Reed -Sternberg.
- الخلوية المختلطة: يلاحظ خلايا لمفاوية وعدلة وحمضة ومصورية بنسب متفاوتة إلى جانب خلايا Reed -Sternberg .
- ندرة اللمفاويات: تندر اللمفاويات بشكل ملحوظ وترتفع نسبة خلايا Reed -Sternberg وبخاصة في المراحل المتأخرة من المرض. ويتقدم

المرض لدى نفس المريض من نمط السيطرة اللمفاوية ذي الإنذار الأفضل إلى نمط ندرة اللمفاويات ذي الإنذار الأكثر سوءاً.

ثانياً: لمفومات لا هودجكن non Hodgkin lymphomas

لمفومات لا هودجكن مجموعة من الأورام الخبيثة تصيب الأعضاء اللمفاوية وكذلك الأعضاء غير اللمفاوية، وتعرف عندئذ باللمفومات خارج العقدية. تنشأ هذه الأورام الخبيثة على حساب الخلايا اللمفاوية، وفي بعض الحالات الاستثنائية على حساب البالعات. تتشكل لمفومات لا هودجكن مجموعة من الأمراض التي تشبه من الناحية السريرية داء هودجكن باستثناء كون المرض غالباً ما يتوضع في منطقة واحدة عند ظهوره الأول ولا تشاهد خلايا Reed – Sternberg لدى فحص النسيج الورمي.

تتضمن لمفومات لا هودجكن عدة أمراض تختلف فيما بينها بالحدوث والتطور وخطّة العلاج، ولم يعثر على عامل مسبب لهذه الأمراض بشكل قاطع، ولكن تنهم عدة عوامل في كونها تؤهب لحدوث المرض يأتي على رأسها اضطرابات نقص المناعة، مثل نقص المناعة الأولي وتثبيط المناعة بعد غرس الكلية والذئبة الحمامية الجهازية والداء الرئوي. ويمكن لبعضها أن يرافق الإصابات الفيروسية (الحموية) مثل لمفوما بوركت ذات الصلة الوثيقة بالحمى الغدية EPV. ويمكن للعوامل العرقية أن تشكل دور مؤهب كما في لمفوما البحر الأبيض المتوسط. وكما هو في لمفوما هودجكن يلاحظ في لمفوما لا هودجكن تغيرات صبغية تتمثل بعدد صبغي ضعفاني، ويمكن ملاحظة إزفاء الصبغي 14 لدى نحو 50% من الخلايا البائية.

1. الأعراض السريرية

يصادف المرض قبل سن البلوغ، وترتفع نسبة الإصابة مع تقدم السن، وتمثل الأعراض السريرية بضخامة عقد لمفاوية عشوائية التوزع وكبيرة الحجم، وتتسبب عادة بإعراض انضغاطية. ويلاحظ انتشارات واسعة للمرض يمكن أن تشمل الرئة والكبد

والجهاز الهضمي والجنب والتامور، وتكون إصابة الجملة العصبية المركزية شائعة. وفي درجات المرض الشديدة يترافق المرض بترفع حروري وتعرق ليلي ووهن، إلى جانب نقص الوزن. وعموما تصنف المفومات لاهودجكن بحسب درجتها إلى درجة بسيطة، ومتوسطة، وعالية.

2. الموجودات المخبرية

تتمثل نتائج الفحوصات المخبرية بالموجودات التالية:

- ارتفاع في سرعة التثفل وارتفاع تركيز مولد الليفين وقلة الألبومين .
- ارتفاع تركيز الغلوبولينات α_2 ، وانخفاض الغلوبولينات γ على الرحلان الكهربائي.
- ينخفض تركيز الحضاب بسبب النزف المسبب بقلة الصفائح أو نتيجة فرط الطحال أو الانحلال المناعي الذاتي، أو ارتشاح النقي.
- فحص لطاخة الدم المحيطي قد تبدي نقصا في العناصر الخلوية مع وجود خلايا غير ناضجة الأمر الذي يشير إلى توضع نقوي للمرض .
- تؤكد خزعة العقد اللمفاوي التشخيص، وتحدد النمط النسيجي الذي يحدد درجة الإنذار. وتفيد دراسة خزعة الأعضاء في تشخيص المفومات خارج العقديّة.



الباب السابع

الصفائح الدموية وتخثر الدم


الفصل الأول

تطور الصفائح وبنيتها ووظائفها

أولاً: تطور الصفائح


تتكون الصفائح في نقي العظم انطلاقاً من الخلية التي تعرف بالنواء (أم الصفائح)، وتتطور النواءات انطلاقاً من السلالة المولدة للتقويات مروراً بالمراحل التالية:

1- أرومة النواءات **megakaryoblast**: وهي خلايا ذات شكل غير منتظم يبلغ قطرها نحو 20-35 ميكروناً (الشكل 1-7). تتلون الهيوولي بلون أزرق غامق، وهي عديمة المكننات وتمتلك عدة استطالات تشبه الأرجل الكاذبة. أما النواة فهي كبيرة الحجم دائرية أو بيضوية أو غير منتظمة ذات كروماتين ناعم أملس ومتجانس بلون أحمر، وهي تتضمن نحو 2-10 نويات بلون أزرق.




الشكل 1-7: أرومة النواء

2- سليفة النواءات **promegakaryocyte** : وهي خلايا ذات شكل غير منتظم بقطر 20-40 ميكرون (الشكل 2-7). تكون الهبيولى غزيرة وأقل زرقة مما هي عليه في الأرومة، وتكون المناطق المحيطة بالنواة غير ملونة، وتتضمن الهبيولى بعض الحبيبات. أما النواة فهي مركزية غير منتظمة الشكل، تبدي تفصيصا واضحا وكروماتين في بداية التكتل، وتتضمن عدة نويات.




الشكل 2-7: سليفة النواء

3- النواءات **megakaryocyte** : خلايا ضخمة يبلغ قطرها نحو 60-150 ميكرون (الشكل 3-7). تكون الهبيولى غزيرة وذات شكل غير منتظم وبلون أزرق زهري، وتتضمن عددا كبيرا من الحبيبات التي تأخذ بالتجمع في كتل صغيرة تنفصل عن الخلية لتكون الصفائح. أما النواة فهي كبيرة الحجم غير منتظمة الشكل ومفصصة وذات كروماتين أكثر تكتلا وعدمية النويات.



الشكل 3-7: النواة

4-الصفائح platelet : الصفائح أجسام دموية ذات أشكال غير منتظمة بيضوية أو دائرية يقدر قطرها بنحو 2-4 ميكرون، وسمكها بنحو 0.5-0.75 ميكرون. وهي أجسام غير منواة تتضمن هيولى زرقاء فاتحة تكون شفافة في المحيط، وحبيبية في المركز (الشكل 4-7).



الشكل 4-7:

يتراوح تعداد الصفائح بين 250-450 ألف/مل³ من الدم. وتتحلل الصفائح إلى الدم إثر تحطم النواعات حيث تبقى نحو 7-10 أيام قبل أن تتخرب من قبل الخلايا الشبكية البطانية في الطحال والكبد والرئتين. ويرتبط ثبات تعدادها بالتوازن القائم بين العوامل المعرضة لتكوها والمثبطة بكل من العامل المعرض لنمو

النواعات Meg-CSF والعامل المخرض لنمو الحبيبات والوحدات GM-CSF والأنترلوكين-3 IL3 إلى جانب الستيروئيدات وتخثرها من قبل الخلايا الشبكية البطانية في الطحال الأولى بالدرجة إلى جانب الكبد والرئات.


ويرتبط انخفاض عدد الصفائح الدموية بعدة مسببات، أهمها نقص إنتاجها في نقي العظم ونقص عمرها وفرط نشاط الطحال، وكذلك التروف الشديدة ونقل الدم المتكرر. أما ازدياد عددها عن 500 ألف فيلاحظ إثر الرضوض والعمليات الجراحية والتروف الحادة وبعض الأحماج، كالدرن، والاختناق، وبعض الحالات السرطانية إضافة إلى ابيضاض الدم النقوي المزمن.

ثانيا: بنية الصفائح

تبدو الصفائح تحت المجهر الإلكتروني على شكل خلايا محاطة بغشاء مضاعف، وهيولى شفافة في المحيط، وحبيبية في الوسط (الشكل 5-7).. ويتكون الغشاء الخلوي كما لأغشية الخلوية عامة من طبقتين شحمتين مرصعتين بالبروتينات التي ترتبط من الجهة الخارجية مع جزيئات كربوهيدراتية (سكرية)، مشكلة ما يعرف بالكنان السكري glycocalyx وتعد هذه الطبقة التي تتوضع على السطح الخارجي لغشاء الصفائح بنية فريدة في مكوناتها الوظيفية، فهي تتضمن حمض السياليك الذي يعطي الشحنة السالبة للغشاء. وتتضمن هذه الطبقة الغشائية العديد من المستقبلات النوعية، مثل البروتين السكري Ib (وهو مستقبل عامل ويلراند VWF الذي يشكل جسرا بين الصفائح، وألياف الكولاجين) والبروتين السكري IIb-IIIa (الذي يقوم بدورهم في عملية التجمع الصفحي)، إضافة إلى المستقبلات النوعية لعدد من المركبات المهمة، مثل الحثرين، والكولاجين، والأدرينالين والسيروتونين، ومولد الليفين وADP.

ويمتد من غشاء الصفائح نحو الداخل جملة من النبيبات التي تؤمن بالإضافة إلى طرح منتجات الحبيبات والعضيات الهيولية المتوضعة في أعماق الصفائح، اتساعا


كثيرا في السطح الضروري لتنفيذ عوامل التآكل المدمصة على سطح الصفائح وتنشيطها بشكل نوعي. وتعرف هذه الجملة الفريدة من القنيات بجهاز القنيات المفتوحة (منظومة قنيات الاتصال بالسطح surface-connected canalicular system)، التي يمكن أن تقوم أيضا بنقل جسيمات مبتلعة.



الشكل 5-7: بنية الصفيحة

ويتوضع تحت الغشاء الخلوي مباشرة شبكة من الخيوط والنبيبات الدقيقة التي تشكل هيكلًا دعامياً يعطي الصفائح شكلها الدائري أو البيضوي، وتعد هذه البنى ضرورية من أجل تثبيت الأجسام والعصيات ضمن الصفائح إضافة لإفرازها بعض العوامل الضرورية لعملية التآكل، مثل مولد الليفين. وتشكل هذه النبيبات والخيوط الدقيقة جهاز تقلص وانكماش الصفائح (الترمبوستينين).

وتحتوي المنطقة الحبيبية ثلاثة أنماط من الحبيبات تعرف بالحبيبات ألفا (α)، والحبيبات الكثيفة (δ)، والجسيمات الحالة (β)، إضافة إلى حبيبات الغليكوجين



الشكل 6-7: آلية تأثير الأسبرين كمضاد لتكدس الصفائح

وإلى جانب الدور الهام في الأرقاء (التخثر) الأولي، وتشكيل السادة الصفحية، تلعب الصفائح دوراً هاماً في عملية تخثر الدم، وتشكيل الخثرات الشريانية والوريدية، وفي الحوادث الالتهابية والمناعية، إضافة إلى دورها المحتمل في الانتقالات الورمية وإحداث الأورام.

الفصل الثاني


الإرقاء وتخثر الدم

الإرقاء هو مجموع الآليات التي تؤمن الوقاية من ضياع الدم وتدفقه السوي في الأوعية الدموية بفضل التوازن الدقيق بين العوامل المعرضة لتشكيل الخثرات الدموية التي توقف النزف في الأوعية الدموية المعطوبة من جهة، وبين العوامل المضادة للتخثر التي تمنع تخثر الدم في الحالة السوية، وتحافظ على سيولته الدائمة من جهة ثانية. وتتضمن عملية الإرقاء إلى جانب آلية تخثر الدم (التخثر الثانوي)، مجموعة الحداثيات التي تسبق هذه الآلية، والتي تعرف بالتخثر الأولي (البدئي)، ومجموع الحوادث التي تلي تشكل الخثرة، وهي انكماش الخثرة وانحلالها.

أولاً: التخثر الأولي

تعد آلية التخثر الأولي مسؤولة عن إيقاف النزف الدموي في الأوعية الشعرية المعرضة بشكل مستمر للتمزق. و تبدأ هذه الآلية التي تتم على عدة مراحل بتضييق وعائي موضعي، وانخفاض التدفق الدموي بفعل العديد من المواد المضيقعة الوعائية المتحررة من الوعاء المعطوب، مثل النورادرينالين والسيروتونين. وفي المرحلة التالية يحدث التصاق الصفائح الدموية المشحونة سلباً بألياف الكولاجين للوعاء الممزق المشحونة إيجابياً بفعل التجاذب الكهربائي، وبفضل وجود البروتين السكري Ib الذي يثبت عليه عامل ويلراند ويقوم جسراً بين ألياف الكولاجين والغشاء الصفحي. ويسبب التصاق الصفائح بألياف الكولاجين تنشيط الصفائح التي تقوم بإفراز العديد من المكونات الموجودة في حبيباتها وخاصة عامل التنشيط الصفحي والترمبوكتان A2 والسيروتونين و ADP و ATP، والتي تسبب جذب صفائح جديدة وتنشيطها. ويحتاج تجمع الصفائح أيضاً أيونات الكالسيوم والبروتين السكري IIb-IIIa (وهو المستقبل النوعي لمولد الليفين). ويؤدي تجمع الصفائح

في المنطقة المعطوبة إلى تشكل سدادة صفيحية رخوة خلال 3-10 ثوان ، وتستطيع هذه السدادة عادة إغلاق الثقوب الصغيرة وإيقاف الزيف الدموي في الأوعية الشعرية . أما في الأوعية الدموية الكبيرة فيمكن ، لارتفاع قيمة الضغط الشرياني أو انخفاض درجة تقلص الوعاء أن يتسبب في انجراف السدادة الصفيحية ، وهو الأمر الذي لا يحدث عادة في الحالة السوية بفضل آلية التخثر الثانوي التي تؤمن تشكل خثرة قوية ومتماسكة نتيجة ارتباط الصفيحات والكريات الحمر بخيوط الليفين (الشكل 7-7).



الشكل 7-7: الآلية العامة لتخثر الدم وتشكل الخثرة الدموية

ثانيا: عوامل التخثر والتخثر الثانوي

1-عوامل التخثر

تتضمن عملية التخثر الثانوي شلالا من التفاعلات الكيميائية الحيوية وفق آلية مكونة ثلاثة أطوار يشارك فيها قرابة 13 عاملا، أعطيت دلالات رقمية رومانية تتفق

مع تسلسل اكتشافها، وتعرف بعوامل التخثر. وتصنف عوامل التخثر في ثلاث مجموعات رئيسية هي: مجموعة مولد الليفين ومجموعة ظليعة الخثرين ومجموعة التماس. أ-مجموعة مولد الليفين: و تتضمن هذه المجموعة العوامل التالية:

- العامل الأول (Fibrinogen I) ويعرف بمولد الليفين وهو عبارة عن غلوبولين كبري بوزن جزيئي مقداره 341 ألف دالتون يصطنع في الكبد وينقل منحلا في المصورة الدموية، ويتراوح تركيزه فيه بين 100 و700 مغ/100 مل. ويتحول مولد الليفين المنحل تحت تأثير الخثرين إلى ليفين غير منحل قادر على تشكيل شبكة الجلطة الدموية.

- العامل الخامس (Proaccelerin V) وهو عبارة عن غلوبولين غير مستقر ويمتلك نصف عمر يقارب 16 ساعة وهو ضروري للمراحل النهائية من عمليات تشكل الترمبوكليناز (الترموبلاستين). ويعرف هذا العامل الذي يستنفذ خلال عملية التخثر بالغلوبولين المسرع حيث ينشط عملية تحول ظليعة الخثرين إلى خثرين بآلية التلقيم الراجع الإيجابي.

- العامل الثامن (Antihemophilic Factor A VIII) ويعرف بالعامل المضاد للناعور A. يستنفذ هذا العامل غير المستقر خلال عملية التخثر ولا يوجد في المصل، وهو يتكون من عدة أجزاء وظيفية إحداها ذو وزن جزيئي مرتفع (عدة ملايين) ويعرف بعامل ويلبراند ويؤدي غيابه الولادي إلى مرض نرزي يعرف بداء ويلبراند، وآخر ذو وزن جزيئي صغير (230 ألف)، وهو المهم في عملية التخثر (الترمبوكليناز أو الترموبلاستين الداخلي) حيث يؤدي غيابه إلى الناعور المدرسي.

- العامل الثالث عشر (XIII) ويعرف بعامل استقرار الليفين والذي يعمل بوجود أيونات الكالسيوم على استقرار شبكة خيوط الليفين وثباتها.

- وتتصف عوامل هذه المجموعة باستنفادها أثناء عملية التخثر وهي ذات وزن جزيئي مرتفع ، توجد في المصورة وتغيب عن المصل . ويعرف عن هذه العوامل ارتفاع تركيزها في حالات الحمل والإصابات الالتهابية، وفي حالات الكرب (الشدة) وكذلك لدى تناول مانعات الحمل الفموية . ويلاحظ أن تراكيز العاملين الخامس والثامن تنخفض بشكل ملحوظ أثناء نقل الدم.

ب-مجموعة طليعة الخثرين: وتضم هذه المجموعة العوامل التالية:

-العامل الثاني(II , prothrombin): وهو بروتين مصوري من نمط الغلوبولين ألفا-2 بوزن جزيئي 68700 ، ويبلغ تركيزه في المصورة قرابة 15ملغ/100مل. يصطنع هذا العامل في الكبد ويتطلب توفر الفيتامين K، وهو بروتين غير مستقر يمكن أن ينشط تحت تأثير الترمبوكتيناز الخارجية و/أو الداخلية ويتحول إلى الخثرين ذي الفعالية الأنزيمية الحالة للبروتين، والذي يحول مولد الليفين إلى ليفين .

-العامل السابع(Proconvertin VII): يعرف بطليعة الكنفرتين وهو غلوبولين بيتا يصطنع في الكبد، ويتطلب توفر الفيتامين K، ويوجد في كل من المصورة والمصل. ويعد هذا العامل ضروريا لعملية تشكل الترمبوكتيناز الخارجية ، حيث يتم تفعيله بفضل الترمبوبلاستين النسيجي.

-العامل التاسع(Christmas Factor IX): يعرف بعامل كريسماس أو بمضاد الناعور B، ويعرف أيضا بالمكون المصوري للترمبوبلاستين، وهو بروتين مصوري مستقر وضروي في عملية تشكل الترمبوكتيناز الداخلية.

-العامل العاشر(Stuart Factor X): يعرف بعامل ستيوارت هو بروتين مصوري من نمط الغلوبولين ألفا يتطلب تكوينه في الكبد توفر الفيتامين K . ويتم تنشيط هذا العامل وفقا للمسلكين الداخلي و/أو الخارجي.

-وتتصف عوامل هذه المجموعة عموما بكونها ذات وزن جزيئي قليل ويتطلب اصطناعها في الكبد توفر الفيتامين K ولذلك يتم تثبيط اصطناعها باستخدام مضادات الفيتامين K الصناعية مثل الوارفارين. وباستثناء العامل الثاني فإن هذه العوامل توفر في المصورة والمصل على السواء. وفيما يؤدي تناول مضادات التخثر الفموية إلى انخفاض تركيزها ، يلاحظ ارتفاع تراكيزها في حالات الحمل، ولدى تناول مضادات الحمل الفموية.

ث-مجموعة التماس: وتضم العوامل التالية:

- العامل الحادي عشر (XI) ويعرف بالعامل المضاد للناعورC، أو سابقة الترمبولاستين المصوري(PTA) ، وهو غلوبولين مصوري من النمط بيتا يمكن أن يوجد في المصل ويستنفذ خلال عملية تشكل الترمبوكتيناز الداخلية.


- العامل الثاني عشر (XII) ويعرف بعامل هايغمان Hageman factor أو عامل التماس ، وهو عامل ثابت لا يستنفذ أثناء عملية التخثر. يتم تنشيط العامل الثاني عشر وتحويله إلى الشكل الفعال ذي الفعالية الأنزيمية بفعل تماسه مع ألياف الكولاجين للوعاء المعطوب. ويسرع عملية التفعيل طليعة الكاليكرين prekallikrein والذي يعرف بعامل فليتشر Fletcher factor وكذلك مولد الكينين ذي الوزن الجزيئي المرتفع HMW kininogen، والذي يعرف بعامل فيتزجيرالد Fitzgerald factor.

وتتدخل جميع عوامل المجموعة في عملية تشكل الترمبوكتيناز الداخلية وهي تتواجد في كل من المصل والمصورة ولا يتم استنفادها خلال عملية التخثر.

2-آلية التخثر

تتم عملية تخثر الدم وفق آلية أنزيمية مكونة من ثلاثة أطوار. يتمثل الطور الأول بتشكل منشط طليعة الخثرين والذي يعمل على قلب طليعة الخثرين إلى خثرين في

الطور الثاني، ومن ثم يعمل الخثرين على قلب مولد الليفين إلى ليفين في الطور الثالث (الشكل 7-8).




الشكل 7-8: أطوار تخثر الدم وتشكل الخثرة الدموية

أ-الطور الأول: يتضمن هذا الطور تشكيل المعقد المنشط لطليلة الخثرين (الترمبولاستين أو الترمبوكيناز) وفق سبيلين/ اثنين هما السبيل الخارجي و /أو السبيل الداخلي.

يستهل السبيل الخارجي بوساطة الترمبولاستين النسيجي التي تتحرر من الأنسجة المعطوبة أو المصابة بالرضح. وبعد الترمبو بلاستين النسيجي معقدا من شحوم فسفورية وبروتين شحمي وبروتين سكري . وتشكل البروتينات الشحمية معقدا مع العامل السابع الذي ينشط بحضور أيونات الكالسيوم والشحوم الفسفورية العامل العاشر. ويعمل العامل العاشر المنشط على قلب قسم ضئيل من طليعة الخثرين، إلى خثرين (الشكل 7-9). ويقوم الخثرين إلى جانب إطلاقه الطور الثاني من آلية التخثر، بتنشيط العامل الخامس الذي يحفز بدوره تحول المزيد من طليعة الخثرين إلى خثرين بآلية

التلقيح الرابع، إضافة لتحفيزه تكس الصفائح وتحرر العامل الصفحي الثالث الضروري لتفعيل العامل الثامن في السبيل الداخلي.


أما السبيل الداخلي فيستهل بتنشيط العامل الثاني عشر إثر تماسه مع أي عامل غريب وخاصة ألياف الكولاجين للوعاء الدموي الممزق. ويتم تنشيط هذا التفاعل بواسطة مولد الكينين ذي الوزن الجزيئي المرتفع وطلبة الكالكرين ويقوم العامل الثاني عشر المنشط بتفعيل العامل الحادي عشر. ويحتاج هذا التفاعل أيضا إلى مولد الكينين ذي الوزن الجزيئي المرتفع ويسرع



الشكل 7-9: تشكل الترمبوكليناز (الترمبوبلاستين وفق المسلك الخارجي)

أيضا بواسطة طليعة الكاليكرين . ويقوم العامل الحادي عشر المفعّل بقلب العامل التاسع إلى الشكل الفعّال. وبعدها يقوم العامل التاسع المنشط، وبحضور العامل الصفيفي الثالث والعامل الثامن وأيونات الكالسيوم، بتنشيط العامل العاشر ليشارك مع السبيل الخارجي في قلب طليعة الخثرين على خثرين (الشكل 10-7).

وتجدر الإشارة إلى أن تشكّل الترمبوكيناز الداخلية يتطلب وقتا أطول (4 - 10 دقائق) بالمقارنة مع تشكّل الترمبوكيناز الخارجية (5-10 ثوان) ..




الشكل 10 - 7: تشكّل الترمبوكيناز (الترمبوبلاستين) وفق المسلك الداخلي

وتعد أيونات الكالسيوم التي تعرف بالعامل الرابع ضرورية من أجل تحفيز جميع تفاعلات السيلين الداخلي (عدا الخطوتين الأوليتين)، والخارجي (عدا الخطوة الأولى)، ولذلك لا يحدث تخثر الدم بغياب هذه الأيونات.

ب-الطور الثاني: يتم في هذا الطور تحول طليعة الخثرين إلى خثرين تحت تأثير الترمبوكتيناز عن طريق شطر بروتين يبلغ وزنه الجزيئي (33700) نحو نصف الوزن الجزيئي لطليعة الخثرين (68700).

ث-الطور الثالث: يتم في هذا الطور تحول مولد الليفين المنحل إلى ليفين غير منحل تحت تأثير الخثرين الذي يمتلك فعالية أنزيمية حالة للبروتين. وتتضمن حدثيات تشكل الليفين شطر مولد الليفين إلى جزئين، يتألف كل منهما من ثلاث سلاسل ببتيدية (γ, β, α) ، ثم يتبع ذلك فصل أربع روابط ببتيدية على أساس رابطة من كل سلسلة α ورابطة من كل سلسلة β ، ويتحول بذلك مولد الليفين إلى ليفين موحود. ويتم ارتباط مواحيد الليفين بعضها بنهاية بعض مشكلة خيوطا ترتبط بدورها مع بعضها بروابط هيدروجينية ضعيفة. ويسبب تفعيل العامل الثالث عشر (عامل استقرار الليفين)، ولاسيما في الصفائح الدموية بوساطة الخثرين وبوجود أيونات الكالسيوم يتم تشكيل روابط مشتركة قوية بين خيوط الليفين المتكدسة مما يزيد من تماسكها واقتراها من شكلها الثلاثي الأبعاد.



الشكل 11-7: تمثيل تخطيطي لعملية تخثر الدم والحلال الجلطة الدموية

ج- انكماش الجلطة

تحرر الصفيحات الدموية المحتجزة ضمن خيوط الليفين المزد من عامل استقرار الليفين، مما يزيد من تماسك الجلطة الدموية. ويؤدي تنشيط الصفيحات إلى حث تقلص الصفيحات المرتبطة بخيوط الليفين تحت تأثير الثرمبوستيتين والبروتينات التقلصية (الأكتين والميوزين) وانكماش الجلطة، الذي يؤدي بدوره إلى جذب الحواف المقطوعة للوعاء وانسداده بشبكة الليفين القوية والعناصر الدموية المحتجزة بداخلها.

ح- انحلال الجلطة الدموية

يؤدي تشكل الجلطات الدموية على هذا النحو إلى بروزها على شكل ندبات، وقد تسبب في انسداد الأوعية الدموية في أغلب الأحيان. وهنا تتدخل آلية انحلال الجلطة بعد تشكيلها بهدف فتح الوعاء وإعادته إلى وضعه السوي. ويحدث انحلال الجلطة بفعل أنزيم البلازمين plasmin الذي يوجد في المصورة الدموية بشكل غير فعال وهو طليعة البلازمين plasmingen. ويتم تحول طليعة البلازمين على بلازمين تحت تأثير عوامل منشطة تتحرر من النسيج المتأذية والبطانة الوعائية وتتواجد في الدم والبول وتقسم إلى منشطات داخلية مثل اليوروكيناز ومنشط طليعة البلازمين النسيجي (TPA)، ومنشطات خارجية مثل الستافيلوكيناز والستربتوكيناز (الشكل 11-7). ويقوم البلازمين بتفكيك خيوط الليفين غير المرغوب بها والمتوضعة ضمن الأوعية أو خارجها، ويحولها على ببتيدات متعددة وحموض أمينية بفضل طبيعته الأنزيمية الشبيهة بالترسين. وتعد فعالية البلازمين الحالة للبروتين غير نوعية، فهو يستطيع مهاجمة بعض عوامل التخثر وتفكيكها مثل مولد الليفين والعامل الخامس، وطليعة الخثرين إلى جانب العامل الثاني عشر. ويكون جهاز البلازمين الحال لليفين مبطا في الظروف السوية بواسطة بروتين ينتجه الكبد يعرف بمضاد البلازمين ألفا-2 Alpha-2 plasmin inhibitor، ومنشطات منشط طليعة البلازمين النسيجي (TPAI).


ثالثا: مضادات التخثر

تؤمن مضادات التخثر الوقاية من تخثر الدم والحفاظ على تدفقه السوي في الأوعية الدموية بالرغم من وجود جميع عوامل التخثر. وتعد سلامة البطانة الوعائية بسطحها الأملس من أهم الآليات التي تحول دون تخثر الدم بالتماس من جهة، وتمنع تكلس الصفائح، بالتنافر الكهربائي، من جهة ثانية. وتربط البروتينات المتمزة على سطح البطانة وخاصة الترمبوموديولين thrombomodulin على ربط الخثرين ويزيل فعاليته. ويؤدي ارتباط الخثرين بالترمبوموديولين أيضا إلى تنشيط البروتين protein C

C. وبعد الأخير بروتين مصوري يصطنع في الكبد ويتطلب ذلك توفر الفيتامين K .
وبقوم البروتين C الفعال بإزالة العوامل الخامس والثامن المنشطة. كما يقوم الكبد
باصطناع بروتينا مصوريا آخر يعرف بالبروتين S S protein ، والذي يسرع
عملية إبطال مفعول العاملين الخامس والثامن من خلال لعبه دور تمهيم مساعد ومحفز
للبروتين C (الشكل 12-7).

و يعد مضاد الخثرين III ، antithrombin III الذي يربط الخثرين من أبرز
مضادات التخثر الطبيعية الموجودة في الدم ، وهو بروتين سكري
مصوري (غلوبولين- α_2) ، يصطنع من قبل الخلايا الكبدية وخلايا البطانة الوعائية ،
وكذلك أم الصفائح (النواءات) . وتعود خصائص مضاد الخثرين III إلى كونه
يستطيع ربط الخثرين ، ويمنع تأثيره على مولد الليفين . أما الهيبارين heparin الذي
يتشكل بوفرة من قبل الخلايا البدينة في كل من الكبد والرئتين وكذلك الكريات
البيض الأساسية ، فيمنع تخثر الدم من خلال تعزيز قدرة مضاد الخثرين III على ربط
الخثرين بمقدار 100 - 1000 ضعف ، وإلى جانب الخثرين يزيل معقد الهيبارين مع
مضاد الخثرين III عدة عوامل تخثر منشطة منها الثاني عشر والثاسع والعاشر ، الأمر
الذي يعزز تأثيره المضاد للتخثر. ويقوم الغلوبولين الكبري ألفا-2 α_2 -
macroglobulin الذي يشبه معقد مضاد الخثرين -هيبارين ، ويعرف بمضاد
الخثرين IV (ولكن لا يحفز عمله بالهيبارين) بدور هام في منع تخثر الدم من خلال ربطه
عدد من عوامل التخثر وحصر تأثيرها الحال للبروتين إلى أن يتم تحطيمها بطرق أخرى.
وتعرف العوامل المضادة للتخثر التي تتواجد بشكل دائم في المصورة الأولية والتي أشرنا
إليها أعلاه بمضادات التخثر الأولية ، في حين يطلق على العوامل المضادة للتخثر التي
تتشكل أثناء عملية التخثر وتحلل الجلطة الدموية بمضادات التخثر الثانوية. وينتمي إلى
العوامل الأخيرة الليفين الذي يقوم بربط قرابة 90٪ من الخثرين ولذلك دعي بمضاد

الخشرين I ، ويقوم العامل الحادي عشر بعد تفعيله العامل التاسع بتثبيت العامل الثاني عشر.




الشكل 12-7: مسلك البروتين C المضاد للتخثر

إضافة إلى ذلك تمتلك الشداف الببتيدية الناتجة عن تحول مولد الليفين إلى ليفين بفعل الحشرات، وكذلك الشداف الببتيدية المتشكلة لدى انحلال شبكة الليفين خصائص مضادة للتخثر، وتسهم في منع تشكل خثرات جديدة.

و يعد الهيبارين إلى جانب الهيرودين herodin الموجود في لعاب العلق الطبي من مضادات التخثر الطبيعية التي تستخدم في الوقاية من تخثر الدم. وتستخدم مضادات الفيتامين k مثل الوارفارين Warfarin في التطبيقات العلاجية للوقاية من تخثر الدم. فالفيتامين k عامل ضروري لاصطناع العديد من عوامل التخثر في الكبد وبخاصة

عوامل مجموعة طليعة الخثرين (الثاني والسابع والعاشر والتاسع)، فهو يقوم بشكله المرجع بدور تميم في مرحلة ما بعد الترجمة لتشكيل جذور γ -كربوكسي غلوتاميل الضرورية لربط أيونات الكالسيوم في بروتينات الخثر المشار إليها. أما مضادات الفيتامين K مثل الوارفارين فهي تثبط أنزيم الريدكتاز الذي يتوسط تحول الفيتامين K من شكل الأيوكسيد إلى الشكل المرجع (الشكل 13-7) .



الشكل 13-7: دور الفيتامين K في تشكيل زمرة γ -كربوكسي غلوتاميل وآلية تأثير الوارفارين المضاد للتخثر. أما منع تخثر الدم خارج الجسم أثناء جمع الدم، فيتم باستخدام العديد من المواد المزيلا لأيونات الكالسيوم، مثل سيترات الصوديوم وأوكزالات الصوديوم، والأيتيلين ثنائي الأمين رباعي الأسيتات (EDTA).

الباب الثامن

أمراض الأرقاء

Disorders of Hemostasis

يمكن تصنيف مختلف أمراض الأرقاء التي تتجلى بتظاهرات نزفية أو تخثرية من حيث المسببات في ثلاث مجموعات رئيسية هي: الاضطرابات المسببة باعتلال الأوعية الدموية، والاضطرابات المرتبطة باعتلال الصفائح الدموية، وتلك المسببة باعتلال عوامل التخثر، أو مضادات التخثر.



الفصل الأول

الأمراض الزفية المسببة باعتلال الأوعية الدموية

تشمل الأمراض الزفية المسببة باعتلال الأوعية الدموية مجموعة من الاضطرابات الزفية التي تتظاهر بـ نزفية على شكل نمشات في الجلد أو الأغشية المخاطية أو الأعضاء الداخلية ، وهو ما يعرف بالفرفرة *purpura* . وتكون الفرفرة على علاقة بخلل بنية الأوعية الدموية أو البنى الداعمة لها (بدون نقص في تعداد الصفائح). ومن أكثر هذه الاعتلالات مصادفة نذكر:

أولاً: الفرفرة المرتبطة باعتلالات النسيج الضامة الوراثية ، نذكر منها:

1- توسع الشعريات الوراثي *Hereditary telangiectasia*: يتصف

هذا المرض العائلي بتوسع الشريينات والشعريات والأوردة الصغيرة في الجلد والأغشية المخاطية ، نتيجة فقدانها لغلافها العضلي والليفى بحيث تبقى مكونة من طبقة الخلايا البطانية فقط. يكتشف المرض في الطفولة ويتطور مع تقدم العمر، ويتظاهر بحدوث الزف في منطقة الأوعية المصابة وأكثرها مصادفة الأنف والجهاز الهضمي والرئات .

2- متلازمة اهلر - دانلوس *Ehler-Danlos Syndrome*: وهي

مرض وراثي نادر يتصف بكون الأوعية الدموية سوية، إلا أن الأذى يصيب النسيج الضامة عامة بما فيها تلك المحيطة بالأوعية الدموية. ويتظاهر المرض بالزف داخل العضلات، والزروف الهضمية ، والرعاف، إلى جانب ظهور كدمات واسعة في الجلد والبيلة الدموية.

ثانياً: الفرفرة المرتبطة بإصابة الخلايا البطانية

يرتبط اعتلال خلايا البطانة الوعائية إما بأذية نسيجية كيميائية أو فيزيائية مسببة بعوامل جرثومية، أو أذية مناعية على علاقة بتناول الأدوية أو مادة غذائية و تفعيل جلمة

المتممة. ففي متلازمة هيونخ - شونلن Henoch-Schonlein syndrome تظهر الفرغرية في المناطق المتناظرة من الأليتين والأطراف بسبب التهاب الأوعية الدموية غير النوعي واسع الانتشار. ويتظاهر المرض بوذمات موضعية في الجلد مع تورم مؤلم حول المفاصل، وألم بطني يترافق بالتغوط الأسود والبيطة الدموية. وتحدث هذه الأعراض نتيجة تفاعل مناعي تحسسي على علاقة بإنتان جرثومي (المكورات السبحية A)، أو تناول مادة غذائية.

ثالثا: الفرغرية المرتبطة بانخفاض القوة الميكانيكية للأوعية الشعرية يعد البثع من الأمثلة المشهودة على الفرغرية المرتبطة بنقص متانة الأوعية الدموية، حيث يحدث الترف نتيجة لخلل جدار الأوعية الشعرية والأنسجة الداعمة لها (عدم كفاية ألياف الكولاجين). ويتظاهر البثع في البداية ببقع نزفية على الوجه الخلفي للساق والفخذ والأليتين، ومع تقدم المرض يشمل جميع أنحاء الجسم بما فيها البطن والوجه والمفاصل.

رابعا: الفرغرية الكهلية (الشيخية) Senile Purpura

تتجلى الفرغرية الكهلية ببقع نزفية في مناطق الجلد الرقيقة والضامرة لدى المسنين، وخاصة خلف اليدين والذراعين وحول العينين. ويعتقد أن هذه البقع الترفية التي تزول بعد بضعة أسابيع مخلفة تصبغات جلدية طفيفة تكون على علاقة بهشاشة الأوعية الدموية، وضعف الأنسجة الداعمة لها. وتشبه الفرغرية الكهلية فرغرية الستيروئيدات التي تشاهد لدى مرضى ذاء كوشينغ أو المرضى الذين يتعاطون الستيروئيدات لفترة طويلة، والتي قد تكون على علاقة برقة الجلد.

أما الفرغرية البسيطة التي تحدث بسبب هشاشة وعائية موضعية، فهي شائعة جدا لدى الإناث وتظهر عادة في الأطراف على شكل كدمات نزفية تلقائية، أو إرض بسيط، وتكون مسبقة بالآلام حادة في مكان ظهورها، وهي غير مؤذية عادة.

خامسا: الفرفرية المرتبطة بتمزق الوريدات الصغيرة

تكون الفرفرية المرتبطة بتمزق الوريدات الصغيرة والتي تلاحظ غالبا حول الكاحل على علاقة بارتفاع الضغط اللمعي. ويمكن أن تشاهد هذه الفرفرية لدى مرض فرط التروية وفي فرط الغلوبولينات الكبرية في الدم.

وتجدر الإشارة إلى أن الفرفرية المسببة باضطراب التخثر داخل الأوعية، وخاصة تشكل الخثرات الصغيرة، وكذلك الفرفرية المرتبطة بالأورام والسرطانات الوعائية، مثل داء كابوسسي Kaposi Sarcoma، والأورام الوعائية، تنتمي أيضا إلى الاضطرابات النزفية المرتبطة باعتلال الأوعية الدموية.



الفصل الثاني

الأمراض الترفية الناجمة عن اعتلالات الصفائح

تتضمن اعتلالات الصفائح المؤدية إلى اضطرابات نزفية كلا من الشذوذات الكمية، والشذوذات الكيفية، إلى جانب الشذوذات الشكلية .

أولاً: الشذوذات الشكلية

تعرف الشذوذات الشكلية بتخطي قد الصفائح حد السواء الذي يتراوح بين 6 و 10 فيمتولتر، وتتمثل هذه العيوب التي يمكن ملاحظتها أثناء فحص اللطاخة الدموية بمتلازمة ويسكوت-الدريخ Wiscot-Aldrich syndrome التي تتصف بصفائح صغيرة قدها أقل من 6 فيمتولتر ومتلازمة البورت Alport, S syndrome التي تتميز بصفائح ضخمة إلى جانب انخفاض تعدادها . أما اضطراب ماي-هيجلين May- Hegglin Anomaly، فيظهر صفائح ضخمة إلى جانب أجسام Dohle في الكريات البيض المحبة.

ثانياً: شذوذات الصفائح الكمية

تتضمن شذوذات الصفائح الكمية المؤدية إلى اضطرابات نزفية كل من قلة الصفائح thrombocytopenia التي تعرف بانخفاض تعداد الصفائح في الدوران إلى مادون الحد الأدنى (150 ألف/ملم³)، وكثرة الصفائح thrompocytosis ، التي تعرف بتجاوز تعداد الصفائح في الدوران الحد الأعلى (450 ألف/ملم³).

1- قلة الصفائح thrombocytopenia

يشير مصطلح قلة الصفائح إلى وجود كمية ضئيلة من الصفائح (دون 100 ألف/ملم³) في الدوران. ويتظاهر هذا العيب ببقع نزفية في الجلد أو الأغشية المخاطية تعرف بفرغرية قلة الصفائح. وتحدث الاضطرابات الترفية عادة


إثر الرضوض لدى هبوط تعداد الصفيحات إلى مستوى 60 ألف فما دون، وتصبح النزوف العفوية متوقعة عندما يقارب تعداد الصفيحات حدود 30 ألف ، أما النزوف العفوية فتصبح شائعة وأحيانا مميتة عندما ينخفض تعداد الصفيحات إلى مستوى 10 آلاف فما دون . وترتبط قلة الصفيحات بالمسببات التالية:

- نقص إنتاج الصفيحات في النقي : يعزى نقص إنتاج الصفيحات في النقي سواء أكان مرتبطا بتنشيط تكون الصفيحات أو بتنشيط السلالة الدموية المولدة للنواءات ، إلى مسببات مكتسبة وأخرى وراثية. ويلاحظ نقص إنتاج الصفيحات المكتسب في عدد من الحالات المرضية التي يتقدمها فقر الدم اللاتنسجي ، وفقر الدم الخبيث (الويل أو العرطل) وفقر الدم بعوز الحديد، وكذلك في ارتشاح النقي بالخلايا السرطانية وفي ابيضاض الدم ، وداء هودجكن، والسرطانات الانتقالية، إلى جانب أسباب دوائية (العلاج الكيميائي والكلورامفينيكول) والتشعيع ، والكحول، والتعرض لبعض المواد الكيميائية (مبيدات الحشرات). وتلاحظ قلة الصفيحات المكتسبة في التسمم اليوريميائي، والذئبة الحمامية، والأمراض الحبيبية ، مثل الساركويد sarcoidosis (الغرناوية) ، إضافة إلى مسببات غامضة.

أما قلة الصفيحات الوراثية فتصادف في بعض الأمراض الوراثية النادرة مثل متلازمة فانكوني Fanconi's syndrome، وفقر الدم اللاتنسجي البنيوي ومتلازمة ويسكوت -الدريخ، واضطراب ماي-هيغلين، إضافة إلى قلة الصفيحات الضخمة الوراثي macrothrombocytopenia كما في متلازمة ألبورت.

- قصر عمر الصفيحات وتخثرها : يرتبط نقص عمر الصفيحات بتخثرها بواسطة آليات مناعية مسببة بتفاعل الضد- المستضد أو تفعيل جملة المتممة. ويلاحظ تخثر الصفيحات المناعي إلى جانب الفرغرية بقلة الصفيحات الغامضة Idiopathic thrombocytopenia purpura إثر تناول الأدوية (مثل heparin , quinidine, sulfonamide, heroin, morphine , إضافة إلى سم

الأفاعي . وفي حين تسبب بعض الأدوية تخرب الصفائح بتوسط تفاعل ضدي- مستضدي، كما هو الحال لدى تناول مشتقات السلفوناميد والمرضى الذين يمتلكون حساسية نحو الهيبارين (الشكل 1-8) ، تُعرض أدوية أخرى مثل المورفين تخرب مناعي للصفائح بتوسط جملة المتمة .



الشكل 1-8: توضيح لآلية تخرب الصفائح و قلة الصفائح وكذلك تحريض الخثرات المسبب بالهيبارين لدى الأشخاص المؤهبين (الحساسين نحو الهيبارين)

ويلاحظ تخرب الصفيحات المناعي في الإنتانات الجرثومية بنتيجة ارتباط الصفيحات بالمعقد الضدي- المستضدي الجرثومي، وكذلك في بعض الإصابات الطفيلية مثل الملاريا المسببة بواسطة *plasmodium flaciparum*. ويمكن لقلة الصفيحات المناعية أن تلاحظ لدى مواليد لأمهات مصابات بقلة صفيحات مناعي مزمن بنتيجة عبور الأضداد الذاتية IgG من خلال المشيمة. وتعرف هذه الحالة بقلة الصفيحات المناعية الذاتية الولادية *neonatal autoimmune thrombocytopenia*. وكذلك تصادف قلة الصفيحات المناعية في بعض الأمراض المناعية مثل الذئبة الحمامية الجهازية (SLE).

أما الفرورية التالية لنقل الدم فتعد مثالا عن قلة الصفيحات سوية المناعة **Isoimmune**.

وقد يرتبط نقص عمر الصفيحات باستنزاف الصفيحات، كما في التخثر الوعائي المنتشر وفرورية قلة الصفيحات الخثارية، وبعض الإصابات الحمجية، مثل التيفوس والتخثر الدموي بالسحائيات.

ومن المسببات الأخرى لقلة الصفيحات نذكر أيضا فرط نشاط الطحال وكذلك النزوف الشديدة، ونقل الدم المتكرر.

فرورية قلة الصفيحات الغامضة **Idiopathic thrombocytopenia) (ITP purpura**

تعرف قلة الصفيحات الغامضة بانخفاض تعداد الصفيحات مجهول السبب وكذلك بقلة الصفيحات المناعي. فقد بات معروفا اليوم أن فرورية قلة الصفيحات الغامضة مرتبطة بازدياد تخرب الصفيحات بواسطة أضداد ذاتية موجهة نحو البروتينات السكرية الرئيسية لغشاء الصفيحات، وخاصة النمط IIb/IIIa لدى نحو 80% من المرضى.

يصادف الشكل الحاد من فرورية قلة الصفيحات الغامضة لدى الأطفال من كلا الجنسين، حيث تبلغ نسبة الإصابة نحو 25% لدى مرضى لا تتجاوز أعمارهم 10

سنوات، وعادة مايشفى هؤلاء المرض بشكل عفوي خلال عدة أيام إلى عدة شهور. أما الكهول فتصادف لديهم الإصابة بالنمط المزمن المرتبط بوجود أضداد ذاتية، ويسجل شفاء نحو 80% من هؤلاء المرضى بتطبيق الستيروئيدات أو استئصال الطحال. يتظاهر المرض بالفرغرية التي تتجلى على شكل نزوف تمشية في بعض مناطق الجلد وخاصة الآليتين والساقين والصدر والرقبة. وتحدث نزوف من الأغشية المخاطية للأنف والفم، إضافة للزف الطمهي الغزير والبيبة الدموية. و فيما يكون الزف الهضمي أقل شيوعا يحدث في حالات نادرة نزيف دماغي قد يكون السبب في الوفاة. وقد تظهر على المريض أعراض فقر الدم عندما يكون الزف شديدا .

أما مخبريا فيسجل إلى جانب انخفاض تعداد الصفائح وجود الأضداد الذاتية الموجهة نحو البروتينات السكرية في أغشية الصفائح . ويرتفع تعداد الكريات البيض أحيانا، وينخفض تركيز الهيموغلوبين عندما يكون الزف شديدا. أما النقي فغالبا مايبدو سويا مع زيادة في تعداد النواءات ونقص الصفائح أو غيابها.

2- كثرة الصفائح thrombocytosis

تعرف كثرة الصفائح بارتفاع تعداد الصفائح عن الحد الأعلى للمعدل الطبيعي أي أكثر من 450 ألف/ملم³ . ويمكن التمييز بين كثرة الصفائح المرتبطة باضطرابات تكاثيرية نقوية مبهمة، وكثرة الصفائح الثانوية. تتضمن الاضطرابات النقوية كثرة الصفائح البدئية وكثرة الحمر الحقيقية وتليف النقي وابيضاض الدم النقوي المزمن. أما كثرة الصفائح الثانوية فتلاحظ إثر النزوف الحادة والكسور العظمية ، والعمليات الجراحية، واستئصال الطحال . وتصادف أيضا في بعض الأمراض الخبيثة، مثل سرطانات الأمعاء وداء هودجكن واللمفومات اللاهودجكينية، وفي الأحماج، مثل الدرن وأحماج الأمعاء المزمنة ، إلى جانب ضمور الطحال وفقر الدم المنجلي، وانحلال الدم المناعي الذاتي، وكذلك إثر تناول بعض الأدوية .

وإلى جانب اضطرابات الأرقاء المتمثلة بالتزف أو زيادة التخثر تترافق كثرة الصفيحات عادة باضطرابات وظيفية كيفية، تتمثل بشذوذات في الشكل وخلق التكس (التجمع) المحرض بالأدرينالين بسبب غياب مستقبلات الأدرينالين عن سطحها. وتعالج كثرة الصفيحات الثانوية بمعالجة السبب . وتهدف معالجة كثرة الصفيحات إلى منع حدوث الخثرات بتطبيق الهيبارين أو مضادات التكس .

ثالثاً: شذوذات الصفيحات الكيفية

يشير مصطلح اعتلال الصفيحات إلى خلل وظائفها مع بقاء تعدادها ضمن الحدود السوية. وتصنف اعتلالات وظائف الصفيحات بحسب المسببات في ثلاث مجموعات وهي:

1- خلل وظائف الصفيحات المكتسب

يعد اعتلال الصفيحات المكتسب من أكثر أنماط اعتلال الصفيحات شيوعاً . ويرتبط اضطراب وظائف الصفيحات بتواجد مواد حاصرة في المصورة الدموية تعمل على تثبيط وظائف الصفيحات كما هو الحال في تلبون الدم *uremia* وفقر الدم الخبيث وأمراض الكبد. ويلاحظ اعتلال الصفيحات المكتسب في العديد من متلازمات التكاثر النقوي مثل كثرة الصفيحات الأساسي *Essential thrombocythemia* والابيضاض النقوي المزمن وكثرة الحمر الحقيقية وتليف النقي وفقر الدم الأرومي الحديدي. ويصادف اعتلال وظائف الصفيحات المكتسب في أمراض البروتينات الشاذة، مثل النقيوم المتعدد وداء ولدنستروم واعتلال الأضداد وحيدة النسيلة الأساسي. كما وتعد بعض أمراض المناعة الذاتية (اعتلالات الكولاجين الوعائي، الأضداد الموجهة نحو الصفيحات، وقلة الصفيحات المناعي ، الذئبة الحمامية الجهازية، الروماتزم) إلى جانب بعض أنماط فقر الدم (نقص الحديد ، عوز الفيتامين B12 وعوز حمض الفوليك) ، من بين الحالات التي تترافق باعتلال وظائف الصفيحات المكتسب. ويسجل اعتلال وظائف الصفيحات في عدد من الحالات

المرضية التي ترافق بازدياد تحطم مولد الليفين (التخثر الوعائي المنتشر ، أمراض الكبد، متلازمات انحلال الليفين البدئية) ،حيث تمتلك منتجات تحطم الليفين (DFPS) وخاصة الشد ف D و E ،التي تمتلك إلفة عالية نحو غشاء الصفائح مسببة بذلك خلل وظائفها.

2-خلل وظائف الصفائح المحرض بالدواء

يسبب تناول عدد كبير من الأدوية أعراض نزفية محرضة بتأثير الدواء على وظيفة الصفائح. ويعد الأسبرين مثالا نموذجيا على تأثير الدواء في وظيفة الصفائح ،حيث يؤدي تناول قرص أو قرصين من الأسبرين إلى زيادة زمن النزف بمقدار الضعف مقارنة بالقيمة السوية . وترتبط معظم آليات تأثير الأدوية في وظيفة الصفائح إما بارتباط الدواء بغشاء الصفائح أو المستقبلات الغشائية ،أو تدخل الدواء في آلية تركيب البروستاغلاندين أو بنتيجة تأثيره في فعالية الفسفودي استيراز.

ومن الأدوية التي تستطيع تغيير غشاء الصفائح نذكر الكلوربرومازين ،الكوكائين ،كسيلو كائين، كسيلوكائين ،البنسلين ، امبيسلين، سيفالوتين (كفلين) والكحول. وبالمقابل يتم تثبيط مسلك اصطناع البروستاغلاندين بوساطة عدد من الأدوية التي تضم إلى جانب الأسبرين كلا من الايبوبروفين والهيدروكورتيزون والسيكلوسبورين (A) .

3- خلل وظائف الصفائح الوراثي

يمكن للشذوذات الوراثية في وظائف الصفائح أن تكون على علاقة بشذوذات بنوية وكيميائية حيوية في الصفائح، ويمكن أن تكون على علاقة باعتلالات النسيج الضامة أو عوامل التخثر كما في اعتلال فون وليبراند von Willebrand,s disease.

ينتمي إلى الاضطرابات الوراثية ذات الصلة بالشذوذات البنيوية والكيميائية الحيوية للصفائح كل من متلازمة برنارد-سولير Bernard-Soulier syndrome ووهن الصفائح في داء كلاترمان Glanzmann,s thrombasthenia .

- وهن الصفائح الوراثي Hereditary thrombasthenia

يعرف هذا المرض أيضا بداء كلاترمان ، وهو اعتلال نرقي وراثي ينتقل كصفة جسدية مقهورة. تتمثل أعراض المرض بتزوف سطحية شديدة أو رعاف أو حتى نزوف من الجهاز الهضمي، وقد تأخذ هذه النزوف شكل أورام دموية تحت الجلد أو مفاصل مدماة لدى بعض المرضى. وتكون أعراض المرض شديدة في سن الطفولة وتميل للاعتدال مع تقدم العمر. ويتظاهر اضطراب وظائف الصفائح بتطاول زمن الترف وخلل في انكماش الجلطة إلى جانب فشل الصفائح بالتكدس بوجود ADP والخثرين والكولاجين والأدرينالين ، ويكون العامل الصفحي الثالث شاذًا. ويبدو أن المرض مرتبط بخلل البروتينات السكرية لسطح الغشاء الصفحي (البروتينات السكرية من النمط II b/IIIa).

- متلازمة برنارد-سولير Bernard-Soulier syndrome: وهو مرض نرقي وراثي شديد ينتقل كصفة جسدية مقهورة يتصف بخلل تكدس الصفائح بسبب غياب المستقبلات الغشائية من النمط IX، V، Ib ، والتي يحل مكانها بروتين سكري غشائي شاذ. وتتميز هذه المتلازمة بوجود صفائح ضخمة إلى جانب انخفاض معتدل في تعداد الصفائح . ولاستطيع هذه الصفائح الارتباط مع عامل ويلبراند الذي يربط بدوره الصفائح بجدار الأوعية الدموية . ويتظاهر المرض سريريا ببقع نزفية كدمية، والرعاف، والنمشات، إلى جانب غزارة الطمث. أما الموجودات المخبرية فتتمثل بتطاول ملحوظ في زمن الترف، ويكون تكدس الصفائح سويًا بوجود ADP وكذلك بوجود الخثرين، بينما يكون شاذًا بوجود الريستوسين ومولد الليفين البقري .

وينتمي إلى اضطراب وظائف الصفائح الوراثي اعتلالات الحبيبات المختزنة، مثل ندرة الحبيبات ألفا ومتلازمة الصفائح السنحائية Gray platelet syndrome . وينتمي إلى هذه المجموعة اعتلالات الحبيبات الكثيفة، وهي اعتلالات وظيفية وراثية ثانوية أكثر شيوعاً عادة من الشذوذات الوراثية الأولية، وتشاهد مرافقة لأمراض أخرى مثل متلازمة ويسكوت-الدريخ. Wiscot-Aldrich syndrome، ومتلازمة هرمانسكي-بودلاك Hermansky-Pudlak syndrome، ومتلازمة شدياق-هيفاشي Chediak-Higashi syndrome. وتتمثل الموجودات المخبرية في اعتلالات الحبيبات الكثيفة بتطاول زمن الترف وانخفاض التجمع الأولي والثانوي بوجود ADP . ويكون حمض الآراشيدونيك سوياً أو منخفضاً إلى جانب انخفاض الكولاجين. وينتمي إلى اضطرابات التكس الثانوية مرض نادر يعرف باعتلال شبيه -الإسبيرين الوراثي hereditary aspirin-like defects . ويعرف هذا المرض بعوز مثبط الأكسيجيناز الحلقي cyclo-oxygenase inhibitor أو عوز الترمبو كسان. . وتشبه أعراضه السريرية مثيلاتها المشاهدة في اعتلالات وظائف الصفائح الأخرى ولكن بصورة ملطفة. أما الموجودات المخبرية فتتمثل بتطاول زمن الترف وانخفاض التجمع الأولي والثانوي المحرض بالأينيفرين و ADP ، إلى جانب انخفاض الكولاجين.



الفصل الثالث

الأمراض النزفية المرتبطة باعتلال عوامل تخثر الدم

تكون مختلف الأمراض النزفية المرتبطة باعتلال عوامل تخثر الدم على علاقة بأحد المسببات التالية:

- شذوذ الاصطناع
- التحطم و/أو الاستهلاك المفرط
- التشبيط المرضي

أولاً- الأمراض النزفية المرتبطة بخلل اصطناع عوامل التخثر وتصنف إلى أمراض مكتسبة، وأخرى خلقية (وراثية).

1- الأمراض المكتسبة

ويأتي على رأسها نقص عوامل التخثر المسبب بعوز الفيتامين K، وأمراض الكبد الوخيم أ-عوز الفيتامين K

يعد عوز الفيتامين K من أكثر مسببات خلل اصطناع عوامل تخثر الدم والأمراض النزفية المكتسبة شيوعاً.

فالفيتامين K عامل ضروري لاصطناع العديد من عوامل التخثر في الكبد، وخاصة عوامل مجموعة طليعة الخثرين (الثاني والسابع والعاشر والتاسع)، فهويقوم بتشكيله المرجع بدور ثميم في مرحلة ما بعد الترجمة لتشكيل جذور γ -كربوكسي غلوتاميل الضرورية لربط أيونات الكالسيوم في بروتينات التخثر المشار إليها. ولذلك فإن مختلف مسببات عوز الفيتامين K (العوز الغذائي، ومتلازمات سوء الامتصاص، وغياب البكتريا المعوية وتناول مضادات الفيتامين K)، سوف تفضي إلى أمراض نزفية على علاقة بنقص العوامل المذكورة أعلاه، تعالج مثل هذه الاضطرابات باعطاء الفيتامين K.

ب - أمراض الكبد الوخيمة

نظرا لكون الكبد عضو رئيس في اصطناع عوامل تخثر الدم فيمكن لأضرار الكبد الوخيمة أن تتسبب في أمراض نزفية مكتسبة على علاقة بنقص واحد أو أكثر من عوامل التخثر . ويعد نقص مستوى مولد الليفين في المصل من أكثر الاضطرابات المرافقة لأمراض الكبد الوخيمة شيوعا . وتترافق هذه الأمراض بتناول ملحوظ في زمن البروترومين ، فيما يكون زمن تفعيل الترموبلاستين الجزئي (APTTs) متبدلا.

2- الأمراض الوراثية

بخلاف الأمراض المكتسبة التي تشمل الاضطرابات فيها عدة عوامل تخثر، يقتصر الخلل في الأمراض الوراثية على عامل واحد فقط. ويعد كلا من الناعور Hemophilia وداء فون ويلبراند von Willebrand,s disease من أكثر الأمراض النزفية الوراثية شيوعا.

أ - الناعور Hemophilia

يعد الناعور من أكثر الأمراض النزفية الوراثية التي تصيب الذكور خطورة . وهو ينجم في 85% من الحالات عن عوز العامل الثامن (VIII) ويعرف بالناعور المدرسي أو Hemophilia A، ويحدث بمعدل إصابة واحدة من بين 10000 ذكر في الولايات المتحدة. وفي 15% من الحالات يحدث النرف بنتيجة عوز العامل التاسع، وهو ما يعرف بالناعور B، أو داء كريسماس Christmas Disease ويحدث بمعدل إصابة واحدة من بين 30000 ذكر.

وفي كلا الحالتين ينتقل المرض وراثيا كصفة متنحية (صاغرة) تحملها الجينات المتمركزة على الصبغي الجنسي ، (X) لذلك يصاب الذكور فقط دون الإناث بالمرض ، الأمر المرتبط بكون واحدا من الصبغيات الانثوية المتماثلة (XX) يحمل على الأقل المورثات السليمة والتي يمكن أن تعوض الخلل في المورثات المصابة . وبناء عليه فإن بنات المصاب بالناعور كافة حاملات للمرض، ولا ينقل المصاب بالناعور

المرض إلى أبنائه الذكور . أما لدى الإناث الحاملات للمرض فإن احتمال إصابة الجنين الذكر هو 50%، وكذلك الأمر فاحتمال كون الجنين الأنثى حاملا للمرض هو أيضا 50% .

ترتبط الامراضية في الناعور المدرسي بعوز المكون ذي الوزن الجزيئي الصغير من العامل الثامن (23000 دالتون) ، وقد أثبتت الدراسات المناعية أن هذا البروتين يتم اصطناعه لدى المرضى ، لكنه غير فعال وظيفيا.

وتتعلق شدة الأعراض الترفية بدرجة النقص في العامل الثامن ، والتي تحددهمستواه في المصورة الدموية . فلاممكن ملاحظة الأعراض الترفية إلا إذا هبط مستوى العامل الثامن إلى مادون 50-25% من مستواه السوي في المصورة، حيث يمكن عندها ملاحظة الميل للزف إثر العمليات الجراحية الكبرى والحوادث الخطرة. أما الزف الشديد بعد العمليات الجراحية الصغيرة مثل قلع الأسنان واستئصال اللوزتين، فيترافق بمبوط مستوى العامل الثامن إلى نحو 25-5% من مستواه السوي .وعندما يكون مستوى العامل الثامن نحو 5-1% ، تلاحظ الزوف الشديدة إثر الإصابات الخفيفة ، فيما تلاحظ الزوف الشديدة إثر الرضوض الخفيفة، وكذلك الزوف العفوية والمفصلية، وداخل العضلات عندما يخفض العامل الثامن من المصورة أو يكاد (0-1% من مستواه الطبيعي) .

يكتشف الناعور صدفة بعد عدة أشهر من الولادة عندما يخضع الطفل للختان مثلا، أو عندما يبدأ الطفل بالمشي، ويتعلق مكان حدوث الزف بحركة الطفل ونشاطه . وفي الحالات الشديدة يحدث نزف عقوي مؤلم داخل المفاصل التي يأتي في مقدمتها مفصل الركبة. ويؤدي الزف إلى تشوه المفاصل إذ لم تعالج بشكل فوري. ويطال الزف العضلات وخاصة عضلات الظهر والأرداف، الأمر الذي يتحلى بعوارض انضغاط الأعصاب والأوعية الدموية. ولا يعد الزف من الأنف والجهاز الهضمي شائعا ، فيما يمكن للزف داخل القحف الحدوث إثر رضوض الرأس. أما الزوف التالية

للعمليات الجراحية فلا تلاحظ فقط لدى مرضى الإصابات الشديدة بل وأيضا لدى المصابين بدرجات خفيفة منه.

ويعتمد تشخيص المرض على القصة العائلية، وتحديد مستوى العامل الثامن في المصورة الدموية . فلدى وجود القصة العائلية يتوجب إجراء الفحوصات الدموية للطفل الوليد في غضون 4-8 أسابيع بعد الولادة. أما الأشكال الخفية فتحتاج إلى فحوص دقيقة لتشخيصها ، منها زمن تخثر الترمبوبلاستين الجزئي المنشط بلكاولين ومعايرة العامل الثامن.

وحالما يشخص المرض يوضع المريض أو والديه في صورة المشاكلات التي سيواجهها، وخاصة الانصباب المفصلي والعضلي ، ووجوب تلقي العلاج لتفادي التشوهات . ويزود المريض ببطاقة تعرف ببطاقة الناعور تدون فيها المعلومات الضرورية كافة للتعرف على حالته المرضية وتسهل تقديم العلاج الإسعافي للمريض. أما التدابير المتبعة للسيطرة على النزف عند المرضى فتتمثل بإعطاء المصورة البلازجة المجمدة والمصورة الغنية بالعامل الثامن وتعرف أيضا بالمصورة القريبة Cryoprecipitate وهي الجزء المبرد وغير المنحل من بروتينات المصورة الذي يتم الحصول عليه بتذويب المصورة المجمدة ببطيء في درجة 4 مئوية.

أما المعالجة الوحيدة الفعالة لإيقاف النزف الشديد والمديد لدى مرضى الناعور المدرسي، فهو حقن العامل الثامن البشري المخفف والمجمد والمركز. أما العوامل المضادة للناعور المستخلصة من دم الحيوانات كالخنازير والجواميس فلا يمكن استخدامها في حال عدم توفر العامل البشري وعند الضرورة القصوى ولمرة واحدة فقط نظرا لكونها مولدة للضد .

أما داء كريسماس فلا يمكن تمييزه سريريا عن الناعور المدرسي ، وخاصة أن المصابين بنقص شديد في العامل الثامن يعانون أيضا من انصبابات دموية مفصلية وعضلية كما هو الحال لدى مرضى الناعور المدرسي. وتتبع في علاج المرض تدابير مشابهة لتلك

المطبقة في علاج الناعور المدرسي، وخاصة لجهة نقل المصورة الطازجة والبروتينات المركزة الغنية بالعامل التاسع.

ب- داء فون ويلبراند (vWD) von Willebrand's disease

داء فون ويلبراند تم وصفه لأول مرة من قبل Erik von Willebrand في عام 1926 كمرض نرفي وراثي يتصف بتطاول زمن النزف، وبترافق بانخفاض مستوى العامل الثامن. وفي مطلع الخمسينات من القرن العشرين تم التعرف على مختلف مكونات معقد العامل الثامن- فون ويلبراند (الجدول 8)، وتم تمييز هذا الداء عن الناعور المدرسي المسبب بعوز العامل الثامن VIIIc، وتبين أنه مرتبط بخلل يصيب المورثة المسؤولة عن تركيب عامل ويلبراند في الصبغي 12.

المصطلح	الوصف
VIII:c	طليعة العامل الثامن
VIII:cAg	مضاد العامل الثامن
VwF: Ag	مضاد عامل فون ويلبراند
Ristocetin cofactor (تقييم الريبستوسيتين)	يؤمن لعامل فون ويلبراند تحفيز تكديس الصفائح بوجود المضاد الحيوي الريبستوسين
معقد العامل VIII-VwF	الشكل الذي يتواجد فيه معقد العامل الثامن مع عامل ويلبراند في المصورة

الجدول 8-1: مصطلحات مكونات معقد العامل الثامن وعامل فون ويلبراند

يتصف داء فون ويلبراند بتطاؤل زمن الترف الذي يترافق باضطراب وظيفة الصفائح واخلل في تركيب عامل فون ويلبراند وانخفاض في مستوى العامل الثامن أحيانا. مع الإشارة إلى أن عامل فون ويلبراند يكون طبيعيا لدى الأشخاص الأسوياء وكذلك لدى مرضى الناعور.

ويتم اصطناع معظم عامل ويلبراند الجائل في المصورة الدموية ضمن الخلايا البطانية الوعائية بالإضافة إلى اصطناع قسم ضئيل يقارب مانسبته 15% من قبل النواءات. ويتواجد عامل فون ويلبراند في كل من المصورة والصفائح وأسفل البطانة الوعائية. يختزن عامل ويلبراند ضمن الحبيبات ألفا في الصفائح الدموية، ويحرر من هذه الحبيبات لدى ارتباط عدد من المركبات مع الروتينات السكرية IIb-IIIa .

وترتبط الأمراض في هذا الداء بالشذوذات الكمية والكيفية التي تطال عامل فون ويلبراند، الأمر الذي يتجلى بانخفاض فعالية العامل الثامن وانخفاض مستوى عامل فون ويلبراند.

وبعد عامل فون ويلبراند ضروريا من أجل تكون الخثرات ، حيث يتوسط عملية التصاق الصفائح بجدار الأوعية الدموية من خلال ارتباطه بالمستقبلات النوعية على سطحها والمتمثلة بالروتين السكري I b والروتين والسكري IIb-IIIa .

ولقد تم حاليا تمييز أكثر من 20 حالة مختلفة من الناحيتين السرية والمخبرية صنفتم جميعا في ثلاثة أنماط وراثية رئيسية، وهي: النمط I ،النمط II والنمط III ، بالإضافة إلى داء فون ويلبراند المكتسب وداء فون ويلبراند الكاذب أو الصفحي. ويبين (الجدول 2-8) العلامات السريرية لمختلف أنماط داء فون ويلبراند فيما يظهر (الجدول 3-8) أهم خصائص الأنماط الرئيسية لهذا الداء .

النمط	زمن النزف	غزارة النزف	النمشات	النزف المفصلي
I	طبيعي أو متطاوّل	معتدلة	غائبة	نادر
II	متطاوّل	متوسطة	غائبة عادة	نادر
III	متطاوّل	شديدة	أحيانا	ظاهر

الجدول 2-8: العلاما السريرية لمختلف أنماط داء فون ويلبراند

المؤشر	النمط I	النمط IIA	النمط IIB	النمط الصفحي	النمط IIc	النمط III
عدد الصفائح	طبيعي	طبيعي	طبيعي أو منخفض	منخفض	طبيعي	طبيعي
زمن النزف	متطاوّل أو طبيعي	متطاوّل	متطاوّل	متطاوّل	متطاوّل	متطاوّل
العامل VIII:c	طبيعي أو منخفض	طبيعي أو منخفض	طبيعي أو منخفض	طبيعي أو منخفض	طبيعي	طبيعي
VwF: Ag	منخفض	طبيعي أو منخفض	طبيعي أو منخفض	طبيعي أو منخفض	طبيعي	
ثيم الريستوسين	منخفض	منخفض	طبيعي أو منخفض	طبيعي أو منخفض		
تكس الصفائح الخرس بالريستوسين	طبيعي أو منخفض	منخفض أو مفقود	مرتفع	مرتفع	منخفض	مفقود

الجدول 2-7: خصائص مختلف أنماط داء فون ويلبراند

وتجدر الإشارة إلى أن النمط I يعد من أكثر أنماط داء فون ويلبراند المرتبطة بشذوذات كمية انتشارا . كما ويشبه النمط III النمط I في كونه مرتبطا أيضا بشذوذ كمي إلا أنه أشد خطورة من النمط III نظرا لكونه متماثل للواقع . أما النمط II K فينتهي إلى الاعتلالات الكيفية المتمثلة بخلل في بنية عامل فون ويلبراند بينما يكون تركيزه في المصورة طبيعي أو منخفض قليلا .

أما داء فون ويلبراند المكتسب فيظهر كعرض مرافق لعدد من الأمراض التكاثريّة للمفاوية وأمراض المناعة الذاتية (مثل الذئبة الحمامية) ، ويمكن لاختلال عامل ويلبراند أن يرافق الأمراض التكاثريّة النقية . وقد يحدث أيضا داء فون ويلبراند المكتسب بسبب أدمصاص مكونات التخثر على سطوح الخلايا الشاذة .

وعادة ما تكون الأعراض النزفية أكثر شدة في النمط المكتسب ، و يعتبرنزف الأغشية المخاطية العرض الأكثر شيوعا .

ويعد داء فون ويلبراند الكاذب من الأمراض النادرة التي تتصف بغياب أو انخفاض مستوى المكون الكبير من عامل فون ويلبراند في المصورة الدموية . ويتميز مرضى هذا الداء بوجود صفيحات شاذة ترتص بشكل عفوي . ويرتبط انخفاض مستوى المكون الكبير من عامل فون ويلبراند بازدياد استهلاكه (نفاذه) أثناء عملية التجمع الصفيفي .

ج-اضطرابات وراثية أخرى

يمكن أن تحدث الاضطرابات النزفية بنتيجة النقص الوراثي لعدة عوامل أخرى ، وهي :

- نقص مولد الليفين: وهو مرض وراثي نادر يصيب الجنسين ويرتبط بوجود

أشكال شاذة من مولد الليفين . و يترافق هذا المرض بالنزف لدى بعض المرضى

، ويتصف بتطاؤل زمن الكالسيوم الخثرين ، وزمن البرونرمبين والPTTK

- نقص العامل الثالث عشر: وهو مرض وراثي يورث كصفة جسدية متنحية .

وبسبب عوز هذا العامل فإن الجلطة الدموية لا تنكمش وتبقى خيوط الليفين

فيها هشّة سريعة التحطم . ويتظاهر المرض يزوف شديدة تالية للرض وتأخر الشام الجروح ، كما ويعد الترف داخل القحف أمرا شائعا في هذا المرض.

- **نقص العامل الحادي عشر:** مرض ولادي يصيب الجنسين ويورث كصفة جسمية متنحية. يتظاهر المرض بالتلف الذي نادرا مايكون شديدا وخاصة عقب العمليات الجراحية. ويشخص المرض بتحري تركيز العامل الحادي عشر في المصورة.

- **العامل الثاني عشر(عامل هايغمان):** مرض وراثي يصيب كلا الجنسين، وينقل كصفة جسمية متنحية ، ويتصف المرض بتطاول زمن تشكل الجلطة(1-2 ساعة) . ونادرا مايصاب المرضى من نزوف شديدة .

- **نقص العامل الخامس:** وهو من الأمراض الوراثية النادرة التي تصيب كلا الجنسين وتورث كصفة جسمية متنحية. يتحلى المرض بتلف بسيط على شكل رعاف، وكدمات، ونزوف طمئية. ويتصف المرض بتطاول زمن البروثرومين وزمن PTTK، فيما يبقى زمن الكالسيوم ترومين سويا، ويعالج المرض بنقل المصورة الطازجة.

- **نقص العوامل الثاني والسابع والعاشر:** أن النقص الوراثي لأي من هذه العوامل التي تصيب الجنسين وتنتقل كصفة جسمية متنحية نادر عموما. ويتظاهر عوز هذه العوامل بالنزوف الخفيفة . وبخلاف الأمراض المكتسبة فإن علاج هذه الأمراض لا يستجيب للفييتامين K ، بل بنقل المصورة الطازجة أو المشتقات الغنية بهذه العوامل.

ثانيا : الاضطرابات الرفوية ذات العلاقة بتحطم و/أو استهلاك عوامل التخثر
يمكن لعوامل التخثر أن تتحطم في الزجاج *in vivo* بواسطة أزميات الهيدرولاز وهي الآلية التي تؤثر من خلالها سموم الأفاعي ، أو بواسطة التنشيط المرضي لعملية

التخثر مع تحلل متزايد لعوامل التخثر، كما هو لدى تنشيط عملية التخثر بواسطة مواد شبيهة بالترموبلاستين النسيجية .

وفي الجسم الحي يلاحظ انحلال واستهلاك عوامل التخثر في الكثير من الحالات المرضية مثل مضاعفات عمليات التوليد والرضح والحروق ، إضافة إلى جراحات البروستات والكبد والخباثات المتقدمة ، وكذلك إنتانات الدم والانحلال داخل الأوعية . ويعد انحلال الليفين fibrinolysis من أكثر هذه الاضطرابات شيوعا ، وقد تم توصيفه في مجموعتين اثنتين هما: انحلال الليفين الأولي primary fibrinolysis وانحلال مولد الليفين الثانوي secondary fibrinolysis.

1- انحلال الليفين الأولي

حالة نادرة من انحلال الليفين التي تحدث دون تنشيط آلية التخثر ، ولدى ارتفاع تركيز منشطات مولد البلاستين الداخلية كنتيجة للرضح أو الجراحة أو الخباثات. ويعد عدم حصول ترسب الليفين إحدى أهم خصائص انحلال مولد الليفين الأولي.

2- انحلال الليفين الثانوي

يحدث انحلال الليفين كنتيجة لتنشيط آلية تخثر الدم ، وتشكل خثرات متعددة تؤدي إلى استهلاك عوامل التخثر ، وتحلل ثانوي لليفين. وتعرف الحالة النمطية لانحلال الليفين الثانوي بالتخثر المنتشر داخل الأوعية Disseminated intravascular coagulation(DIC) . وتنجم هذه الحالة عادة عن عوامل معرضة للتخثر بشكل مباشر (صمات ، سائل أمينيوسي، سم الأفعى) أو بشكل غير مباشر (وجود كميات كبيرة من النسيج الميتة أو المصابة بالرضح والتي تطلق الترموبلاستين النسيجي إلى الدم) ، الأمر الذي يتسبب بتكون خثرات متعددة تغلق قسما كبيرا من الأوعية الدموية المحيطية الصغيرة. وبترافق إطلاق آلية التخثر يتحول مولد الليفين ، الذي ينخفض تركيزه في المصورة ، إلى ليفين موحود

يترسب في الأوعية الدموية الصغيرة محرضاً تحلل الليفين الثانوي. ويؤدي تحلل الليفين الثانوي إلى زيادة تركيز منتجات تفكك الليفين (FDPS) والتي ترتبط مع الليفين مما يعزز الآليات المضادة للتخثر.

وبعد التعرف صفة مميزة لمرضى التخثر المنتشر داخل الأوعية، وذلك بسبب انصبوب عوامل التخثر، ونقص الصفائح التي تنكس وترسب في الأوعية الصغيرة، إضافة إلى تأثير نواتج تفكك الليفين.

تتمثل الموجودات المخبرية التي تفيد في تشخيص التخثر المنتشر داخل الأوعية لدى المريض النازف بتطاول زمن البروترومين وزمن الثرومين-كلسيوم وزمن PTTK إلى جانب ارتفاع تركيز منتجات تحطم الليفين ونقص عدد الصفائح. وقد يترافق المرض بفقر دم انحلاي في بعض الحالات التي تحتجز فيها الكريات في شبكة الليفين، مما يؤدي إلى تأذيها وتجزؤها.

ويهدف الكشف عن الاضطرابات الترفية والعوز الشديد في عوامل التخثر بحرى العديد من الاختبارات، منها تحديد زمن الترف الذي يتراوح بين دقيقة واحدة و 6 دقائق في الحالة السوية. ويزداد زمن الترف لدى نقص الصفائح الدموية وفي أمراض الكبد الشديدة والقصور الكلوي، والذئبة الحمامية، إضافة إلى بعض الحالات المترافقة بخلل بروتينات الدم.

أما زمن التخثر (التحلط) فيتراوح بين 9 و 10 دقائق، ويرتفع بشكل ملحوظ في الناعور ولدى عوز أي من العوامل المساهمة في تشكل منشط الخثرين وفق السبيل الداخلي. وتفيد دراسة انكماش الجلطة ووصف حالتها في التعرف على بعض الاضطرابات، فالانكماش المرضي يلاحظ لدى عوز مولد الليفين وقلة الصفائح وكذلك الناعور وخلل بروتينات المصورة.



الباب التاسع

نقل الدم

يعد نقل الدم ومشتقاته إجراء شائعاً في كافة مشافي العالم وقد يحتاجه أي منا في أي وقت من الأوقات. فالإصابة بمرض أو التعرض لحادث عرضي، قد يترافق بفقدان كمية كبيرة من الدم، وهو أمر يمكن توقعه في مجرى الحياة العادي أو أثناء السفر. وفي مثل هذه الحالات يعد نقل الدم المأمون بالرغم من بعض المضاعفات، أهم العلاجات الداعمة والضرورية لإنقاذ حياة الشخص.



الفصل لأول الزمر الدموية ونقل الدم ومشتقاته

أولاً: الزمر الدموية

يملك الدم خواصاً مستضدية ومناعية تختلف من شخص لأخر، ويرتبط ذلك بوجود المستضدات على أغشية الكريات الحمر والأضداد في المصورة، الأمر الذي يسبب تفاعلاً مناعياً لدى نقل الدم العشوائي يفضي إلى انحلال الكريات الحمر. ولقد تبين أن غشاء الكرية الحمراء لدى الإنسان يتضمن قرابة 400 مستضد (محدد مستضدي). ويطلق اصطلاح الزمرة الدموية على النمط الظاهري لأية مجموعة محددة جيداً من المستضدات والتي تخضع لسيطرة عدد من المورثات. ويعرف لدى الإنسان قرابة 20 مجموعة من الزمرة الدموية تضم إضافة إلى المجموعتين A.B.O و Rh مجموعات لويس Le و P و I و MSN، ومجموعات كيد، وكيل، ودافي، ولوثران. ولحسن الحظ لا تمتلك معظم هذه المستضدات المحددة لزمر هذه المجموعات (باستثناء المجموعتين A.B.O و Rh) قدرة كبيرة على توليد الرصاصات وبالتالي إحداث تراسل للكريات وانحلالها في الحالات السوية. ويبقى لدى الإنسان مجموعتان من المستضدات، تمتلكان خواصاً مولدة للضد يؤخذ بها خلال عمليات نقل الدم، وهما مجموعة A.B.O. ومجموعة عامل الريزوس Rh.

1- المجموعة A.B.O

لقد قسمت لكريات الحمر في المجموعة A.B.O بحسب طبيعة مولدة الارتصاص (المستضد) الموجودة في أغشية هذه الكريات إلى أربعة زمر وهي: A و B و AB و O. وتتصف الزمر A و B و AB بوجود المستضدات A و B و AB في أغشية الكريات وعدم وجود الرصاصات (الأضداد) a و b و ab على التوالي في المصورة، فيما تتصف الزمرة O باحتواء المصورة على الرصاصات a و b و ab ونحو أغشية الكريات الحمر من المستضدات

A وB (الجدول 1-9) .

النمط المورثي	الراصات في المصورة	مولدة الارتصاص على سطح الكرية	الزمرة الدموية
AA.AO	b	A	A
BB.BO	a	B	B
AB	لا يوجد	AB	AB
O	a.b	لا يوجد	O

الجدول 1-9: مولدات الارتصاص والراصات والنمط المورثي لزمرة المجموعة ABO

وهكذا تحدد الزمر الدموية بالنمط المورثي للشخص ، حيث توجد ستة تراكيب محتملة للمورثات ينتج عنها أربعة أنماط من الزمر الدموية. وتعتبر معرفة الأنماط المورثية أمراً مفيداً في استنباط الزمرة الدموية المحتملة للذرية انطلاقاً من معرفة النمط المورثي لدى الأب ولدى الأم. وتستخدم هذه المعرفة لحسم الجدل الذي يمكن أن يتعلق بأبوة الطفل.

ويختلف تواتر وانتشار زمر المجموعة ABO لدى سكان الكرة الأرضية باختلاف المجموعات العرقية (الجدول 2-9).

العرق	A	B	AB	O
الأوروبيين	40	8	2	50
العرب	27	20	4	49
الآسيويين	21	28	7	44
الأفارقة الشرقيين	26	19	4	51

الجدول 2-9: توزيع الزمر الدموية لدى مختلف القوميات %

وتجدر الإشارة إلى أن الرصاصات الدموية لا تكون موجودة بعد الولادة، ويتم تشكيلها من قبل الخلايا المولدة للضد ما بين الشهر الثاني والشهر الثامن بعد الولادة.

2- المجموعة Rh

تتصف المجموعة Rh بوجود عدة مستضدات في أغشية الكريات الحمر أكثرها أهمية المستضد D ، ويوصف الأشخاص الذين تتضمن أغشية كرياتهم الحمر المستضد D بإيجابية الريزوس، فيما لا يمتلك الأشخاص سلبيو الريزوس هذا المستضد. وتبلغ نسبة إيجابية الريزوس من العرق البشري الأبيض 85% و 92% من العرق البشري الأسود فيما تبلغ 100% لدى البشر من العرق الأصفر.

ويرتبط وجود مولدات الارتصاص بمورثة سائدة يرمز لها بالحرف R ويرمز للمورثة المتنحية ب r . ولذلك يكون النمط المورثي للأفراد سلبيو الريزوس متماثل اللواقح للمورثة المتنحية rr ، في حين يكون النمط المورثي لموجبي الريزوس إما Rr لمتخالفي اللواقح أو RR لمتماثلي اللواقح.

ويعود الاختلاف بين المجموعتين A.B.O و Rh إلى أن الرصاصات الخاصة بالمجموعة A.B.O تتشكل بعد الولادة، أما الرصاصات الخاصة بالمجموعة Rh فلا تتشكل إلا بعد التماس الأول لدم شخص سالب الريزوس مع كريات دم موجبة الريزوس.

ثانياً: تحديد الزمر الدموية

يهدف نقل الدم إلى المريض بأمان، يعتمد على تحديد زمرة الدم، والتحقق من توافقها مع الزمرة الدموية للشخص المعطي .

ويتم تحديد الزمر الدموية للشخص بمزج قطرة من دمه بمحلول تحوي الرصاصات a أو b أو مضادات الريزوس وتعيين المصل الذي يحدث فيه الارتصاص من عدمه.

وتجدر الإشارة إلى أن صعوبة تحديد الزمرة A أحياناً مرتبط بوجود أنماط فرعية لهذه الزمرة (A1.A2.A3.AX.AM). وتكون مولدات الارتصاص A3.AX.AM ضعيفة

وبطبيعة التفاعل مع الراصة a، الأمر الذي يفضي إلى تقييم كاذب للزمرة الدموية، كأن تعتبر زمرة الشخص من النمط B وهي في الواقع من النمط A3B أو AXB. ويلخص (الجدول 3-9) مختلف احتمالات نقل الدم، حيث يعد الأشخاص ذوي الزمرة O بمثابة معطين عامين لكون كرياتهم لا تحتوي على مولدات ارتصاص، ولكون المصورة التي تحتوي الراصات a و b يتم تمديدها بمصورة المتلقي دون أن تسبب خطراً كبيراً على كريات له لدى نقل كميات معتدلة من الدم. كما ويعتبر حاملي الزمرة AB متلقين عامين بسبب غياب الراصات a و b من المصورة لديهم. ولفرض الإقلال من أخطاء نقل الدم الناجمة عن عدم اختيار المصل المناسب أو التقييم الكاذب للزمر الدموية، أو في حالات نادرة من عدم التوافق في مجموعات دموية أخرى فإنه يعتمد إلى إجراء الاختبار البيولوجي التصالي. ويتمثل هذا الاختبار بمزج كريات المعطي مع مصل المتلقي، وفي حال عدم حصول ارتصاص، تميزج كريات المتلقي مع مصل المعطي، حيث يتم نقل الدم في حال كون نتائج الاختبار الثاني سلبية.

الزمرة الدموية للمعطي والمتلقي	AB	A	B	O
AB	-	-	-	-
A	+	-	+	-
B	+	+	-	-
O	+	+	+	-

الجدول 3-3: إمكانية تراص الكريات لدى نقل الدم

ثالثاً: نقل الدم والمشتقات الدموية

1- التبرع بالدم

يجمع الدم من الأشخاص الأصحاء والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 سنة ولا يقل وزهم عن 50 كغ.

وقبل جمع الدم يجب أن يخضع المتبرعين إلى كشف طبي وفحوص مخبرية للتأكد من سلامتهم وقدرتهم على التبرع وبما يكفل استبعاد كافة المتبرعين الخطيرين. وتضم قائمة المتبرعين الخطيرين الأشخاص ذوي السلوكيات المحفوفة بخطر مرتفع مثل تعاطي المخدرات وتعدد القراء الجنسيين والشاذين جنساً، إضافة إلى الأشخاص المصابون بأمراض تناسلية قرحية والمعرضين للوشم أو الختان بأدوات غير معقمة.

ويصنف المتبرعين بالدم في مختلف الأنظمة السائدة في العالم ضمن أربع مجموعات رئيسة لكل منها محاسنها ومساوئها. تضم المجموعة الأولى المتبرعين لأحد أفراد العائلة، فيما تضم المجموعة الثانية المتبرعين مقابل أجر مادي وتتألف المجموعة الثالثة من المتبرعون بمحض إرادتهم بدافع الواجب الإنساني أما المجموعة الرابعة فتضم المتبرعون من أجل نقل الدم الذاتي.

وعموماً يعرف المتبرع المثالي بأنه الشخص الذي يتبرع بدمه مرتين في السنة دون أن يتقاضى مقابل وبدافع التكافل الاجتماعي ومساعدة الآخرين، وأن يكون مستعداً للتوقف عن التبرع بالدم لدى وجود أي خطر على الشخص المتلقي.

ويستطيع الفرد التبرع بوحدة دم واحدة، مرة واحدة كل ثلاثة أشهر. ولا يشكل ذلك أي خطر على صحة المتبرعين نظراً لمقدرة الجسم تعويض هذا الحجم خلال يوم واحد.

تتضمن وحدة الدم قرابة 450 مل من الدم المجموع في كيس من البلاستيك يحتوي على 68 مل من محلول مضاد للتخثر. ويتكون المحلول المضاد للتخثر من الحمض

والستيرات والدكستروز (ACD) أو من السيرات - الفسفات - الدكستروز (CPD) أو من الهيبارين

2- حفظ الدم

يخزن الدم في البراد ويجب أن يستخدم ضمن مدة لا تزيد عن ثلاثة أسابيع عندما يكون بمجموع مع ACD و CPD ، أما الدم المجموع مع الهيبارين وبدون مادة حافظة فيجب أن ينقل خلال 24 ساعة.

ويؤدي خزن الدم إلى تخرب الكريات الحمر بنسبة تصل إلى 1% في اليوم ، وهذا يعني أن نسبة الكريات الحمر المتبقية على قيد الحياة بعد ثلاثة أسابيع من الحفظ تقارب 70%. أما الكريات البيض والصفائح فتتخرب تماما بعد هذه الفترة من الخزن. فالكريات الحبية تتخرب في الدم المحفوظ وتنخفض مقدرتها البلعية إلى الثلث بعد يوما واحدا من الحفظ. أما اللبافويات فتعيش لفترة أطول ويمكن الكشف عن بعضها بعد ثلاثة أسابيع، فيما تصل نسبة الصفائح إلى 45% بعد ثلاثة أيام من الحفظ.

كما وتعرض مكونات المصورة أثناء حفظ الدم لتبدلات ملحوظة، فإلى جانب ارتفاع تركيز الأمونيا ، يرتفع تركيز البوتاسيوم ، الأمر الذي قد يفضي إلى متلازمة فرط البوتاسيوم عند نقل الدم بشكل سريع وبكميات كبيرة. أما فعالية عوامل التخثر فتتدهى بشكل ملحوظ ، حيث يتعرض مولد الليفين إلى التمسح بشكل متدرج أثناء التخزين ، وتضطرب فعالية العاملين الخامس والثامن إلى مستوى منخفض جدا وتفقد كل فعالية علاجية بعد 48 ساعة.

3- نقل كامل الدم

يستطب نقل الدم الكامل في الحالات التالية:

- نقص حجم الدم نتيجة النزف الحاد عقب العمليات الجراحية الكبرى أو إثر الحوادث أو أثناء تحضير مريض مصاب بفقر دم شديد لعمل جراحي إسعافي،

إضافة لحالات نقص حجم الدم غير المترافق بانخفاض السعة الأكسجينية (المراحل الأولى من الحروق).

- تبادل الدم عند الوليد المصاب بفقر دم انحلالي بعدم توافق الزمر الدموية أو عوز انزيم الغلوكوز-6- فسفات ديهيدروجيناز.

- بعض الفاقات الدموية الانحلالية مثل فقر الدم المنجلي بهدف رفع مستوى الهيموغلوبين وتثبيت تكون الحمر والإقلال من النوبات الانحلالية، وكذلك في فقر الدم اللاتنسجي وتليف النقي وبعض الابيضاضات.

4-نقل الكريات الحمر المحفوظة

يمكن حفظ الكريات الحمر المفصولة عن الدم بعملية التثبيت لمدة ثلاثة أسابيع . و يقي فصل المصورة المريض من زيادة حمل الدوران ويجنبه الأعباء المضرة لكل من الصوديوم والبوتاسيوم والسيتيرات والأمونيوم وكذلك الرصاصات وبخاصة الراصة a .

ويفضل نقل الكريات المحفوظة على نقل كامل الدم في الحالات التي تتطلب تعويض السعة الأكسجينية ، حيث لافائدة من نقل المصورة، بل قد يكون نقلها مؤذيا إلى الأشخاص ص اللذين لديهم زيادة في حجم الدم.

ويستطب نقل الكريات المحفوظة في فقر الدم اللاتنسجي وفقر الم الانحلالي الوراثي الشديد مثل التلاسيميا وفقر الدم المنجلي وفقر الدم بعوز الغلوكوز-6-فسفات ديهيدروجيناز .

الكريات المحفوظة والمجمدة فيمكن أن تخزن لفترة غير محدودة وتنقل إلى أشخاص يمتلكون كريات من نمط وراثي نادر . كذلك يمكن نقل هذه الكريات أثناء زرع الأعضاء للتقليل لتخفيض التحسس للهلا (HLA) .

5- نقل الصفائح

تحضر كائر الصفائح بتثفيل المصورة الغنية بالصفائح . وتتضمن وحدة الصفائح 50 مل من المصورة التي تحتوي قرابة 50مليار صفيحة . ويمكن للصفائح المحضرة

هذه الطريقة أن تحفظ حية لمدة ثلاثة أيام ،ويقدر نصف عمرها في دم المتلقي قرابة خمسة أيام.

تستخدم الصفائح للسيطرة على حالات النزف في قلة الصفائح المرافقة للنزوف الشديدة . وكذلك في حالات نقص إنتاج الصفائح المسبب بتثبيط إنتاج النقي كما في ابيضاض الدم أو الورم اللمفي أو المعالجة بالأشعة والمواد الكيميائية، إضافة إلى النزف الشديد المهدد للحياة في قلة الصفائح المناعي والنزوف المرافقة لاعتلالات الصفائح الكيفية.

6- نقل ركائز الحبيبات

يستطب نقل الحبيبات في الإصابات الخمجية لمرضى قلة الكريات البيض (مرضى زراعة النقي) . كما وتستخدم كإجراء وقائي لدى مرضى قلة العدلات المسبب بالأدوية أو الأشعة . إلا أن نقل الكريات البيض يترافق بمشاكل مناعية ومجموعة من الأعراض الحدية مثل ضيق التنفس والزرار والسعال والحمى.

7-نقل المصورة الطازجة والمصورة المجمدة

يقصد بالمصورة الطازجة تلك التي يتم الحصول عليها خلال ستة ساعات من التبرع بالدم. أما المصورة الطازجة المجمدة فهي التي يتم الحصول عليها أيضا خلال ستة ساعات من التبرع بالدم والمحافظة في درجة حرارة -30 م . وتتضمن المصورة الطازجة المجمدة ما نسبته 60% و90% و80% من العوامل الثامن والتاسع والحادي عشر على التوالي. ويستطب نقل هذه المصورة في الحالات التالية:

- لدى نقل كمية كبيرة من الدم المحفوظ الذي تنقصه عوامل التخثر وبخاصة الخامس والثامن.
- مختلف اعتلالات التخثر المكتسبة والمرتبطة بأمراض الكبد واستخدام مضادات التخثر الفموية (الوارفارين)

- بعض اعتلالات التخثر الوراثية ،مثل داء فون ويلبراند ونقص العامل الحادي عشر .

8- نقل بروتينات المصورة والألبومين المخفف

ينقل الجزء البروتيني من المصورة على شكل محلول يقدر حجمه بنحو 400مل له نفس حلولية المصورة ويحوي مانسبته 4-5% من البروتين الخالي من عوامل التخثر ويرحل كهربائيا إلى منطقة الألبومين . ويستخدم من أجل تعويض المصورة أثناء الفصادة المصورية ،وكذلك لزيادة حجم المصورة عندما لا يكون هناك حاجة لنقل الكريات الحمر . أما الألبومين المخفف فيختلف عن المشتق السابق بكونه يتضمن كمية أقل من أملاح الصوديوم والبوتاسيوم ، ويستخدم على شكل محلول في الماء المقطر والمعقم في الصدمات المرافقة لفقد الدم وقبل الحصول على الدم والحرق ، وكذلك لتعويض السوائل في الفصادة المصورية.

9- نقل الرسابة القرية

أن مايميز الرسابة الباردة (القرية) غناها بالعامل الثامن (50% من مستواه الأصلي)، واحتوائها على تركيز مرتفع من عامل فون ويلبراند ومولد الليفين، إضافة لإمكانية حفظها لمدة عامين في درجة حرارة -20م . وتستخدم الرسابة القرية في معالجة نزوف الناعور، وداء فون ويلبراند ،والتخثر المنتشر داخل الأوعية.

10- نقل ركائز عوامل التخثر

ركائز عوامل التخثر أقل حجما من الرسابة القرية ، وتتضمن كمية قليلة من مولد الليفين ، كما ويمكن حفظها في درجة حرارة 4 م . ومن أهمها ركيزة العامل الثامن الإنساني والحيواني (البقر والخنزير) التي تستخدم في تدبير الناعور المدرسي . أما ركيزة العامل التاسع فتتضمن إلى جانب العامل التاسع ، ركيزة العوامل الثاني والخامس والعاشر أيضا . وتستخدم هذه الركيزة في داء كريسماس وأمراض الكبد وتصحيح العوز الولادي للعامل الثاني وعوز العامل السابع .

أما مولد الليفين المخفف فهو عبارة عن محلول يتكون من 1.5-2 غرام من مولد الليفين المنحل في 200 مل من الماء المقطر والمعقم . ويستخدم مولد الليفين في حالات عوز مولد الليفين الولادي وسوء تكوينه وانخفاض مستواه في الدم .



الفصل الثاني

مضاعفات نقل الدم

يعد نقل الدم عنصراً حيوياً يدخل في إطار البنية الأساسية لعلاج النزوف الشديدة وحالات فقر الدم الشديد كأجراء ضروري لرفع نسبة الخضاب مما يمكن المريض من متابعة العلاج دون ظهور أعراض فقر الدم.

إلا أن عملية نقل الدم يجب أن ينظر إليها على أنها نقل نسيج من إنسان إلى آخر، وأن كانت أسهل فنياً من نقل النسيج الأخرى، و عادة ما تمر هذه العملية المحضرة بعناية ووفق الشروط السليمة والاستطبابات الدقيقة لنقل الدم دون مخاطر جديدة . وبالرغم من ذلك لا يخلو نقل الدم من بعض المضاعفات التي تكون في غالبيتها العظمى بسيطة . إلا أنها تكون خطيرة في بعض الأحيان وقد تنتهي بموت المريض. ويمكن عموماً إجمال مضاعفات نقل الدم من حيث المنشأ بتفاعلات مناعية وأخرى لأمناعية. تنجم التفاعلات المناعية عن الأضداد الموجهة نحو الكريات الحمر أو الصفائح أو الكريات البيض أو أحد الغلوبولينات المناعية، ويعد انحلال الدم ضمن الأوعية أو خارج الأوعية، إلى جانب التفاعلات التحسسية ونقص الصفائح من أهم تظاهراتها. أما المضاعفات اللامناعية فتشمل التفاعلات الدورانية والتفاعلات الناجمة عن نقل الدم الجسيم والأحماض وترسب الحديد، إلى جانب الصدمات الهوائية والتهاب الوريد الخثري.

1- التفاعلات الانحلالية Hemolytic Reaction

تعد التفاعلات الانحلالية إلى جانب التفاعلات الدورانية من أهم أسباب الوفاة بعد نقل الدم. وتنجم هذه الحالة عن تخرب الكريات المنقولة إلى المريض إما بسبب نقل الزمرة غير الموافقة بالنسبة للمجموعتين ABO و Rh ، أو بسبب نقل دم منحل نتيجة حفظه في حرارة منخفضة جداً، أو نقل دم مخزن لفترة طويلة .

ويمر التفاعل الانحلالي بأربعة أطوار سريرية تختلف شدتها من مريض لآخر وهب

- طور الصدمة: يتميز هذا الطور ،الذي تختلف شدته بحسب سرعة الانحلال، بانخفاض الضغط الشديد والقصور الدوراني المحيطي وقابلية الترف بسبب استهلاك الليفين . ويشكو المريض عادة من آلام في المنطقة القطنية وغثيان وقشعريرة وشعور بحرارة في الوريد الذي نقل منه الدم.

- طور بعد الصدمة: يتصف هذا الطور بانخفاض مستوى الهيموغلوبين وظهور البيلة الهيموغلوبينية والعوارض اليرقانية مع ارتفاع تعدا الكريات البيض.

- طور شح البول: يحدث شح البول نتيجة الأذية الكلوية كعرض مبكر للقصور الكلوي. وفي هذا الطور تظهر على المريض علامات التعب مع الشعور بالغثيان وحدوث الأقياء إلى جانب الهذيان والإغماء والاختلاجات وقد تمت الوفاة في هذا الطور نتيجة لقصور القلب الاحتقاني أو فرط البوتاسيوم .

- طور إدرار البول: يحدث إدرار البول تدريجيا وقد يكون مفاجئا، ويترافق ذلك بفقدان كميات كبيرة من الصوديوم والبوتاسيوم وطرح كميات كبيرة من الماء قد تكون سببا للوفاة إذ لم تعالج.

وتتمثل تدابير العلاج بإيقاف نقل الدم فورا لدى الشك بحدوث التفاعل الانحلالي من خلال تطبيق علاجات انخفاض الضغط والترف والقصور الكلوي الحاد ، إلى جانب اجراء الاختبارات الضرورية لتشخيص الحالة (إعادة تعيين الزمرة بالتصالب ، معايرة الخضاب والبيروين في البول والدم).

2- التفاعلات التحسسية(الأرجية) Allergic Reaction

تحدث التفاعلات التحسسية بنسبة ضئيلة لدى الأشخاص اللذين لديهم سوابق تحسسية مرتبطة بتفاعلات ضدية -مستضدية أثناء نقل الدم بين المعطي والمتلقي. تنظاهر التفاعلات التحسسية ببقع شرابية محاطة باحمرارية حاكّة ، ويترافق ذلك بصداغ وغثيان ووذمة في الوجه والأغشية المخاطية.

تعالج تفاعلات التحسس الشديد بإيقاف نقل الدم وإعطاء الكورتيزون وريديا ، أما الحالات البسيطة فتعالج بإعطاء الأدرينالين . وبعد نقل الكريات الحمر بعد غسلها بمحلول ملحي أو إعطاء الستيروئيدات مع مضادات الهستامين قبل ساعة من نقل الدم من الإجراءات الوقائية لدى الأشخاص أصحاب السوابق .

3- نقص الصفائح التال لنقل الدم

تحدث قلة الصفائح التال لعملية نقل الدم بنتيجة وجود أضداد موجهة نحو الصفائح سواء في دم المعطي أو دم المتلقي . وقد يحدث ذلك نتيجة خزن الدم والتصاق عدد كبير منها في أكياس الدم.

4- التفاعلات الحروية Febrile Reaction

يترافق نقل الدم في بعض الحالات بترفع حروى عادة ما يكون بسيط (دون 38 م) ، إلا أنه قد يكون شديدا ويترافق بقشعريرة وغثيان وإقياء واحمرار الجلد في بعضها الآخر . وتكون هذه الاستجابة عادة على علاقة بوجود الحمات التي تنتجها الجراثيم في أدوات نقل الدم أو مضادات التخثر المستخدمة، إلا أنها قد تكون ناتجة عن تكون أضداد للكريات البيض أو الصفائح بعد نقل الدم المتكرر.

5- التفاعلات الدورانية Circulatory Reaction

قد تتسبب المضاعفات الدورانية بوفاة المريض وبخاصة المصابين بفقر دم مزمن والمصابون بقصور الكلية أو القلب . ويحدث ذلك بسبب العبء الإضافي على الدوران واحتقان الرئة وقصور القلب .

يشكو المريض من زلة تنفسية وزرقة مع سعال جاف قد يترافق مع قشع مدمى ، إلى جانب تسرع النبض وانخفاض الضغط . ويتمثل العلاج إلى جانب الإيقاف الفورى لنقل الدم بإعطاء المدرات البولية والأكسجين .

6- الصمة الهوائية

تحدث الصمة الهوائية عادة إما نتيجة تسرب الهواء من الأنابيب إلى الوريد بعد انتهاء نقل الدم ، أو نتيجة نقل الدم تحت ضغط هائي ، أو وجود كمية كبيرة من الهواء في جهاز النقل قبل البدء بالعملية . ويؤدي دخول تسرب الهواء إلى الدم بكمية تتراوح بين 10-40 مل إلى اضطرابات شديدة وخطيرة قد تنتهي بالوفاة وبخاصة لدى مرضى آفات القلب الولادية.

تتمثل عوارض وعلامات الصمة الهوائية بصعوبة التنفس المفاجئة والزرقة إلى جانب تسرع القلب وانخفاض الضغط الذي يمكن أن يؤدي إلى غيبوبة نقص التروية الدماغية. وتعالج الصمة الرئوية بوضع المريض على طرفه الأيسر وتخفيض مستوى الرأس ورفع القدمين للأعلى.

7- التهاب الوريد الخثاري

التهاب الوريد الخثاري اختلاط شائع عند طول الفترة الزمنية لبقاء أداة نقل الدم في الوريد (أكثر من 8 ساعات عادة) . وتحدث هذه الحالة في الوريد الصافن أكثر منها في أوردة الأطراف العلوية.

8- مضاعفات نقل لدم الجسيم

يعند عدم انتظام القلب وتوقفه إلى جانب النزف المرتبط بتمديد عوامل التخثر من أهم مضاعفات نقل كميات كبيرة من الدم المخزن والتي تفوق حجم دم المتلقي السوي. وترتبط هذه الحالة بالتسمم الناجم عن فرط بوتاسيوم الدم وارتفاع تركيز السيترات والأمونيا وانخفاض الكالسيوم وهبوط درجة حموضة الدم. ويمكن تجنب هذا الاختلاط بتدفئة الدم قبل نقله وإعطاء كربونات الصوديوم وكلوريد الكالسيوم، إضافة إلى ج نقل الدم الطازج بنسبة تقارب 20% .

9- تراكم الحديد في الجسم

يؤدي نقل الدم المتكرر لمرضى فقر الدم المزمن غير المترافق بفقدان الدم (التلاسيميا وفقر الدم اللاتنسجي) إلى تراكم الحديد في نسيج الجسم وبخاصة الكبد والطحال، إضافة إلى العقد اللمفاوية والقلب والكلى والغدة الكظرية . وتعرف هذه الحالة أيضا بالداء الهيموسيدريني الناجم عن نقل الدم Transfusion siderosis . ويتظاهر هذا الداء سريريا بتضخم الكبد وخلل وظائفه ، إضافة إلى قصور القلب وضُمور المناسل والبيبة السكرية. ويزاح الحديد من الجسم ويتم التخلص من الأعراض بإعطاء مشتقات الديسفيرال بالحقن العضلي أو الوريدي على شكل محلول ممدد .

10-نقل الأمراض

قد يتسبب نقل الدم بانتشار العديد من الأمراض الفيروسية والجراثيمية والطفيلية الخطيرة. وتتضمن الأمراض الفيروسية الأكثر انتشارا بواسطة الدم المنقول كل من التهاب الكبد البائي و التهاب الكبد من النوع سي ومتلازمة العوز المناعي البشري المكتسب (الأيدز) إضافة إلى فيروس الورم اللمفي (اللمفوما) وإيضاض الدم HTLY. وكذلك يمكن الآن ينتقل الفيروس المضخم للخلايا CMV ويسبب خطرا شديدا على حياة الأشخاص ضعفي المناعة .

أما انتقال الملاريا عن طريق الدم وبالرغم من ندرتها(بسبب تجنب المصابين كمتبرعين للدم) فهي لا تزال تشكل مشكلة تزداد أهميتها في ضوء انتشار أشكال الملاريا المقاومة للأدوية.

وبالرغم أيضا من ندرة انتقال السفلس (الأفرنجي) في وقتنا الحالي فلا بد من إجراء الفحوص المصلية ذات الصلة على دم المعطي .



المصطلحات العلمية
باللغتين العربية والإنكليزية

A

Absolute lymphocytosis	كثرة اللمفاويات المطلقة
Absolute polycythemia	كثرة الحمر المطلقة
Absorbance	الامتصاصية
Absorbtion	امتصاص
Acidocyte	حمضة
Acidosis	حماض
Activation	تنشيط
Adenopathy	تضخم العقد
Adhesiveness	لصوقية
Adenosine monophosphate	أدينوزين أحادي الفسفات
Adenosine triphosphate	أدينوزين ثلاثي الفسفات
Adenyle cyclase	الأدينيل سيكلاز
Adrenaline	أدرينالين
Adrenergic receptor	مستقبل أدريناليني
Agglutination	تراص
Agglutinin	راصة
Aggregation	تكلس
Albumin	ألبومين
Alder-Reilly inclusions	متضمنات الدر-ريللي
Aleukemic leukemia	ابيضاض الدم الاايباضي

Alimentation	تغذية
Alkaline phosphatase	فسفataز قلوبية
Alkalisi	قلاء
Amyloidosis	الداء النشواني
Anaphylaxis	تأق
Anaplasia	كشم
Anemia	فقر الدم
Addison,s a.	فقر الدم الوبيل
Aplastic a.	فقر الدم اللاتنسجي
Cooley,s a.	فقر دم كولي
Deficiency a.	فقر الدم العوزي
Hemolytic a	فقر الدم الانحلالي
Hemorrhagic a	فقر الدم التري
Hypochromic a	فقر الدم ناقص الصلغ
Idiopathic a	فقر الدم الغامض
Iron deficiency a	فقر الدم بعوز الحديد
Macrocytic a	فقر الدم كبير الكريات
Mediterranean a	التلاسيمية بيتا
Megaloblastic a	فقر الدم ضخيم ارومات
Microcytic a	فقر الدم صغير الكريات
Normochromic a	فقر الدم سوي لصباع
Normoocytic a	فقر الدم السوي الكريات
Pernicious a	فقر الدم الوبيل
Posthemorrhagic a	فقر الدم التري

Primary a	فقر الدم الأولي
Secondary a	فقر الدم الثانوي
Sickle cell a	فقر الدم المنجلي
Spherocytic a	فقر الدم كروي الخلايا
Anemic	فقير الدم
Angiostenosis	تضييق وعائي
Anisochromia	نفاوت اللون
Anisocytosis	تفاوت الكريات
Anoxia	عوز الأكسجين
Antibody	الضد
Anticoagulant	مضاد تخثر
Antigen	مستضاد
Antihemophilic factor	العامل المضاد للناعور
AntithrombinIII	مضاد الخثرين III
Apo ferritin	صميم الفريتين
APTT	
Arteria radialis	شريان كعبري
Arterial capillary's	شعيرات شريانية
Arterial pressure	الضغط الشرياني
Arterial sclerosis	تصلب شرياني
Arteriole	شرين
Arteria coronary	شريان تاجي (كليلي)
Arthral	مفصلي
Auer rodies	أجسام رود

Autoantibody	أضداد ذاتية
Azurophilic granules	حبيبات ألفة الأزورد
Basophil	أسنة (أساسية)
Basophilic granules	حبيبات أساسية
Bence Jones protein	بروتين بنس - جونس
Bernard_Soulier syndrome	متلازمة برنار - سولير
Beta- thalassemia	التلاسيميا - بيتا
Bile	صفراء
Bilirubin	بيلروبين
Biliverdin	بيلفيردين
Biochemistry	كيمياء حيوية
Blast	الأرومة
Blast crisis	النوبة الأرومية
Boone marrow	نقي العظم
Blood group	زمرة دموية
Blood plasma	مصورة دموية
Blood pressure	الضغط الدموي
Blood serum	مصل الدم
Blood volume	حجم الدم
C	
Cabot rings	حلقة كابوت
Calibration	معايرة
Capillary blood	الدم الشعري
Carbon dioxide	ثاني أكسيد الكربون

Carbonate	كربونات
Cell	خلية
Cellular immunity	مناعة خلوية
Chediak-Higashi anomaly	اضطراب شدياق-هيفاشي
Chemotaxis	الانجذاب الكيميائي
Chloroma	الخضروم
Cholestrol	كولسترول
Cholic acid	حمض الكولييك
Colony- forming-units erythroid	الوحدة المكونة للحمير
Chronic	مزمن
Chronic granulomatous	الورم الحبيبي المزمن
Chronic lymphocytic leukemia	ابيضاض لمفاوي مزمن
Circulation	دوران
Circulating anticoagulants	مضادات التخثر لدوارة
Circulation rate	سرعة الدوران
Clot	جلطة
Clot retraction	انكماش الجلطة
Coagulation	تخثر
Cold agglutinins	الاضداد (الراصات) الباردة
Clony-stimulating-factor	العامل المحرض لنمو السلالات
Concavoconcave	مقعرة الوجهين
Coombs test	اختبار كومب
Coproporphyrin	كوبوروبورفيرين
Corpus	جسم

corpuscle	كرية
Cortisol	كورتيزول
Cranium	قحف
Cytoplasm	الهيولى

D

Deoxyhemoglobin	الحضاب منزوع الأكسجين
Diabetes	الداء السكري
Disseminated intravascular coagulation	التخثر المنتشر ضمن الأوعية
Digestion	هضم
Digestive canal	القناة الهضمية
Digestive system	جهاز الهضم
Diuresis	إبالة
Dohle bodies	أجسام دول
Dyserythropoiesis	سوء تكون الحمر
Dysplasia	خلل تنسج
Dyspnea	زلة تنفسية

E

Edema	وذمة
EDTA	إيثيلين دي أمين تتراسيتات
Elasticity	مرونة
Embryonic hemoglobin	الحضاب الجنيني
Endocarditis	التهاب الشغاف
Endothelial cells	خلايا البطانة الوعائية
Environment	بيئة

Enzyme	أنزيم
Enzymopathy	عوز الأنزيمات
Eosinophilia	كثرة الحمضات
Erythroblast	أرومة الحمراء
Erythrocyte	كرية حمراء
Erythrocytogenesis	تكون الحمر
Erythrocytolysis	انحلال الحمر
Erythropoietin	مكونة الحمر
ESR	سرعة تثفل الكريات
Esterase	استراز
Evolution	تطور
Extravascular destruction	التخرب خارج الوعائي
F	
FABclassification	التصنيف الفرنسي الأمريكي البريطاني
Factor	عامل
Fat	دسم
Ferritin	فيريتين
Fibrinogen	مولد الليفين
Fibrinolysis	انحلال الليفين
Fibrin-stabilizing factor	عامل استقرار الليفين
Fitzgerald factor	عامل فيتسغرال
Flat bone	عظم مسطح
Fluid	سائل
Folic acid	حمض الفوليك

Function	وظيفة
G	
Gall	الصفراء
Gammaglobulin	غاما غلوبولين
Gastric	معدي
Gastric juice	عصارة معدية
Gastro-intestinal	معدي - معوي
Gaucher,s deisease	داء غوشر
Gene	مورثة
Genotype	النمط المورثي
Giemsa stain	ملون غيمزا
Globulin	غلوبولين
Glucose	غلوكوز
Glucosidae	غلوكوزيداز
Glycerol	جليسرول
Glycocalyx	جليكو كاليكس (الكنان السكري)
Glycogen	جليكوجين
Glycoprotein	بروتين سكري
Glycosuria	بيلة سكرية
Granular	حبيبي
Granular cell	خلية حبيبية
Granulocyte	الحبيبة
Granulocytopenia	قلة الحبيبات
Granulocytosis	كثرة الحبيبات

Granulomaous

حبيبي

Group

زمرة

Growth

نمو

H

Haem

هيم

Haemorrhagia

نزف

Hageman factor

عامل هايغمان

Haptoglobin

هبتوغلوبين

Heart

القلب

Heart rate

سرعة القلب

Heart valves

صمامات القلب

Heinz bodies

أجسام هينز

Hemagglutination

تراص دموي

Hemagglutinin

راصة دموية

Hemangiectasis

توسع الأوعية الدموية

Hematocrit

الكسر الحجمي للكريات الحمر

Hematopoiesis

تكون الدم

Hematology

علم الدمويات

Hematouria

بيلة دموية

Heme

هيم

Hemin

هيمين

Hemochromatosis

صباغ دموي

Hemocytoblast

أرومة الكريات

Hemoglobin

حضاب الدم، هيموغلوبين

Hemoglobinemia	هيموغلوبينية
Hemoglobinopathy	اعتلال خضابي
Hemoglobinuria	بيلة خضابية
Hemogram	صيغة الدم
Hemolysis	انحلال الدم
Hemolytic	حال الدم
Hemolytic jaundice	يرقان انحلاي
Hemophilia	الناعور
Hemorrhage	نزف
Hemosiderin	هيمو سيدرين
Hemosiderinuria	بيلة هيمو سيدرينية
Hemostasis	إرقاء
Hemotherapy	مداواة بالدم
Hepar	كبد
Heparin	هيبارين
Histamine	هستامين
Hodgkin,s disease	داء هودجكن
Homeostasis	الاستتباب
Homogenous	متجانس
Hormone	هرمون
Howel-Jolly boodies	أجسام هول-جولي
Human T cell leukemia virus	فيروس ابيضاض الخلايا التائية البشري
Humor	خلط
Humoral immunity	مناعة خلطية

Hydration	إمالة
Hypersegmentation	فرط التفصص
Hypertonic	مفرط التوتر
Hypertonic sol.	محلول مفرط التوتر
Hypochromia	نقص الصباغ
Hypochronic anemia	فقر الدم الناقص الصباغ
Hypoproliferative disorders	أمراض نقص التكاثر
Hypoproteinemia	نقص بروتين الدم
Hypotonic	ناقص التوتر
Hypotonic sol.	محلول ناقص التوتر
Hypoxia	نقص التأكسد، عوز الأكسجين
I	
Idiopathic	غامض
Immune deficiency disease	اعتلال نقص المناعة
Immunity	مناعة
Immunodeficiency	نقص المناعة
Immunoglobulin	غلوبولين مناعي
Infection	لحمج
Infectious mononucleosis	كثرة الوحيدات الخسجي
Infiltration	ارتشاح
Inflammation	التهاب
Inhibition	تثبيط
Insufficiency	قصور
Interstitial	خلالي

Intestinal juice	عصارة معوية
Intestine	معوي
Intoxication	انسامام
Intracellular	داخل خلوي
Intravascular destruction	تخرب داخل وعائي
Isotonic	أسوي التوتر
Isotonic sol.	محلول أسوي التوتر

J

Jaundice	يرقان
Hemolytic j	يرقان انحلاي
Joint	مفصل
Juice	عصارة

K

Kallikrein	كاليكرين
Kidney	كلية
Kinetic	حركي

L

Latent	كامن
Lateral	جاني
Leucocyte	الكرية البيضاء
Leukemia	ايضااض الدم
Leukocytopenia	قلة الكريات البيض
Leukocytosis	كثرة الكريات البيض
Lipase	ليباز

Lipids	الليبيدات
Lung	رئة
Lymph	لمف
Lymph capillary	شعيرات لمفية
Lymphaden	عقدة لمفية
Lymphadenopathy	اعتلال العقد اللمفاوية
Lymphoblastic Leukemia	الابيضاض بالأرومات اللمفاوية
lymphocytoma	ورم لمفي
Lymphocytopenia	قلة اللمفاويات
Lymphocytosis	كثرة اللمفاويات
Lymphogenesis	تكون اللمف
Lymphogranulomatosis	ورم حبيبي لمفي
Lymphoproliferative disorders	الأمراض التكاثرية اللمفاوية
Lymphosarcoma	غرن لمفي

M

Macroglobulin	غلوبولين كبري
Macrophage	بلعم
Macrocytic anemia	فقر الدم الكبير الكريات
Malignant	سرطان
Malnutrition	سوء التغذية
Mast cell	خلية بدينة
May-Hegglin anomaly	اضراب ماي-هغلين
Mechanism	آلية
MCH	متوسط هيموغلوبين الكرية

MCHC	تركيز خضاب الكرية الوسطي
MCV	حجم الكرية الوسطي
Medium	وسط
Megacaryocyte	النواء
Megalocyte	الخلية العرطلة (الضخمة)
Membrane	غشاء
Menstrual	حيضي
Menstrual cycle	دورة حيضية
Metabolism	استقلاب
Method	طريقة
Methylene blue	زرقة الميتلين
Microcirculation	الدوران الصغري
Milieu	وسط
Mineralocorticoids	القشرانيات المعدنية
Monoclonal antibodies	الأضداد وحيدة النسيلة
Monocyte	الوحيدة
Mnocytopenia	قلة الوحيدات
Monocytosis	كثرة الوحيدات
Monunucleosis	كثرة الوحيدات
Mucopolysaccharide	عديد السكاريد المخاطي
Mucoprotein	بروتين مخاطي
Mucus	مخاط
Muscle	عضلة
Muscle rigidity	صلل عضلي

Myoblast	أرومة النقية
Myelocyte	النقية
Myelogenous	نقوي المنشأ
Myelomatosis	ورم نقوي
Myocardium	عضلة القلب
Mysthenia	وهن عضلي
N	
Negative	سلي
Nephron	نفرون
Nervus	عصب
Neutropenia	قلة العدلات
Neutrophil	العدلة
Neutrophilia	كثرة العدلات
Niemann- Pick disease	اعتلال نيمان- بيك
Noradrenaline	نور أدرينالين
Normal	سوي
Nucleus	نواة
O	
Oncotic pressure	الضغط الجرمي
Oorganism	متعضية
Organ	عضو
Organic	عضوي
Organization	تنظيم
Osmosis	حلول، تناضح

Output

نتاج

Ovulatio

Oxyhemoglobin

خضاب مؤكسج

Oxygenation

أكسجة

P

Packed cell volum

حجم الخلايا المكثبة

Pancytopenia

قلة الكريات

Paralysis

شلل

Parasympathetic

نظير الودي

Parathormone

هرمون الدريقات

Parietal

جداري

Parietal cell

خلية جدارية

Partial thromboplastin time

زمن الترمبوبلاستين الجزئي

Passive

منفعل

Pathological

مرضِي

Paul-Bunnet test

اختبار بول-بونيل

Pepsinogen

مولد الببسين

Period

دور

Phagocytosis

بلعمة

Phosphatase

فسفتاز

Phospholipase

فسفوليپاز

Phosphorylase

فسفوريلاز

Pigment

صباغ

Plain muscle

عضلة ملساء

Plasma	مصورة
Plasma cell	خلية مصمورية
Plasmin	بلاسمين
Plasminogen	مولد البلاسمين
Plasticity	لدونة
Platelets	صفائح
Poikilocytosis	تباكل الكريات
Polychromasia	تعدد الصباغ
Polycythemia vera	كثرة الحمر الحقيقية
Polypeptide	عديد الببتيد
Porphyrin	بورفيرين
Pressure	ضغط
Product	ناتج
Proerythrocyte	سليفة الحمراء
Proerythroblast	سليفة الأرومة الحمراء
Promegakaryocyte	سليفة النواء
Promonocyte	سليفة الوحيدة
Prostaglandin	بروستاغلاندين
Protease	بروتياز
Protein	بروتين
Proteolytic	حال البروتين
Prothrombin	طلايعة الخثرين
Pseudoliukemia	ايضاض كاذب
Pulse	لنبض

Purpura

الفرقية

Q

Qualitative

كيفي

Quantitative

كمي

R

Rate

سرعة، معدل

Reaction

رد فعل، استجابة

Reactivation

تنشيط

Receptor

مستقبل

Red Blood corpuscle

الكرية الحمراء

Reflex action

فعل منعكس

Regulation

تنظيم

Resistance

مقاومة

Respiration

تنفس

Respone

استجابة

Reticulocyte

الشبكة

Reticuloendothelial system

الجهاز الشبكي البطاني

Retraction

انكماش

Rh, Factor

العامل الريزوسي

Rhythm

نظم

Rhythmicity

النظمية

Rigidity

صلل

RNA

الحمض الريبي النووي

S

S.nervosum autonomicum	الجهاز العصبي المستقل
S.nervosum centrale	الجهاز العصبي المركزي
Sal (Salt)	ملح
Salive	لعاب
Sap	عصارة
Sclerosis	تصلب
Secondary polycytemia	كثرة الحمر الثانوية
Secretion	إفراز
Sedimentation	ترسب
Sedimentation rate	سرعة الترسب
Sense	حس
Serotonin	سروتونين
Serum	مصل
Sexual cycle	دورة جنسية
Sialaden	غدة لعابية
Sickle cell	خلية منجلية
Sidroblastic anemia	فقر الدم الأرومي الحديدي
Siderotic granules	الحبيبات الحديدية (أجسام باينهايمر)
Skin	جلد
Small intestine	معى دقيق
Solution	محلول
Somatic	جسدي
Specificity	نوعية
Sphincter	مصرة

Spongy bone	عظم إسفنجي
Stage	دور، مرحلة، طور
Stem cell	خلية جذعية
Stenosis	تضييق
Stercobilinogen	مول الستيركوبيلين
Stimulation	تنبيه
Stomach	معدة
Striated muscle	عضل مخططة
Stuart factor	عامل ستوارت
Substance	مادة
Swallowing	بلع
Sweat	عرق
Sympathic	ودي
Synthesis	اصطناع، تركيب
System	جملة، جهاز (منظومة)
Systemic lupus erythematosus	الدبة الحمامية الجهازية

T

Tachycardia	تسرع القلب
Technology	تقانة
Temperature	درجة الحرارة
Tension	توتر
Test	اختبار
Tetany	تكزز
Theory	نظرية

Thirst	عطش
Threshold	عتبة
Thrombin	الخشرين
Thrombocyte	صفيةحة
thrombocytopenia	قلة الصفيةحات
Thrombocytosis	كثرة الصفيةحات
Thrombokinas	ترمبو كيناز
Thrombolysis	الخلال الخثرة
Thromboplastin	ترمبو بلاستين
Thrombopoiesis	تكون الصفيةحات
thrombosthenin	ترمبو سثينين (أكتوميوزين)
Thromboxane	ترمبو كسان
Thrombus	خثرة
Tissue	نسيج
Titanic contraction	تقلص تركززي
Tonic	مقوي
Topical	موضعي
Toxic granulation	الخبيةيات السامة
Toxicosis	تسمم
Tract	مسلك، سبيل
Transcobalamin	ترانس كوبالامين
transferrin	ترانسفيرين
Transfer	نقل
Transfusion	نقل الدم

Translocation	إزفاء
Tripeptide	ثلاثي الببتيد
Tube	أنبوب
Tubuli renales	أنبيبات كلوية

U

Ultrastructure	البنية الدقيقة
Under-nutrition	نقص التغذية
Unit	وحدة
Unconjugated bilirubin	بيلرويين حر (غير مرتبط)
Uresis	تبول
Uric acid	حمض البول
Urina	بول
Urination	تبول

V

Vacuolated lymphocytes	اللمفاويات الفحوية
Valve	صمام ، دسام
Vas	وعاء
Vas cappila	وعاء شعري
Vasoconstriction	تضييق الأوعية
Vasodilation	توسع الأوعية
Vasomotor centers	مراكز محرركة وعائية
Vasomotorium	الجملة المحركة الوعائية
Vasopressin	فازوبريسين (الموتر الوعائي)
Vena	وريد

Volume	حجم
Von Willebrand,s disease	داء فون ويلبران
W	
Warfarin	وارفرين
Waldenstrm,s disease	داء ولدنستروم
Wave	موجة
Weight	وزن
white Blood corpuscle	الكرية البيضاء
Wiscott-Aldrich syndrom	متلازمة ويسكوت-الدريخ
Wright stain	ملون رايت



المراجع العربية

- 1- أبو حامد حسين. مختصر الفيزيولوجيا البشرية باللغتين العربية والانكليزية، المركز العربي المعاصر، 2000.
- 2- القطب زياد وديب جرجس . الفيزيولوجيا الحيوانية (وظائف التغذية) ، جامعة دمشق، 2000.
- 3-الحديدي سيد، أمراض الدم ، سلسلة التقويم الذاتي، دمشق 1992.
- 4- بازرباشي محمد بديع . الوجيز في أمراض الدم ، جامعة حلب 1994.
- 5- بيطار منير والطيان هشام والصياح قطان . الفيزيولوجيا البشرية، جامعة دمشق , 1982.
- 6- ديب جرجس. علم وظائف الأعضاء، جامعة البعث، 2007.
- 7- ديب جرجس والعجلاني ربما والقطان علي. تطبيقات عملية في الفيزيولوجيا الحيوانية (وظائف التغذية) ، جامعة دمشق، 2004.
- 8- زيتون محمد سعيد وقره كوزيان مارال . الدمويات(القسم الخلوي) ، جامعة دمشق، 1998.



المراجع الأجنبية

- 1- Babsky E.B; Glebovsky V.D; ..et. Human physiology. Moscow, 1985.
- 2- Bod A.p., Pattidon A., Ridgway. Evaluation of platelet function, Beaumont, TX: Helena Laboratories, 1993.
- 3- Brown, B. A. Hematology: Principles and Procedures (5th ed.). Philadelphia: Lea & Febiger. 1992.
- 4- Carpenter R. Neurophysiology, 2nd edn. Edward Arnold, sevenoaks, Kent. 1990
- 5- Carr, J.H. & Rodak, B.F. Clinical Hematology Atlas, Philadelphia: W.B. Saunders, 1999.
- 6- Ganong W.F. Review of medical physiology, 15 th edn. Appleton and Lange; San Mateo, California, 1991
- 7- Guyton C, Holl E. Textbook of medical physiology. London 1996.
- 8- Harmening, D. M. Clinical Hematology and Fundamentals of Hemostasis, 4th ed. Philadelphia: F. A. Davis. 2002.
- 9- Hillman R.s. and C.A. Red cell manual (7th ed). Philadelphia: F.A. Davis, 1996.
- 10- Hillman, R. S. , Kenneth, A. A., RINDER, M. Hematology In Clinical Practice. McGraw Hill: 2005
- 11- Jandl, J.H. Blood. Boston: Little, Brown and Co., 1996.
- 12- Lewis, S.M. Practical Haematology, 9th ed., London: Harcourt Health Sciences: Churchill Livingstone, 2001.
- 13- Lichtman, M. A. Williams, W. J, Lichtman, M. Williams Hematology McGraw Hill: 2005.
- 14- McKensie, S.B. Textbook of Hematology, 2nd ed., Baltimore: Williams & Williams, 1996.
- 15- Patton H.D; Fuchs A.F; Hille B; Scher A.M and Steiner R. Textbook of physiology, Philadelphia, 1989.

16 -Rodak B.F: Hematology Clinical Principles and Applications W.B. Saunders Co., Philadelphia, 2002.

17-Russell, A.P.) Hematology, Delmar's Clinical Laboratory Series, New York: Delmar,1997.

18-Sapen R.M; Belesh L.G.Human anatomy,Vishea Shkola, Moscow,1989.

19-Stiene-Martin, E.A. Clinical Hematology Principles, Procedures, Correlations: Philadelphia: Lippincott,1998.

20- Schmiot F.R, Thews G. Human physiology . Vol.1,2,3,4,New York 1983.

21-Turgeon M.L. Clinical hematology(3th ed).New York 1999 .

22-Urmoleev M.B. Biological chemistry.Moscow 1989.



المدقق اللغوي

الدكتور خليل غريري

حقوق والطبع والترجمة والنشر محفوظة لمديرية الكتب والمطبوعات

جامعة دمشق
Damascus University

